

تصویر ابو عبد الرحمن الکردي

هفتم

# فرهنگ دارویی خانواده

دکتر ذبیح الله حسن زاده

■ لیست کامل داروهای ایران ■ عوارض دارویی ■ داروهای گیاهی

■ داروهای خارجی و وارداتی ■ هشدارهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# فرهنگ دارویی خانواده

لیست کامل داروهای ایران + داروهای خارجی + داورهای گیاهی + عوارض  
دارویی + شناخت بیماریها و درمان آنها + هشدارها و دستورهای دارویی  
وزارت بهداشت + لیست داروهای بدون نسخه و اصطلاحات پزشکی

تألیف:

دکتر ذبیح ... حسن زاده



حسن زاده چاپچالی، طبیب... ۱۳۳۳  
فرهنگ دارویی خانواده / تألیف طبیب... حسن زاده تهران، کلیه ۱۳۸۲.  
۵۹۲ ص: مصور.

فهرستی بر اساس اطلاعات فیله  
۱. داروها - وژنامده. ۲. داروشناسی. الفب. عنوان.

۶۱۵/۱۰۳  
۴۱۲-۲۸۵۵۱

۵۱ RS  
کتابخانه ملی ایران



فرهنگ دارویی خانواده  
مؤلف: دکتر ذبیح ا... حسن زاده  
ناشر: انتشارات گلپا  
نوبت چاپ: هفتم، ۱۳۸۷  
تیراژ: ۵۰۰۰ جلد  
چاپخانه: دیبا  
حروفچینی: نویسان

شابک: ۸-۲۲-۷۹۳۸-۹۶۴-۹۷۸

ISBN: 978-964-7938-22-8

کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است

هرگونه برداشت از تمام یا قسمتی از این اثر منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر می باشد.

قیمت: ۸۵۰۰ تومان

آدرس: روبروی دانشگاه تهران - خیابان ۱۲ فروردین

خیابان شهیدای زاندارمری - پلاک ۲۳۶ - طبقه دوم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۲۰۸۲۴ - ۶۶۹۵۲۵۶۲

[http://WWW.books\\_golpa.com](http://WWW.books_golpa.com)

E.mail: books\_golpa@hotmail.com

## فهرست

### صفحه

### عنوان

۵.....	مقدمه مؤلف.....
۷.....	اشکال دارویی - (انواع محصولات دارویی).....
۱۱.....	مصرف داروها در حاملگی و شیردهی.....
۱۳.....	روش‌های مصرف یا استعمال داروها.....
۱۶.....	داروهای چشمی - گوشی.....
۱۷.....	راه‌های دیگر استفاده از دارو.....
۱۹.....	علائم اختصاری در نسخه‌نویسی.....
۲۱.....	داروهای ایران.....
۵۲۵.....	چه هنگام دارو را استفاده کنیم؟.....
۵۲۶.....	پس از غذا یا همراه غذا.....
۵۳۰.....	قرص یا کپسول را بجوید، از بلعیدن آن خودداری کنید.....
۵۳۰.....	قرص یا کپسول را ببلعید، آن را نجوید.....
۵۳۱.....	قبل از غذا یا با معده خالی.....
۵۳۱.....	یک ساعت پیش از غذا.....
۵۳۲.....	داروهایی که پس از غذا یا همراه غذا باید مصرف شود.....
۵۳۳.....	دارو بدون توجه به غذا میل شود.....
۵۳۴.....	داروهایی که باید زیر زبانی یا زبانی میل شود.....



۵۳۴	..... همراه با مقادیر کافی مایعات (حداقل یک لیوان کامل)
۵۳۵	..... با روغن های معدنی مصرف نشود
۵۳۵	..... نباید با شیر، لبنیات و آنتی اسیدها مصرف شود
۵۳۵	..... زیر زبانی
۵۳۶	..... داروهایی که باعث تغییر رنگ مدفوع یا ادرار می شوند
۵۳۷	..... داروهایی که باعث افزایش حساسیت به نور می شوند
۵۳۹	..... لیست داروهای بدون نسخه
۵۴۳	..... داروهای گیاهی ایران
۵۴۹	..... فهرست داروهای ایران بر اساس محل اثر و بیماری ها
	عوارض دارویی و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش
۵۶۳	..... پزشکی
۵۶۷	..... فهرست داروها

## مقدمه مؤلف

خانواده‌های گرامی، خوانندگان ارجمند

بی‌شک در دنیای امروز که به عصر اطلاعات شهرت یافته است، ارتقای دانش پزشکی و آگاهی‌های عمومی می‌تواند در بهره‌گیری افراد جامعه از پیشرفت‌های علوم نوین و دستاوردهای خارق‌العاده پزشکی نقش حساس و بسزایی داشته باشد.

داروها بخشی از محصولات پزشکی هستند که هر یک از افراد جامعه به نحوی با آن در تماس می‌باشند.

شناخت داروها، آگاهی از عوارض، میزان مصرف، شیوه نگهداری داروها، موارد منع مصرف، مراقبت‌ها و توجهات خانواده‌ها نسبت به داروها و مسمومیت‌های دارویی و... نکات ارزشمندی است که می‌تواند باعث بهبود سطح سلامتی افراد جامعه و کاهش عوارض داروها گردد.

کتاب حاضر، که از جدیدترین منابع علمی و آخرین گزارش‌های معتبر دارویی برخوردار است، حاوی اطلاعات گرانقدری می‌باشد که به یقین برای افزایش سطح دانش پزشکی خانواده‌های ایرانی مفید خواهد بود.

از ناشر محترم جناب آقای مهدی صبائی به پاس دقت و تلاش وافر در راه ارائه بهتر این مجموعه سپاسگزاری می‌نمایم.  
با ما به آدرس انتشارات مکاتبه نمایید.

به نام خدا

سخن ناشر

باید پذیرفت که متأسفانه اغلب، آگاهی‌های عامه مردم از بهداشت و سلامتی، بالاخص دارو و اصول آن بسیار ناچیز می‌باشد. کتابی که هم اکنون تحت عنوان فرهنگ دارویی خانواده پیش‌رو دارید پاسخگوی بسیاری از خانواده‌ها برای استفاده صحیح از داروهاست لذا توصیه می‌شود که هر خانواده ایرانی یک جلد از این کتاب را در دسترس داشته باشد تا علاوه بر استفاده صحیح از داروها با شکل داروها، عوارض دارویی، موارد مصرف، میزان مصرف، موارد منع مصرف داروها، داروهای خارجی، داروهای گیاهی و ضمناً هشدارهای وزارت بهداشت و درمان و اصطلاحات پزشکی درباره داروها نیز آشنا شود.

به امید روزی که فرهنگ توزیع و مصرف صحیح دارو در جامعه گسترش یابد و از ایجاد بازار سیاه در توزیع داروهای نایاب جلوگیری شود.

در پایان لازم است که از جناب آقای دکتر حسن‌زاده کمال تشکر و قدردانی را نموده و خدمات بیشتر ایشان را به جامعه پزشکی ایران آرزو کنیم.

امید است چنین اثری مورد توجه و استفاده بهینه قرار بگیرد و خطاهای احتمالی ما را در این کتاب به دیده اغماز بنگرید و با دعای خیر خود ما را در ادامه انجام وظایف علمی و فرهنگی و آموزشی یاری فرمایید.

## اشکال دارویی - (انواع محصولات دارویی)

در نسخه پزشکان آمپول (Amp)، قرص (Tab) و شربت (syp) شایعترین کلمات اختصاری مورد استفاده می باشند.

**Ampule** (آمپول): ظروف شیشه‌ای هستند که برای نگهداری دارو و تجویز آن از راه تزریق (عضلانی - وریدی - موضعی) تهیه می شوند. این شکل از داروها یک بار مصرف می باشد.

**Buccal Tablet** (قرص دهانی): این قرص‌های بیضوی یا دایره‌ای شکل می بایست در داخل حفره دهانی حل شوند. اغلب این‌ها به کندی جذب می شوند.

**Bulk** (توده حجیم - داروهای فله‌ای): این گروه از مواد اغلب به عنوان مواد اولیه در ساختن دارو استفاده می شوند یا مستقیماً مورد استفاده قرار می گیرند مثل (پارافین).

**Capsule** (کپسول): کپسول شکلی از دارو می باشد که جنس آن از ژلاتین است و در داخل آن مواد دارویی قرار می گیرد.

**Chewable Tablet** (قرص جویدنی): این قرص در دهان جویده می شود تا به آرامی جذب شود.

**Collodion** (ترکیب مایع): حاصل اختلاط پیروکسیلین و الکل یا اتر است که در داروهای ترکیبی استفاده می‌شود.

**Controlled-Release C.R.Tab**: قرص‌هایی که به صورت اندک اندک و به آهستگی آزاد می‌شود.

**Effervescent.Tab**: قرص‌های جوشان که اغلب حاوی ویتامین‌های C، کلسیم و... می‌باشند. این قرص‌ها در تماس با آب، گاز آزاد می‌کنند و حل می‌شوند.

**Elixir**: به شکل شربت‌های شیرین شده است که نمونه آن در شربت‌های کودکان می‌باشد (الگزیراستامینوفن).

**Gel** (ژل): ماده نیمه جامدی است که موارد استفاده آن موضعی می‌باشد مثل ژل لیدوکائین، دیکلوفناک و...

**lotion** (لوسیون): مایعی است که روی پوست کاربرد دارد و اغلب در محیط غیرقابل حل می‌باشد.

**Ointment** (پماد): محصول نیمه جامد است، و اغلب برای استعمال خارجی کاربرد دارد مثل پماد سالیسیلات و... پمادها ممکن است چشمی باشند که به نوع **ophthalmic** (چشمی) مشهورند.

**Ovule** (اوول): شکلی از دارو است که برای دستگاه تناسلی زنان (واژن) کاربرد دارد و از نظر ظاهر نرم می‌باشد.

**Pili** (شبییه قرص): فرآورده جامد، دایره‌ای شکل و اغلب کوچک است که از راه دهان استفاده می‌شود، مثل قرص‌های ضد حاملگی.

**Plaster** (پلاستر): مواد زمینه‌ای آن نظیر کتان - کاغذ - ابریشم است و برای استعمال خارجی به کار می‌رود.

**Powder** (پودر): شکل جامد و خرد شدهٔ مواد دارویی است که در ترکیب با آب یا بدون آن استفاده می‌شود مثل پودر پسیلیوم، پودر بچه. **Resin** (رزین): صمغ یا ترشحات جامد و نیمه جامد که اغلب منشأ گیاهی دارد یا به شکل شیمیایی تهیه می‌شود.

**Solution** (محلول): فراوردهٔ مایع که مادهٔ اصلی و حلال آن آب است. در موارد موضعی و بیماری‌های پوستی کاربرد دارد.

**Spray**: ذرات ریز دارویی که با فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد و اغلب بر روی پوست مثل اسپری لیدوکائین‌ها یا در بینی و دهان مثل اسپری سالبوتامول استفاده می‌شود.

**Sublingual** (قرص‌های زیر زبانی): این داروها اغلب بیضوی است و در زیر زبان قرار می‌گیرد و با استفاده از مواد آنزیمی دهان جذب می‌شود.

**Suppository** (شیاف): شیاف‌ها از راه مقعد در عموم افراد یا واژن در خانم‌ها استفاده می‌شود ولی آثار درمانی آن می‌تواند موضعی و عمومی باشد مثل شیاف بیزاکودیل، شیاف استامینوفن.

**Suspension** (سوسپانسیون): متشکل از ذرات ریز محلول در آب می‌باشد و می‌بایست قبل از مصرف شیشهٔ حاوی دارو تکان داده شود. **Syrup** (شربت): محلول‌های حاوی مواد شیرین کننده‌اند که فراوان می‌باشند مثل شربت استامینوفن، اکسپکتورانت.

**Tablet** (قرص): ممکن است با یا بدون پوشش باشد و گاهی با استفاده از رنگ و مواد دیگر ساخته می‌شود. قرص‌ها ممکن است خوراکی یا واژینال باشند.

قرص‌های ویژه دستگاه تناسلی زنان با وسیله‌ای به نام اپلیکاتور استفاده می‌شود مثل قرص واژینال کلوتریمازول.



## مصرف داروها در حاملگی و شیردهی

آشنایی با خطرهای ناشی از عوارض دارویی به ویژه در دوران حاملگی و شیردهی برای مادر و کودک بسیار با اهمیت می باشد.

بسیاری از داروها از جفت عبور می کنند و وارد جنین می شوند و می توانند منشاء ضایعات ناخواسته بشوند و گاهی نیز در شیر ترشح می شوند و بر روی دستگاه های بدن شیرخوار اثر می گذارند. سازمان دارو و غذای ایالات متحده (FDA) Food and Drug Administration داروها را به ۵ گروه تقسیم کرده است. به طور خلاصه:

گروه A عموماً بی خطر و گروه X ممنوع است و گروه های B و C و D بر اساس برتری سود یا زیان ناشی از مصرف داروها قابل بررسی است. یعنی اگر دارویی فوایدی بیش از مضرات خود دارد برای استفاده بلامانع است. گروه A - مطالعات تجربی و آزمایشگاهی، بی خطری این گروه را در حاملگی اثبات کرده و عارضه ای برای جنین ذکر نشده است.

گروه B - شواهدی برای خطرناک بودن آنها در انسان اثبات نشده است هر چند در حیوانات ممکن است خطرناک باشد.

گروه C - این گروه شامل داروهایی می شود که خطرناک بودن داروها

در مورد انسان به اثبات نرسیده است ولی در مورد حیوانات می‌تواند عارضه جانبی داشته باشد.

گروه D - شواهد نشان می‌دهد که مصرف این گروه برای جنین همراه با خطر است و باید آن را قبول کرد.

گروه X - مصرف این گروه در حاملگی ممنوع است زیرا برای انسان و حیوان خطرناک است.

## روش‌های مصرف یا استعمال داروها

محصولات و فرآورده‌های دارویی به روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند البته یک دارو می‌تواند به چند شکل استفاده گردد و گاهی فقط روش منحصر به فردی در مصرف یک دارو وجود دارد. راه‌های استفاده از داروها:

۱- روش خوراکی؛ ۲- راه تزریقی که شامل تزریق عضلانی، زیر جلدی، موضعی، داخل مفصلی و وریدی می‌باشد؛ ۳- راه تنفسی (اسپری)؛ ۴- مقعدی (شیاف)؛ ۵- قطره‌های چشمی - گوشی - داخل بینی؛ ۶- داخل واژن (دستگاه تناسلی زنان) و ۷- زیر زبانی.

تزریقات عضلانی (IM): به طور عمده با سرنگ‌های شماره ۲۰ تا ۲۳ و با زاویه ۹۰° انجام می‌شود. هر چند تزریقات عضلانی به طور شایع در عضلات ناحیهٔ باسن (گلتوتوس‌ها) صورت می‌گیرد ولی در عضلات دلتوئید (شانه) و رانی (واستوس خارجی) قابل انجام است. روش کار:

۱- دارو را با سر سوزن مناسب از آمپول بکشید.

۲- محل تشریحی (آناتومیک) تزریق را مشخص نمایید.

۳- هر باسن به ۴ قسمت از یک دایره تبدیل می‌شود که قسمت

فوقانی و خارجی، ناحیه تزریق است.

۴- بیمار را در وضعیتی مناسب قرار دهید.

۵- با استفاده از پنبه آغشته به الکل محل تزریق را تمیز کنید.

۶- پوست محل تزریق را با ۲ انگشت دست چپ گرفته و بالا بیاورید سپس با زاویه ۹۰ درجه تزریق کنید.


۷- سر سوزن باید سریع وارد عضله شود. همیشه پس از ورود سر سوزن پونکسیون کنید تا مطمئن شوید که به داخل رگی تزریق نکرده‌اید.

۸- پس از تزریق سوزن را به سرعت خارج کرده و با پنبه الکل محل تزریق را به آهستگی ماساژ دهید.


۹- تزریق داروها در کودکان در قدام عضله ران و یا واکسن‌ها در عضله دلتوئید بازو و شانه صورت می‌گیرد.

۱۰- عدم دقت در تعیین محل آناتومیک تزریق، فاجعه آفرین خواهد بود و می‌تواند با ضایعات عصبی - عروقی و... همراه باشد.

زاویه تزریق



داروهای بسیاری مثل هپارین، انسولین و... به صورت زیر جلدی تزریق می‌شوند...



محل‌های توصیه شده برای تزریق‌های زیر پوستی

تزریقات زیر جلدی:

- (۱) با سرنگ‌های شماره ۲۵ تا ۲۷ انجام شود.
- (۲) داروی مورد نظر را باید با سر سوزن مناسب به داخل سرنگ کشید.
- (۳) محل مناسب برای تزریق را انتخاب کنید.

- (۴) با پنبه الککل ضد عفونی محل را ضد عفونی کنید.
- (۵) در افراد چاق، سوزن را با زاویه  $90^\circ$  درجه و در افراد لاغر، پوست محل تزریق را با ۲ انگشت بگیرید و با زاویه  $45^\circ$  وارد کنید.
- (۶) پس از ورود پونکسیون کنید تا از عدم ورود سوزن به داخل عروق مطمئن شوید.
- (۷) سر سوزن را پس از تزریق سریع خارج کنید.
- (۸) به آرامی با پنبه الککل محل تزریق را ماساژ دهید.

## جدول تزریقات:

نوع تزریق	اندازه سرسوزن	حجم قابل تزریق
- عضلانی (IM)	۲۰ تا ۲۳	۱ تا ۵ سی سی
- عضلانی دلتوئید	۲۳ تا ۲۵	۵/۰ تا ۲ سی سی
- اینترادرمال (ID)	۲۶ تا ۲۷	۱/۰ سی سی
- زیر پوستی (SC)	۲۵ تا ۲۷	۵/۰ سی سی

## داروهای چشمی - گوشی

قطره‌های چشمی: در حالی که بیمار به بالا نگاه می‌کند پلک زیرین را به پایین بکشید و قطره چکان (اپلیکاتور) را نزدیک کنید و در گوشه چشم بچکانید. از قرار دادن قطره چکان مستقیماً روی پلک خودداری کنید و پلک را به آرامی رها کنید.

پماد چشمی: مثل تکنیک بالا عمل کنید و لایه نازکی از پماد را داخل پلک تحتانی قرار دهید.

قطره گوشی: به بیمار توصیه کنید روی گوش مقابل بخوابد. در

کودکان، لاله گوش را به پایین و عقب بکشید و در بزرگترها لاله گوش را به بالا و عقب بکشید. از تماس قطره چکان با گوش پرهیز کنید. بهتر است بیمار ۱ تا ۲ دقیقه در همین وضعیت بخوابد. ارجح است که قطره گوشی سرد نباشد.

#### تجویز پمادهای چشم



پماد را بر روی لبه ساک ملتحمه بیمار در فاصله بین کانتوس خارجی و داخلی قرار دهید.

#### راههای دیگر استفاده از دارو

- ۱) اسپری تنفسی، ۲) اسپری بینی، ۳) قطره بینی، ۴) داخل واژن، ۵) شیاف و ۶) قرص زیر زبانی.

اسپری تنفسی: داروهای بیماران آسمی اغلب به صورت اسپری استفاده می‌شوند. اسپری را در فاصله ۲/۵ سانتی‌متری دهان قرار دهید، پس از یک دم عمیق و بازدم عمیق، اسپری را در مقابل دهان آماده فشار کنید و همزمان با زدن اسپری تنفس (دم عمیق) را انجام دهید. اسپری بینی: نوک اسپری را وارد بینی کنید. با فشار روی محفظه



اسپری مقدار لازم دارو وارد بینی می‌شود.

**قطره بینی:** بهتر است بینی بیمار را تمیز کنید و در حالت خوابیده به پشت در حالی که سر بیمار کمی به طرف عقب خم شده است، دارو را وارد بینی کنید و ۱ تا ۲ دقیقه در همین حالت او را نگهدارید. قطره چکان را باید پس از هر بار استفاده با آب شست.

**داخل واژن:** در صورتی که بیمار خودش بخواهد از این روش استفاده کند باید دراز بکشد، اپلیکاتور را به آرامی وارد واژن کند و سپس دسته اپلیکاتور را به داخل فشار دهد.

**شیاف:** برای استفاده آسانتر بهتر است از ژل‌های نرم کننده (لوبریکانت) به همراه شیاف بهره بگیرید. به آرامی شیاف را وارد مقعد کنید تا ۲/۵ سانتی متر بالاتر از اسفنکتر داخلی مقعد قرار گیرد. بهترین وضعیت، خوابیدن به پهلو است.

**قرص زیر زبانی:** قرص‌های قلبی مخصوص را در گوشه دهان، بین گونه و دندان قرار دهید تا مواد آن آهسته آزاد و جذب شود.

## علائم اختصاری در نسخه نویسی

(آشنایی با چند اصطلاح دارویی)

\* علاوه بر شکل دارویی، نوع استفاده از داروها طبق دستور پزشک تعیین می‌شود. مثلاً آمپول‌ها می‌تواند وریدی، عضلانی یا موضعی استفاده شود بنابراین آشنایی با چند اصطلاح زیر مفید می‌باشد.

IM - یعنی داخل عضلانی (Intra Muscular)

Vag - یعنی داخل واژن (Vaginal)

IV - یعنی داخل وریدی (Intra Venous)

IA - یعنی داخل مفصل (Intra Articular)

IL - یعنی داخل ضایعه (Intra Lesional)

SC - یعنی زیر پوستی (Sub Cutaneous)

\* گاهی پزشکان به نحوی تعداد دفعات مصرف دارو را ذکر می‌کنند که برای بیمار ابهام‌آفرین است. این کلمات را توضیح می‌دهیم.

d ← یعنی daily (روزانه)      Hs, qpm ← (شبانه)

Bd یا BID ← (دوبار در روز)      PRN ← (به هنگام نیاز) (به هنگام درد)

QID ← (چهار بار در روز)      q6h ← (هر ۶ ساعت)

TDS یا TID (سه بار در روز) ← qod (یک روز در میان)

h ← (به ساعت)

\* وزن داروها یا میزان عددی داروها در غلظت خاص با علائم زیر نوشته می‌شود که گاهی در ساخت داروهای ترکیبی به ویژه پوست به کار می‌رود:

g ← گرم

mg ← میلی گرم

Mg ← میکروگرم

M ← مولار

ml ← میلی لیتر

\* زمان مصرف داروها با غذا هم مهم است. پزشک از اصطلاح p.c (aftermeal) به معنی بعد از غذا استفاده می‌کند. دقت در این موضوع بر روی میزان جذب دارو یا عوارض گوارشی ناشی از مصرف داروها مؤثر می‌باشد.

## ا - ث - ا (A.C.A)

نام تجاری: Excedrin

گروه دارویی: ترکیب استامینوفن + A.S.A + کافئین

گروه درمانی: ضد درد، ضد تب

📌 شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: دردهای خفیف تا متوسط، تب

📏 میزان مصرف: بالغین - یک قرص هر ۴ ساعت

موارد منع مصرف: زخم‌های گوارشی، آسم، بیماری‌های خونریزی

دهنده، فشار خون بالا و نارسایی کلیه و کبد

⚠️ عوارض جانبی مهم: ناراحتی گوارشی، تهوع و استفراغ - مهمترین

عارضه آن آسیب کلیوی است.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: توصیه به مصرف شیر یا آب با دارو - در

بیماران آسمی پولیپ بینی، تب یونجه و کهیر مزمن، ایجاد علائم

می‌کند، وزوز گوش می‌دهد.

آموزش بیمار - خانواده: (۱) با داروهای ضد اسید معده مصرف شود، (۲)

در درمان دردهای قبل از دوره ماهانه خانم‌ها بهتر است ۱ تا ۲ روز قبل

از شروع دوره ماهانه (قاعدگی) مصرف شود و (۳) با یک لیوان آب

مصرف شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک نگهداری شود.

☑️ نکته: این دارو در آرتریت روماتوئید، بیماری‌های قلبی و حملات مغزی

کاربرد دارد. در سه ماهه سوم حاملگی تجویز نشود.

## آکاربوز (ACARBOSE)

نام تجاری: precese

گروه دارویی: مهار کننده آلفاگلوکوزیداز

گروه درمانی: ضد دیابت (بیماری قند)

📦 شکل دارویی: قرص ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان کمکی در دیابت می باشد.

📏 میزان مصرف: بالغین ۲۵ میلی گرم ۳ بار در روز که قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو، بیماری سیروز کبدی و کتواسیدوز

دیابتی، بیماری التهابی روده، زخم روده بزرگ، نارسایی کلیه، حاملگی و

شیردهی (با احتیاط)

⚠️ عوارض جانبی مهم: درد شکم و اسهال، نفخ

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: باید دارو در آغاز غذا مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز عارضه گوارشی به پزشک

مراجعه شود. وزن کردن منظم نیز توصیه می شود.

شرایط نگهداری: دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه مناسب است.

✅ نکته: این دارو با داروهای قلبی، کورتیکو استروئید، قرص ضد بارداری و

داروهای اعصاب تداخل دارویی دارد.

مصرف همزمان آن با انسولین، باعث کاهش شدید قند خون می شود.

# استامینوفن (ACETAMINOPHEN)

نام تجاری: Paracetamol

گروه دارویی: مشتق پارا آمینوفنل

گروه درمانی: ضددرد غیرمخدر، ضدتب

📌 شکل دارویی: قرص، شربت، شیاف، قطره، ویال

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: دردهای خفیف، تب

📏 میزان مصرف: بالغین ۳۲۵ تا ۵۰۰ میلی گرم - کودکان ۱۲۰ تا ۲۴۰ میلی گرم

موارد منع مصرف: بیماری شدید کبدی، حساسیت دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: ضعف، خواب آلودگی، زخم دهانی، راش، ادرار

خونی یا کدر، درد شکمی، مشکلات خونی، یرقان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: قرص استامینوفن را می توان خرد کرد و

با مایعات دیگر مخلوط کرد و خورد. با شیرینی ها مصرف نشود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو با یک لیوان آب مصرف شود.

شرایط نگهداری: شیاف باید در یخچال و بقیه اشکال دارویی در دمای

۱۵ تا ۳۰ درجه و دور از نور نگهداری شود.

☑ نکته: در حاملگی و شیردهی عارضه خاصی گزارش نشده است. شیاف

آن برای بالغین نیز وجود دارد. مصرف مقدار بالای آن با مسمومیت

کبدی همراه است.

ویال: محفظه های شیشه ای حاوی دارو مثل پودر پنی سیلین یا


بی حس کننده های موضعی مثل لیدوکائین است.

## استامینوفن کدئینه (ACETAMINOPHEN CODEINE)

نام تجاری: Tylenol

گروه دارویی: ترکیب استامینوفن + کدئین

گروه درمانی: ضد درد + ضد تب

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درد خفیف تا شدید

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص هر ۴ ساعت

موارد منع مصرف: مثل استامینوفن و کدئین

⚠ عوارض جانبی مهم: مثل استامینوفن و کدئین

☑ نکته: برای کودکان زیر ۳ سال قابل تجویز نیست.



## استازولامید (ACETAZOLAMID)

نام تجاری: AK-ZOL (دیاموکس)

گروه دارویی: مهار کننده آنزیم کربنیک آنهیدراز

گروه درمانی: ضد گلوکوم، ضد تشنج، ضد ادم

شکل دارویی: قرص و آمپول - قرص ۲۵۰ میلی گرمی، تزریقی ۵۰۰

میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: گلوکوم ((آب سیاه) چشم (با زاویه باز) درمان نارسایی قلبی و ادم آن، بیماری حاد ارتفاع، تشنج (میوکلونیک)، جلوگیری از سنگ سازی کلیوی

میزان مصرف: در گلوکوم (چشمی) ۲۵۰ میلی گرم خوراکی ۱ تا ۴ بار در

روز؛ در ادم قلبی ۲۵۰ تا ۳۷۵ میلی گرم ۱ تا ۲ روز در میان؛ در تشنج ۸

تا ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن حداکثر یک گرم روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی، گلوکوم با زاویه بسته، کاهش

سدیم و پتاسیم بدن، بیماری کبدی، نارسایی غده فوق کلیه.

⚠ عوارض جانبی مهم: درد محل تزریق - مهمترین عارضه آن کم خونی و

کاهش گلبول سفید (WBC)، خواب آلودگی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: فشار داخل چشم بیمار را کنترل کنید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را صبح ها مصرف کنید. وزن خود را مرتب

اندازه گیری کنید.

شرایط نگهداری: هر چند در مخلوط شدن با آب تا یک هفته حفظ

چمی شود ولی بهتر است فقط ۲۴ ساعت اول از آن استفاده شود. در  
دمای اتاق نگهداری شود.

☑ نکته: تزریق وریدی (IV) بر عضلانی (IM) ارجح است.



# استیل کولین - کلراید (ACETYLCHOLIN CHOLORIDE)

نام تجاری: Miochol

گروه دارویی: آگونیست کولینرژیک (تحریک کننده گیرنده کولینرژیک عضلات)

گروه درمانی: تنگ کننده مردمک

شکل دارویی: آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: برای عمل جراحی عدسی چشم (کاتاراکت = آب مروارید)  $0.5\%$  تا ۲ میلی لیتر از محلول آن در اتاقک قدامی چشمی ریخته می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، التهاب عنیه

⚠ عوارض جانبی مهم: آتروفی عنیه چشم، کدورت عدسی چشم، اختلال

دید، کاهش فشار خون - شایعترین عارضه، اشکال در تنفس، تعریق

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این محلول ناپایدار است بنابراین کادر درمانی باید بداند مابقی دارو دور ریخته شود.

آموزش بیمار - خانواده: سوزش چشم و سردرد جزء عوارضی همراه است باید به بیمار خاطر نشان کرد. در صورت گر گرفتگی و تعریق به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه مناسب است.

☑ نکته: محلول هایی که شفاف نیستند یا از زمان مصرف آنها گذشته باشد نباید استفاده شوند.

## استیل سیستئین (ACETYL CYSTEINE)

نام تجاری: Parvolex

گروه دارویی: ترکیبات اسید آمینه (آل - سیستئین)

گروه درمانی: آنتی دوت استامینوفن (ضد و خنثی کننده استامینوفن)

⊗ شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: هرگاه فردی با استامینوفن مسموم شده باشد، کاربرد دارد.

⚖ میزان مصرف: ۱۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در ۲۰۰ میلی لیتر

محلول قند ۵٪ طی ۱۵ دقیقه

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، احتیاط در مورد آسم و سالمندان و حامله ها

⚠ عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، کهیر، تهوع، اسپاسم راه هوایی، بالا و پایین رفتن فشار خون

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با اکسیژن و مواد اکسید کننده

ناسازگار است و با اریترومایسین و آمفوتریسین تداخل دارویی دارد.

آموزش بیمار - خانواده: پیش از غذا و پیش از خواب مصرف شود. ویال باز شده دارو تا ۹۶ ساعت مصرف شود. در صورت تهوع و استفراغ به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

☑ نکته: میزان مسمومیت زایی استامینوفن ۷/۵ گرم در روز و اطفال ۱۴۰

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم می باشد. اگر زمان مسمومیت کمتر از ۴ ساعت باشد شارکول فعال (زغال طبی) مفید است.

# آسیکلوویر (ACICLOVIR)

نام تجاری: Zovirax

گروه دارویی: نوکلئوزید پورین (صناعی)

گروه درمانی: ضد ویروس

شکل دارویی: قرص، پماد، تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضایعات تب خال ناشی از ویروس هرپس، عفونت‌های

اولیه و عود کننده جلدی در پوست و چشم، زونا و آبله مرغان

میزان مصرف: تزریقی، بالغین: انفوزیون وریدی، ۵ تا ۱۰ میلی گرم به

ازای هر کیلوگرم به مدت ۷ تا ۱۰ روز و خوراکی: ۲۰۰ میلی گرم هر ۴

ساعت ۵ بار در روز به مدت ۱۰ روز و نوع چشمی پماد آن هر ۴ ساعت

یک بار بر روی ملتحمه مالیده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، موارد احتیاط در نارسایی کلیه،

اختلال عصبی، اختلال کبدی، بیماری ریوی، اختلال مایع و الکترولیت

عوارض جانبی مهم: سرگیجه، تهوع و استفراغ، اختلال عملکرد

(کلیوی)، راش و عوارض خونی

توجهات پزشکی - پرستاری: عوارض دارو در نوع مصرف وریدی

بیشتر است. بیمار در حین مصرف خوراکی و تزریقی باید مایعات کافی

دریافت کند. عملکرد کلیه BUN، Cr، آزمایش‌های خونی (CBC) و پلاکت

باید کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: آسیکلوویر را باید با غذا یا با معده خالی

مصرف کرد. مخلوط کردن با شیر باعث کاهش اثر آن می شود. موضع بیمار پوستی را باید با آب و صابون شست. در صورت هرگونه عارضه باید به پزشک اطلاع داده شود.

شرایط نگهداری: در ظروف مقاوم به نور و در حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود. نوع پماد موضعی را در دمای اتاق نگهدارید.



# آسیترتین (ACITRETIN)

نام تجاری: Soriatane

گروه دارویی: ترکیب رتینوئید (ویتامین A)

گروه درمانی: ضد آکنه - ضد پسوریازیس

شکل دارویی: کپسول ۱۰ و ۲۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: ضایعات پوستی پسوریازیس، اختلال کراتینیزاسیون  
میزان مصرف: بالغین روزانه ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم از راه خوراکی همراه با غذا

موارد منع مصرف: خانم‌های باردار، دوران شیردهی، موارد احتیاط:  
اختلال عملکرد کبد هپاتیت، دیابت شیرین، چاقی مفرط، بیماری عروق  
کرونر، بیماری کلیوی، بیماری تخریب مفصلی

عوارض جانبی مهم: سردرد، افسردگی، پوسته‌ریزی، ریزش مو، آتروفی،  
زخم دهانی و مهمترین عارضه آن تشنج و ادم عمومی

توجهات پزشکی - پرستاری: دارو یکبار مصرف شود. بیماران مصرف  
کننده این دارو حداقل باید ۱ تا ۳ سال پس از قطع دارو از خون دادن  
پرهیز کنند. عملکرد کلیه و کبد باید کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز علائم چشمی به پزشک مراجعه  
شود. بارداری تا ۳ سال ممنوع است. بیمار نباید در معرض نور آفتاب قرار گیرد.  
شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه و در جای خشک نگهداری  
شود.



## استیل سالیسیلیک اسید (A.S.A)

نام تجاری: Aspirin

گروه دارویی: سالیسیلات

گروه درمانی: ضد درد، ضد تب، ضد التهاب، مانع تجمع پلاکت‌های خونی

شکل دارویی: قرص، شیاف

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: آرتریت (التهاب مفاصل)، درد خفیف، تب، حمله مغزی، حمله قلبی

⚠ میزان مصرف: در انواع بیماری‌ها میزان مصرف متفاوت است مثلاً در آرتریت مفاصل ۲/۶ تا ۵/۲ گرم از راه خوراکی، در تب ۳۲۵ تا ۶۵۰ میلی‌گرم و در پیشگیری از حملات مغزی ۶۵۰ میلی‌گرم خوراکی ۲ بار در روز

موارد منع مصرف: در کودکان مبتلا به آبله مرغان و حساسیت مفرط و در آسم، حساسیت به پوره سیب‌زمینی و مبتلایان به کهیر مزمن و زخم گوارشی و خونریزی معده و روده ممنوع است ولی در سه ماهه سوم حاملگی با احتیاط مصرف شود. در بیماری‌های کبدی با احتیاط مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: راش، وزوز گوش، کاهش شنوایی، خونریزی گوارشی کلیوی، مشکل انعقادی، علائم کبدی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: حتماً همراه دارو شربت معده یا آب میوه

یا یک لیوان آب تجویز کنید. قرص‌های پوشش دار نباید جویده شود. آموزش بیمار - خانواده: دارو دور از دسترس کودکان قرار گیرد. در صورت بروز خونریزی از لثه و دستگاه گوارش به پزشک مراجعه شود. دارو با معده خالی مصرف نشود. شرایط نگهداری: در درجه حرارت معمولی ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



## آدنوزین (ADENOSINE)

نام تجاری: Adenocard

گروه دارویی: نوکلوئوزید

گروه درمانی: ضد آریتمی - داروی کمک تشخیصی

📦 شکل دارویی: تزریقی (آمپول)

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حملات تکیکاردی قلبی (PAT)

⚡ میزان مصرف: میزان مصرف اولیه ۶ میلی گرم به صورت یکجا و سریع طی ۱ تا ۲ دقیقه و در صورت لزوم تکرار شود.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، بلوک قلبی درجه ۲ و ۳ و بیماری سینوس بیمار - در مورد بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: تاری دید، سرگیجه، درد قفسه سینه، و مهم‌ترین عارضه آریتمی قلبی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: وضعیت بیمار باید تحت مونیترینگ

کنترل شود. دارو باید بی رنگ و شفاف باشد. محلول آدنوزین باید فاقد بلور باشد، این دارو فاقد ماده نگهدارنده است و مانده آن باید دور ریخته شود.

آموزش بیمار - خانواده: - نوشیدن قهوه بعد از مصرف دارو مفید نیست. در صورت بروز درد سینه به پزشک مراجعه شود. پس از مصرف دارو بر افروختگی صورت بروز می کند. حملات برونکو اسپاسم ممکن است بروز کند.


شرایط نگهداری: از یخ زدن دارو جلوگیری و در زمان مصرف باید در حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

# آدالت کولد = قرص سرماخوردگی بزرگسالان (ADULT COLD)

نام تجاری: Corisan

گروه دارویی: ترکیب استامینوفن + کلرفنیرامین + فنیل افرین

گروه درمانی: ضد سرماخوردگی

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C یا B

موارد مصرف: سرما خوردگی + علائم آنفلوآنزا و سینوزیت

غلظت میزان مصرف: ۲ قرص و هر ۴ تا ۶ ساعت

موارد منع مصرف: موارد منع مصرف ندارد.

⚠ عوارض جانبی مهم: مشکل خاصی گزارش نشده است.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: به بیمار توصیه شود هر بار ۲ عدد قرص مصرف نماید.

آموزش بیمار - خانواده: به علت وجود مواد فوق باعث کاهش تب می شود و به علت داشتن مواد ضد هیستامین باعث بهبود احتقان و آبریزش بینی می شود. البته بهتر است در سینوزیت حاد استفاده نشود زیرا باعث افزایش غلظت ترشحات می شود و تخلیه آنها را مشکل می کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## آلبندازول (ALBENDAZOL)

نام تجاری: Albenza

گروه دارویی: ترکیب بنزایمیدازول

گروه درمانی: ضد کرم وسیع الطیف

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان کرم تنیاسولیوم (سیستی سرکوزیس) و بیماری هیداتید

میزان مصرف: در کیست هیداتید ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم که در دو مرحله در روز استفاده می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، حاملگی ولی در زنان شیرده با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، عوارض خونی، راش، کهیر، عوارض کبدی

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو باید با غذا استفاده شود. شمارش گلبول های خونی در طول مصرف می بایست کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو خوراکی مصرف می شود. زنان نباید تا یک ماه پس از مصرف حامله شوند. انواع ضایعات شبکیه (رتین) چشم جزء مواردی است که بیمار باید به اطلاع پزشک برساند. شرایط نگهداری: در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه نگهداری شود.

# آلبومین (انسانی) (ALBUMIN HUMAN)

نام تجاری: Albuminar

گروه دارویی: مشتقات خونی

گروه درمانی: افزایش دهنده‌های حجم پلاسما

⑤ شکل دارویی: تزریقی (انفوزیون)

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: شوک، سوختگی، کاهش پروتئین، افزایش بیلی روبین  
غلظت میزان مصرف: در شوک ۵۰۰ میلی‌متر محلول ۵٪ شروع می‌شود.

در سوختگی بر اساس شدت و درجه سوختگی متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت به آلبومین، آنمی شدید، نارسایی احتقانی  
قلب ولی در نارسایی کلیه یا ریه با احتیاط مصرف شود.

✳ عوارض جانبی مهم: سردرد، فشار خون بالا، ادم ریوی، تاکیکاردی،  
کهیر، استفراغ

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در موارد افزایش بیلی روبین در کودکان  
توجهات خاص لازم دارد. میزان مصرف در نوزادان و شیرخواران ۱ گرم  
به ازای هر کیلوگرم است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت علائم افزایش حساسیت به پزشک  
و پرستار اطلاع دهید.


شرایط نگهداری: در یخچال نگهداری شود.

## آلندرونات (ALENDRONATE)

نام تجاری: Fosamax

گروه دارویی: مهار کننده باز جذب عملکرد سلول های استخوانی

گروه درمانی: ضد پوکی استخوان

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان پوکی استخوان (استئوپوروز) در سن یائسگی،


بیماری پاژه استخوانی (بیماری که شبیه دوره سالمندی، استخوان ها

دچار تغییرات در میزان مواد معدنی می شوند).

میزان مصرف: قرص های روزانه ۱۰mg

موارد منع مصرف: هیپوکالسمی - نارسایی کلیه منع مصرف دارد ولی در

مشکلات گوارشی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی مهم: سردرد، نفخ، درد عضلانی - استخوانی، زخم مری 

توجهات پزشکی - پرستاری: با آنتی اسید مصرف نشود. این دارو باعث 

علائم گوارشی می شود به ویژه هنگامی که با داروهای ضد درد غیر

استروئیدی مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: نیم ساعت بعد از مصرف بیمار نخوابد. نیم

ساعت قبل از غذا دارو را مصرف نماید. بین مصرف بین دارو و غذای

حاوی کلسیم باید حداقل ۲ ساعت فاصله باشد.

شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک نگهداری شود.

# آلو پورینول (ALLO PURINOL)

نام تجاری: Lopurin

گروه دارویی: مهار کننده آنزیم گزانتین اکسیداز

گروه درمانی: ضد نقرس

📦 شکل دارویی: قرص ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: نقرس که یک نوع آرتریت مرتبط با افزایش اسیداوریک است و درمان عوارض کلیوی نقرس، سنگ های کلیوی اگزالات کلسیم ⚠️ میزان مصرف: ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم روزانه و در موارد شدید ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی گرم در روز

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، هموکروماتوز ولی در موارد حاملگی و شیردهی و نارسایی کلیه و حمله حاد نقرس با احتیاط مصرف شود.

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، گزگز دست و پا، راش، عارضه خونی، کهیر و تهوع

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در حین و قبل از شروع درمان، آزمایش خون انجام دهید.

آموزش بیمار - خانواده: بعد از غذا دارو مصرف شود. بهتر است در طول درمان بیمار از غذاهای قلیایی استفاده کند. در صورت بروز عوارض به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه مطلوب است.



## آلپرازولام (ALPRAZOLAM)

نام تجاری: Xanax

گروه دارویی: بنزودیازپین‌ها

گروه درمانی: ضد اضطراب، خواب آور

📌 شکل دارویی: قرص ۰/۵ و ۱ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اضطراب و حمله ترس

⚠️ میزان مصرف: ۰/۲۵ تا ۰/۵ میلی گرم سه بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت به این گروه از داروها، گلوکوم حاد زاویه

بسته، دوران حاملگی

⚠️ عوارض جانبی مهم: سرگیجه، خواب آلودگی، تاکیکاردی، مشکلات

تنفسی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: به بیمار توصیه می شود در هنگام مصرف

دارو از رانندگی بپرهیزد.

آموزش بیمار - خانواده: خواب آلودگی به ویژه در سالمندان باید تذکر

داده شود.


شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

# آلومینیوم هیدرواکساید (ALUMINIUM HYDROXID)

نام تجاری: Alegel

گروه دارویی: ملح (نمک) آلومینیوم

گروه درمانی: آنتی اسید

شکل دارویی: قرص و شربت 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آنتی اسید، کنترل اسید (کنترل و کاهش اسیدیتی معده)

و افزایش فسفات خون در نارسایی کلیه

⚠ میزان مصرف: ۶۰۰ میلی گرم از راه خوراکی

موارد منع مصرف: کاهش فسفات خون، نارسایی کلیه، یبوست، اسهال

مزمن ولی در هموروئید و سالمندان با احتیاط مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: یبوست، مسمومیت با آلومینیوم، بی‌اشتهایی و

ضعف عضلانی

⚠ توجهات پزشکی-پرستاری: در مورد علائم کاهش فسفات مثل ضعف

و بی‌حالی هشدار داده شود.

آموزش بیمار-خانواده: کاهش اشتها و یبوست را به بیمار باید تذکر

دهید.

شرایط نگهداری: درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه مطلوب است.

## آلومینیوم منیزیوم (ALUMINIUM Mg)

نام تجاری: Almox

گروه دارویی: آنتی اسید

گروه درمانی: آنتی اسید

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آنتی اسید در درمان تحریک دستگاه گوارش یا زخم معده مصرف می شود.

میزان مصرف: انواع قرص آن، ۱ تا ۴ عدد در روز استفاده می شود.

موارد منع مصرف: نارسایی کلیه، یبوست و انسداد روده

عوارض جانبی مهم: یبوست، اسهال، تنوع و کاهش اشتها

توجهات پزشکی - پرستاری: مصرف داروهای ضد انعقادی خوراکی

مثل وارفارین باعث کاهش جذب این دارو می شود.

آموزش بیمار - خانواده: یبوست جزء عوارض ناخواسته است.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه نگهداری شود.

نکته: بیمار در صورت مشاهده مدفوع قیری به پزشک اطلاع دهد.

# آلومینیوم ام. جی. اس (ALUMINIUM.Mg.S)

نام تجاری: Magel

گروه دارویی: آنتی اسیدها

گروه درمانی: ضد نفخ

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان نفخ و کاهش اسید معده

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص یا ۵ تا ۱۰ میلی لیتر از شربت

(سوسپانسیون)

موارد منع مصرف: آپاندیسیت، نارسایی کلیه، یبوست.

عوارض جانبی مهم: کاهش اشتها، تهوع و استفراغ

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت تداوم خونریزی معده یا مشکل

دیگر به پزشک مراجعه شود.

آموزش بیمار - خانواده: هر ۲ تا ۴ ساعت بین غذا و هنگام خواب

استفاده شود.

شرایط نگهداری: در شرایط معمولی و در جای خشک و خنک نگهداری


شود.

## آمانتادین (AMANTADINE HCL)

نام تجاری: Symmetrel

گروه دارویی: آمین‌های حلقوی

گروه درمانی: ضد ویروس، ضد پارکینسون

شکل دارویی: کپسول ۱۰۰ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: پیشگیری و یا درمان علامتی آنفلوآنزا ناشی از ویروس

تیپ A، درمان عوارض دارویی (واکنش اکسترا پیرامیدال) و پارکینسون

⚠ میزان مصرف: در آنفلوآنزا ۲۰۰ میلی گرم روزانه و در پارکینسون ۱۰۰

میلی گرم دوبار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی ولی در موارد تشنج، مسائل

روانی، نارسایی کلیوی، تشنج و بیماری قلبی - عروقی و زنان حامله با

احتیاط مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: افسردگی، سرگیجه، توهّم، کاهش فشار خون،

خشکی دهان، عوارض خونی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: میزان ادرار و سلول‌های خونی حین

مصرف باید کنترل شوند.

آموزش بیمار - خانواده: پس از مصرف به علت خواب آلودگی، کار

دقیق و رانندگی ممنوع است. به علت خشکی دهان از مایعات برای

شست‌وشوی دهان استفاده شود.

شرایط نگهداری: در درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه باید نگهداری شود.

# آمیکاسین (AMIKACIN SULFAT)

نام تجاری: Amikin

گروه دارویی: آمینو گلیکوزیدها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

📌 شکل دارویی: آمپول ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونت‌های خطرناک دستگاه ادراری، استخوان، پرده مغز و دستگاه تنفس

💊 میزان مصرف: روزانه ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن از راه عضلانی یا انفوزیون وریدی با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر سرم و دکستروز ۵٪ رقیق شده و در مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه انفوزیون شود (سه بار در روز).  
موارد منع مصرف: حساسیت به داروهای گروه آمینو گلیکوزیدها ولی در نارسایی کلیه و بیمار با وزوز گوش و کاهش شنوایی و مبتلایان به پارکینسون و کاهش کلسیم و کودکان و سالمندان با احتیاط مصرف شود.  
⚠️ عوارض جانبی مهم: مشکل عضلانی و مهار تنفسی، مشکلات شنوایی و نارسایی کلیه

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: مشکل و اختلال تنفسی ممکن است بروز نماید. در زمان تزریق محلول باید شفاف باشد. بیمار پس از دوره درمانی و حین آن از نظر کلیه و شنوایی آزمایش شود.  
آموزش بیمار - خانواده: در صورت هر گونه سرگیجه و اختلال شنوایی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## آمیلوراید (AMILORIDE-H)

نام تجاری: Moduretic

گروه دارویی: دیورتیک‌ها (مدر)

گروه درمانی: ضد فشار خون

⑤ شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: فشارخون (هیپرتانسیون) و ادم (تورم عمومی) ناشی از نارسایی قلبی

⚠ میزان مصرف: روزانه یک قرص (خوراکی) و حداکثر ۴ قرص روزانه  
موارد منع مصرف: حساسیت دارویی، بیمارانی که دچار افزایش پتاسیم خون هستند زیرا این دارو نگهدارنده پتاسیم می‌باشد، نارسایی کلیه به ویژه در بیماران مبتلا به دیابت (قندی)

⚠ عوارض جانبی مهم: سردرد، ضعف، افزایش پتاسیم (K) خون، درد عضلانی، ناتوانی جنسی، درد شکمی، کاهش فشار خون وضعیتی و یبوست

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: سطح پتاسیم و عملکرد کلیه باید کنترل شود. در افراد سالمند باید نوار قلب (ECG) گرفته شود.  
آموزش بیمار - خانواده: دارو را به همراه غذا مصرف کنید. دارو بهتر است صبح‌ها مصرف شود چون حجم و دفعات ادرار را زیاد می‌کند. مصرف آن در شب‌ها موجب اختلال در خواب بیمار می‌شود. بیمار از مصرف غذای حاوی پتاسیم پرهیز کند. به علت عارضه سرگیجه، بیمار رانندگی نکند.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

# آمینوکاپروئیک اسید (AMINOCAPROIC ACID)

نام تجاری: Amicar

گروه دارویی: گروه اسید کربوکسیلیک

گروه درمانی: مهار فیبرینولیزیس

شکل دارویی: آمپول (تزریقی)

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: خونریزی شدید و حاد و ناشی از هیپر فیبرینولیزیس (افزایش آن)، کاهش پلاکت خون و درمان مسمومیت با استرپتوکیناز یا اوروکیناز

میزان مصرف: در ساعت اول ۴ تا ۵ گرم از راه وریدی و پس از آن ۱ گرم در ساعت انفوزیون شود. در خونریزی شدید ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در ساعت اول

موارد منع مصرف: نوزادان، بیماری انعقادی منتشر، عروقی (DIC)، وجود لخته های فعال داخل عروق خونی

عوارض جانبی مهم: تشنج، سرگیجه، ضعف، درد عضلانی، درد شکمی و نارسایی کلیه

توجهات پزشکی - پرستاری: محل تزریق را چند دقیقه فشار دهید زیرا ممکن است از محل تزریق نشت بکند.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت کاهش حجم ادرار به پزشک اطلاع دهید. به علت کاهش فشار خون به بیمار آموزش داده شود تا از وضعیت خوابیده به صورت ناگهانی سرپا نایستد.

شرایط نگهداری: از یخ زدن دارو جلوگیری و در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه نگهداری شود.



## آمینو اسید (AMINO ACID)

گروه دارویی: آمینو اسیدها

گروه درمانی: تغذیه داخل وریدی و پرکاری

شکل دارویی: تزریقی ۵ و ۱۰ درصد ۱ لیتری

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: افراد دچار سوء تغذیه یا مشکلات تغذیه‌ای ناشی از کمبود پروتئین و کالری

میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۱/۷ گرم به ازای هر کیلوگرم از راه ورید که همراه با دیگر مواد (الکتrolیت‌ها) مصرف می‌شود.

موارد منع مصرف: نارسایی شدید کلیه، کبد و مشکلات مغزی (آنسفالوپاتی)، افزایش آمونیوم خون

عوارض جانبی مهم: سرگیجه، ادم ریه، افزایش فشار خون، راش پوستی، افزایش جبرانی قند خون و تب

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: پزشک معالج باید ویتامین K هم به رژیم اضافه کند (هفته‌ای ۱۰ میلی گرم). علائم حیاتی بیمار توسط پرستار کنترل شود. آزمایش‌های خون و کبد و کلیه و قند بررسی شوند.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت تب و علائم خاص مثل درد و تورم محل تزریق به پزشک یا پرستار اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

☑️ نکته: این دارو حاوی بیش از ۲۰ نوع اسید آمینه می‌باشد. تجویز ویتامین K باید جداگانه انجام گیرد.

# آمینو گلو تیتیماید (AMINO GLUTETHIMIDE)

نام تجاری: Cytadren

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: ضد سرطان (ضد غدهٔ آدرنال)

شکل دارویی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: افزایش هورمون یا پرکاری غدهٔ فوق کلیوی، در درمان (فرعی) سرطان پستان و سرطان پروستات (در مردان) و مهار عملکرد این غده در بیماری کوشینگ

میزان مصرف: یک قرص ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو ولی در موارد سالمندان و عفونت‌ها و زنان حامله و شیرده با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی مهم: عوارض خونی، سردرد، سرگیجه، راش پوستی، تهوع و بالا رفتن فشار خون و پر مویی

توجهات پزشکی-پرستاری: این دارو می‌بایست در بیمارستان مصرف شود. آزمایش‌های خونی کنترل شوند.

آموزش بیمار-خانواده: در افراد مسن این دارو با خطر بالاتری همراه است. تهوع و استفراغ به تدریج بهبود می‌یابد. رانندگی و کارهای دقیق در زمان مصرف ممنوع است.

شرایط نگهداری: دور از نور و حرارت اتاق نگهداری شود.

نکته: سرطان یا بدخیمی یکی از بیماری‌های غدد و اعضای بدن است که عضو مربوطه دچار رشد سریع و بیش از انتظار و غیر قابل کنترل می‌شود.

## آمینوفیلین (AMINOPHYLINE)

نام تجاری: Amoline

گروه دارویی: مشتقات گزانتین

گروه درمانی: بازکننده ریه (برونش)، ضد آسم

📌 شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آسم، تنگی راه‌های هوایی (ریه)، نارسایی احتقانی قلب و توقف تنفسی (آپنه) نوزادان

⚠️ میزان مصرف: یک میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم و در سالمندان ۰/۶

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت انفوزیون وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به گروه گزانتین‌ها، نامنظمی قلبی، کاهش کارکرد تیروئید (هیپوتیروئیدی) ولی در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی، بیمار دیابت قندی، گلوکوم و فشار خون و زخم معده و روده با احتیاط مصرف شود.

⚠️ عوارض جانبی مهم: افزایش ضربان قلب، لرزش دست، تشنجه، ایست قلبی

⚠️! توجهات پزشکی - پرستاری: نباید دارو سریعاً انفوزیون شود زیرا باعث ایست قلبی می‌شود. در صورت تغییر رنگ نباید مصرف شود. در صورت افزایش ضربان قلب به پزشک اطلاع دهید زیرا نشانه مسمومیت دارویی است. آموزش بیمار - خانواده: بیماران باید استعمال سیگار را قطع کنند. همزمان مصرف نوشابه و غذاهای حاوی گزانتین ممنوع است. شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

# آمیدارون (AMIODARONE)

نام تجاری: Cordaron

گروه دارویی: گروه بنزوفوران

گروه درمانی: ضد آریتمی بطن یا دهلیز (قلبی)

📌 شکل دارویی: قرص و آمپول (۲۰۰ و ۱۵۰ میلی گرمی)

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بی نظمی ریتم قلبی (آریتمی) در بطن یا فوق بطن،

فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی

📌 میزان مصرف: دوز یا میزان شروع کننده اولیه روزانه ۸۰۰ تا ۱۶۰۰

میلی گرم از راه خوراکی به مدت یک تا ۳ هفته و میزان مصرف

نگهدارنده ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلی گرم در روز

موارد منع مصرف: بلوک قلبی درجه ۲ و ۳ و کم کاری قلبی

(برادیکاردی) و اختلال عملکرد گروه (S.A) ولی در موارد نارسایی کبدی

یا ریوی و تیروئید و کودکان با احتیاط مصرف شود.

⚠️ عوارض جانبی مهم: بی نظمی جدید در ریتم قلبی، آسیب کبدی، عارضه

ریوی نوروپاتی محیطی، سر درد و حساسیت به نور و اختلال بینایی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در مورد علائم گوارشی در ابتدای درمان

هشدار دهید. در مصرف وریدی (انفوزیون)، اندازه گیری فشار خون بیمار

باید مدنظر باشد.

آموزش بیمار - خانواده: به بیمار آموزش دهید تا نبض خود را روزانه

اندازه بگیرد. تا ۴ ماه پس از قطع دارو نباید در معرض نور قرار گیرد.

تست های ریوی و چشمی بعد از مصرف ضروری است.

شرایط نگهداری: دور از نور و در دمای معمولی نگهداری شود.

## آمی تریپ تیلین (AMITRIPTYLINE HCL)

نام تجاری: Amitril

گروه دارویی: ضد افسردگی (تری سیکلیک)

گروه درمانی: ضد افسردگی (اعصاب روان)

شکل دارویی: قرص های ۱۰، ۲۵ و ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: افسردگی یا پایین بودن خلق و به صورت فرعی در عوارض افسردگی مثل بی اشتها یا پر اشتها و دردهای با ریشه عصبی

میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم روزانه (سه بار یا به صورت میزان واحد در شب). در نوجوانان روزانه ۳۰ میلی گرم از راه خوراکی در دفعات (حداکثر ۱۵۰ میلی گرم روزانه)

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط تنفسی، مصرف دارو بعد از شروع داروهای مهار کننده (MAO) ولی در اختلالات ریوی، کلسیم، تشنج و بیماری دو قطبی، دیابت قندی و بیماری پارکینسون و کلیه و کبد با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی مهم: آریتمی قلبی (بی نظمی های ریتم قلب)، شوک، بلوک قلبی، خواب آلودگی، یبوست، احتباس ادرار، کاهش میل جنسی، تهوع، تعریق، تاری دید

توجهات پزشکی - پرستاری: داروها همراه یا بلافاصله بعد از غذا مصرف شوند. CBC (شمارش گلبول های خون) و عملکرد کلیه و قلب

باید بررسی شوند.

آموزش بیمار - خانواده: داروها همراه یا بلافاصله بعد از غذا مصرف شوند. احتباس ادرار - خشکی دهان یا یبوست را به بیمار متذکر شوید. ممکن است رنگ ادرار به آبی یا متمایل به سبز تغییر یابد. حتی الامکان به بیمار توصیه شود در هنگام خروج از منزل از عینک آفتابی استفاده کند.


شرایط نگهداری: دارو در ظروف مقاوم و دور از نور نگهداری شود.

## آملودیپین بزیلات (AMLODIPINE)

نام تجاری: Norvasc

گروه دارویی: بلوک کننده‌های کانال کلسیم

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در درمان آنژین (درد قلبی) و درمان فشار خون استفاده می‌شود.

میزان مصرف: روزانه ۵ تا ۱۰ میلی گرم خوراکی

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو ولی در تنگی آئورت، نارسایی قلبی و کبدی با احتیاط مصرف شوند.

عوارض جانبی مهم: سر درد، تپش قلب، تهوع، درد شکم، نفس تنگی و راش جلدی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: فشار خون و نبض را در حین درمان

کنترل کنید. در صورت بروز ادم شدید دارو را قطع کنید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را قبل و بعد از غذا مصرف کنید. در

صورت بروز یبوست و تپش قلب به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

# آمونیم کلراید (AMMONIUM CHLORIDE)

نام تجاری: Ammorchlor

گروه دارویی: یک نوع نمک اسیدی کننده

گروه درمانی: خلط آور و اسیدی کننده ادرار

⊗ شکل دارویی: قرص ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: دیورتیک (ادرار آور، اسیدی کننده آن)، خلط آور و حملات سرگیجه

⚠ میزان مصرف: ۴ تا ۱۲ گرم خوراکی هر ۴ تا ۶ ساعت یک بار

موارد منع مصرف: اختلالات شدید کبدی و کلیوی

⚡ عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، اختلالات الکترولیتی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در حین درمان وضعیت الکترولیت‌های سرم و ادرار را اندازه‌گیری کنید.

آموزش بیمار - خانواده: غذای حاوی پتاسیم به رژیم غذایی اضافه شود.

شرایط نگهداری: دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه مطلوب است.



## آموکسی سیلین (AMOXICILIN)

نام تجاری: Amoxil

گروه دارویی: آنتی بیوتیک (پنی سیلین ها)

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول، قرص، شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت دستگاه تنفس، ادراری

میزان مصرف: روزانه ۷۵۰ تا ۱۵۰۰ میلی گرم و در کودکان ۲۰ تا ۴۰

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم (تقسیم شده هر روز ۳ بار)

موارد منع مصرف: حساسیت به پنی سیلین، بیماران مبتلا به عفونت

مونو نوکلئوز و اختلال عملکرد کلیه

عوارض جانبی مهم: تشنج، اسهال، راش پوست، استفراغ

توجهات پزشکی - پرستاری: دارو را می توان قبل، حین و بعد از غذا

مصرف کرد ولی بهتر است با معده خالی مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: دوره درمان را کامل رعایت کنید.

شرایط نگهداری: دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه مطلوب است.

## آمفوتریسین - بی (AMPHOTERICIN-B)

نام تجاری: Fungizone

گروه دارویی: ضد قارچ (ماکرولیدها)

گروه درمانی: ضد قارچ و عفونت

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت‌های قارچی سیستمیک و مخاطره‌آمیز ناشی از

ارگانیسم‌های حساس هیستوپلاسموز، اسپریژیلوس

میزان مصرف: ابتدا یک میلی‌گرم از آمفوتریسین B در ۲۵۰ میلی لیتر

از محلول اکستروز پنج درصد رقیق کنید و طی ۲ تا ۴ ساعت از راه

وریدی انفوزیون کنید و در صورت عدم حساسیت روز بعد ۵ میلی گرم

در ۵۰۰ میلی لیتر و در ادامه روزانه ۵ تا ۱۰ میلی گرم به میزان دارو

اضافه کنید و دوره درمان با دارو را طی مدت تعیین شده ادامه دهید.

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو

عوارض جانبی مهم: سردرد، نوروپاتی، کاهش فشار خون، اختلالات

کلیوی و خونی

توجهات پزشکی - پرستاری: محلول را تا ۲۴ ساعت می‌توان نگهداری

کرد و می‌بایست آزمایش‌های الکترولیت و شمارش گلبول خونی و

عملکرد کبدی و کلیوی انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: در محل تزریق، درد و لخته شدن خون وجود

دارد.

شرایط نگهداری: دارو را در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهدارید و از یخ زدن آن

جلوگیری کنید.

## آمپی سیلین (AMPICILIN)

نام تجاری: Amcill

گروه دارویی: پنی سیلین ها (آمینوپنی سیلین ها)

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول و شربت و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های عمومی، دستگاه تنفس، سیستم ادراری،

عفونت پرده مغز (مننژیت)

میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۴ گرم از راه خوراکی یا هر ۴-۶ ساعت از راه

عضلانی یا وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت به پنی سیلین ها و عفونت مونو نوکلئوز

عوارض جانبی مهم: اسهال، اریتم (قرمزی) پوست، مشکل خونی،

عارضه کلیوی و تشنج

توجهات پزشکی-پرستاری: بهتر است محلول تزریقی آماده شده

حداکثر طی یک ساعت تزریق شود. انفوزیون وریدی طی ۱۰ تا ۱۵

دقیقه صورت گیرد. محلول دارو را می توان تا ۱۴ روز در یخچال

نگهداشت.

آموزش بیمار-خانواده: بیمار می بایست دوره درمان را کامل کند. بهتر

است دارو با معده خالی با یک لیوان آب مصرف شود. در صورت بروز

آلرژی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: کپسول و ویال (محلول تزریقی) در دمای ۱۵ تا ۳۰

درجه نگهداری شود.

## آمیل نیتريت (AMYL NITRITE)

گروه دارویی: نیترات‌ها

گروه درمانی: ضد مسمومیت با سیانیدها و گشاد کننده عروق

⑤ شکل دارویی: آمپول برای استنشاق

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درد قلبی (آنژین صدری) و درمان مسمومیت با سیانیدها  
⚠️ میزان مصرف: حساسیت شدید، کم خونی شدید (آنمی)، ضربه به سر،  
در موارد کاهش فشار خون، زنان باردار و پرکاری تیروئید و سکته قلبی  
که اخیراً اتفاق افتاده است با احتیاط مصرف شود.  
موارد منع مصرف: در موارد بروز آب سیاه چشم نیز با احتیاط استفاده  
شود.

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد شدید، کاهش فشار خون، تپش قلب، غش،  
تهوع، گرگرفتگی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با داروی ضد فشار خون و  
هستامین تداخل عملکرد دارد. برای شکستن آمپول آن را در یک  
پارچه بپیچانید.


آموزش بیمار - خانواده: آمیل نیتريت به شدت قابل اشتعال است. به  
بیمار یاد دهید از حالت دراز کش و خوابیده به طور ناگهانی نایستد.  
شرایط نگهداری: در درجه حرارت ۸ تا ۱۵ درجه نگهداری شود.

## آنتوسیانوزید (ANTHOCYANOSID A)

نام تجاری: Diffrarel - E

گروه دارویی: آنتوسیانوزید

گروه درمانی: درمان اختلالات عروق

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: مجاز

موارد مصرف: نارسایی وریدی - عروق لنفاوی به ویژه هنگامی که اختلالات عروقی شکننده باشد و خونریزی نقطه‌ای (پتشی واکیموز) خونمردگی ایجاد کند.

⚖️ میزان مصرف: ۳ تا ۶ قرص در روز به مدت ۲۰ روز در ماه

موارد منع مصرف: موردی ندارد.

☠️ عوارض جانبی مهم: گزارش نشده است.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو در شیردهی نیز مجاز می‌باشد.

آموزش بیمار - خانواده: مورد خاصی مطرح نیست.

شرایط نگهداری: در ظروف نفوذناپذیر و دور از نور نگهداری شود.

☑️ نکته: دوره درمان را می‌توان به مدت نامحدود تکرار کرد.


# فاکتور ضد هموفیلی

## (ANTIHEMOPHILIC FACTOR)

نام تجاری: Factorate

گروه دارویی: مشتقات خون

گروه درمانی: ضد هموفیلی A (فاکتور هشت)

شکل دارویی: تزریقی (ویال) 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کمبود فاکتور هشت (VIII)

غلظت میزان مصرف: ۱۰ تا ۲۰ واحد به ازای هر کیلوگرم از راه وریدی سریع

یا انفوزیون وریدی هر ۸ تا ۲۴ ساعت

موارد منع مصرف: بیماری کبدی و کودکان

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، اختلال هشیاری، ضایعات پوستی، تهوع،

لرز، تب

⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: علائم حیاتی بیمار را قبل، حین و بعد از

درمان کنترل کنید. در صورت افزایش ضربان قلب باید دارو را قطع یا

سرعت آن را کم کنید.

آموزش بیمار-خانواده: در صورت خونریزی از لثه یا مشاهده خون در

مدفوع یا ادرار به پزشک اطلاع دهید. به طور همزمان از مصرف

آسپیرین خودداری کند.

شرایط نگهداری: قبل از مصرف باید دارو در درجه حرارت اتاق ۲۰ تا

۳۰ درجه قرار بگیرد. فراورده خشک دارو در درجه حرارت ۲ تا ۸ درجه

نگهداری شود.

## آپو مورفین هیدروکلراید (APOMORPHIN HCL)

نام تجاری: Apomorphin Hcl

گروه دارویی: آلکالوئید (نمک)

گروه درمانی: استفراغ آور

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ایجاد استفراغ در مسمومیت‌های دارویی

غلظت میزان مصرف: ۲ تا ۱۰ میلی‌گرم از راه زیر جلدی یا عضلانی

موارد منع مصرف: در مسمومیت با قلیاها و مواد نفتی ممنوعیت مصرف دارد. در افراد مست و غیر هشیار ممنوع و در افراد دچار شوک و تشنج نباید مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: بی‌قراری، لرزش دست، خواب‌آلودگی، تهوع و نارسایی قلبی حاد و مشکل تنفسی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: استفراغ ظرف ۵ دقیقه بعد از تزریق ایجاد

می‌شود. علائم حیاتی بیمار تا ۲ ساعت بعد از تجویز کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار پس از تزریق ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌لیتر آب بنوشد. بیمار باید در وضعیتی قرار گیرد که احتمال آسپیراسیون مواد استفراغی به داخل ریه پیدا نکند.

شرایط نگهداری: دارو در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود. دارو در معرض نور فاسد می‌شود.

## آپروتینین (APROTININ)

نام تجاری: Trasylol

گروه دارویی: مهار کننده‌های آنزیم پروتئولیتیک

گروه درمانی: هموستاز (ضد خونریزی)

⑥ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: خونریزی ناشی از فیبرینولیز و التهاب حاد پانکراس  
⚠ میزان مصرف: جهت پیشگیری (پروفیلاکسی) ۲۰۰ هزار واحد قبل از  
جراحی از راه وریدی و سپس ۲۰۰ هزار واحد در حین جراحی و پس از  
آن هر ۴ ساعت همین اندازه لازم است و برای درمان ۵۰۰ هزار واحد  
در هر ساعت تکرار شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیوی  
✖ عوارض جانبی مهم: ایست قلبی، نارسایی قلبی، آمبولی مغزی، سکته  
مغزی و نارسایی کلیه

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مصرف آن فقط در بیماران با پیوند عروق  
کرونر قلب توصیه می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: مورد خاصی ندارد.

شرایط نگهداری: دمای ۲ تا ۲۵ درجه توصیه می‌شود.

☑ نکته: این دارو از طریق ورید مرکزی انفوزیون می‌شود.



## اشک مصنوعی (ARTIFICIAL TEARS)

نام تجاری: Adapettes

گروه دارویی: ترکیبات پلی وینیل الکل و سلولز

گروه درمانی: اشک مصنوعی

⑤ شکل دارویی: قطره

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: نارسایی ترشح اشک در چشم، خشکی چشم

Ⓐ میزان مصرف: یک قطره از محلول ۳ یا ۴ بار در روز یا بیشتر در چشم چکانده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط

Ⓢ عوارض جانبی مهم: تاری دید، سوزش چشم و رسوب در پلک

⚠ توجیهات پزشکی-پرستاری: هرگونه چشم درد، سردرد و قرمزی چشم به پزشک اطلاع داده شود.

آموزش بیمار-خانواده: از تماس نوک قطره چکان با پلک یا چشم خودداری شود. در صورت عدم بهبود طی ۲ روز به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در جای خنک نگهداری شود.

☑ نکته: این قطره (اشک مصنوعی) باعث مرطوب نگه داشتن چشم و افزایش ضخامت لایه اشکی می شود.

# آسپاراژیناز (ASPARAGINASE)

نام تجاری: Elspar

گروه دارویی: آنزیم

گروه درمانی: ضد سرطان (نتوپلاسم)

📌 شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در یک نوع سرطان خون (لوسمی منفوسیتی حاد)  
📌 میزان مصرف: ۲۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم از راه وریدی به مدت ۴ هفته

موارد منع مصرف: بیماران مبتلا به پانکراتیت و دچار حساسیت شدید  
⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، تشنج، اختلال هشیاری، مشکل کلیه‌ها، کبد و خون

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش‌های خونی و کلیه و کبد ضروری است. در حین تجویز دارو علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.  
آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز درد شکم، تهوع و استفراغ یا زردی یا تب و خونریزی و ادرار با حجم بالا و زخم دهان به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: بیمار باید از تماس با بیماران عفونی بپرهیزد و در محل شلوغ رفت و آمد نکند. ویال دارو در دمای پایین‌تر از ۸ درجه نگهداری شود.

☑️ نکته: این دارو یک آنزیم (آل - آسپارژین آمیدو هیدرولاز) است که هم تزریق عضلانی و هم تزریق وریدی دارد.

## آتَنولول (ATENOLOL)

نام تجاری: Tenormin

گروه دارویی: مسدود کننده گیرنده‌های بتا

گروه درمانی: ضد درد قلبی

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون (هیپرتانسیون) و دردهای قفسه سینه با منشأ قلبی (آنژین)

⚠ میزان مصرف: ابتدا روزانه ۵۰ میلی گرم خوراکی تجویز می‌شود سپس تا ۱۴ روز به ۱۰۰ میلی گرم می‌رسد.

موارد منع مصرف: بلوک قلبی درجه ۲ و ۳، شوک کاردیو ژنتیک (قلبی)، نارسایی قلبی

☠ عوارض جانبی مهم: ضعف عمومی، راش و ضایعات پوستی، ناتوانی جنسی، خشکی چشم‌ها، اسهال

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: نبض بیمار را کنترل کنید. به بیمار آموزش دهید از وضعیت خوابیده به صورت ناگهانی نایستد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را نباید ناگهانی قطع کنید. به بیمار در مورد افزایش احساس سرما بعد از مصرف آتنولول هشدار دهید.

شرایط نگهداری: دارو در ظروف در بسته و دمای معمولی ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

# آتور واستاتین (ATORVASTATIN)

نام تجاری: Lipitor

گروه دارویی: مهار کننده ۳ هیدروکسی ۳ متیل گلو تاریل کوآنزیم A

گروه درمانی: ضد چربی خون (کاهش LDL و کلسترول کامل)

شکل دارویی: قرص ۱۰-۲۰-۴۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان چربی خون، کاهش کلسترول و تری گلیسرید نوع اولیه و فامیلی

میزان مصرف: ابتدا با ۱۰ میلی گرم شروع می شود و می تواند تا ۸۰ میلی گرم افزایش یابد.

موارد منع مصرف: بیماری و نارسایی کبدی و دوران حاملگی و شیردهی ممنوعیت مصرف دارد.

عوارض جانبی مهم: سردرد، ضایعات جلدی، درد شکم، اسهال، درد کمر، سینوزیت و علائم آنفلوآنزا

توجهات پزشکی - پرستاری: در جوابدهی به درمان، سطح LDL اندازه گیری شود. این مورد دو هفته بعد از شروع درمان باید انجام شود. تست های کبدی ۶ تا ۱۲ هفته باید کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را می توان قبل یا بعد از غذا مصرف کرد. بیمار باید یاد بگیرد از روش های دیگر کم کردن چربی و وزن استفاده کند مثل: ورزش های منظم و محدودیت مصرف مواد غذایی.

شرایط نگهداری: دارو در حرارت ۲۰ تا ۲۵ درجه نگهداری شود.

## آتراكوريوم (ATRACURIUM)

نام تجاری: Tracrium

گروه دارویی: مسدود کننده عصبی - عضلانی

گروه درمانی: شل کننده های عضلات مخطط (اسكلتی)

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: طبقه بندی نشده است.

موارد مصرف: در بیهوشی، تسهیل در لوله گذاری، شل کردن عضلات

مخطط و کمک در بیهوشی عمومی

⚠️ میزان مصرف: بر اساس نیاز فرد از ۰/۴ تا ۰/۵ میلی گرم تزریق وریدی

مفید است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، آسم، بیماری عصبی -

عضلانی (میاستنی گراویس)

⚠️ عوارض جانبی مهم: کاش فشار خون، عوارض جلدی، مشکل تنفسی،

مشکل اختلال در تخلیه ترشحات ریه

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: میزان اولیه دارو در ۳۰ تا ۶۰ ثانیه

انفوزیون می شود.

آموزش بیمار - خانواده: تاریخچه حساسیت یا مشکلات عضلانی -

تنفسی را به پزشک بیهوشی اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود.

# آتروپین (چشمی) (ATROPIN SULFAT)

نام تجاری: Actonorm

گروه دارویی: از گروه آنتی کولینرژیک‌ها

گروه درمانی: گشاد کننده مردمک چشم

⑤ شکل دارویی: قطره و پماد چشمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضایعات چشمی مثل چسبندگی و التهاب در کیسول،

عنبیه و برای درمان آب سیاه چشم و برای گشاد کردن مردمک

⚠️ میزان مصرف: یک قطره از محلول ۱٪ یک تا سه بار در چشم چکانده

شود یا ۳/۰ سانتی متر از پمادروی ملتحمه مالیده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به دارو

⚠️ عوارض جانبی مهم: در صورت جذب سیستمیک می تواند باعث عارضه

شود بنابراین در افراد مسن و دچار نارسایی کلیه و کبد با احتیاط مصرف

شود. خشکی دهان، سردرد و استفراغ جزء عوارض جذب عمومی

می باشد.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: برای جلوگیری از تشدید فشار داخل

چشمی باید قبل و بعد از استفاده از قطره فشار کره چشم اندازه گیری

شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو ممکن است باعث تاری دید یا حساسیت

به نور شود.

شرایط نگهداری: دارو در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## آتروپین سولفات (ATROPIN SULFAT)

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک‌ها

گروه درمانی: ضد برادیکاردی و آریتمی و ضد مسمومیت، مواد سمی ارگانو فسفره (حشره کش‌ها)

📌 شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کم کاری قلبی (برادیکاردی) و بلوک قلبی و مهار رفلکس واگ (تحریک ناحیه گلو که باعث استفراغ می‌شود) قبل از عمل ۰/۵ تا ۱ میلی گرم از راه وریدی تزریق می‌شود و هر ۵ دقیقه حداکثر تا ۲ میلی گرم تکرار می‌شود.

⚠️ میزان مصرف: ۰/۵ تا ۱ میلی گرم از راه وریدی تزریق می‌شود و هر ۵ دقیقه و حداکثر تا ۲ میلی گرم تکرار می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، خونریزی حاد، آب سیاه چشم و در موارد نارسایی کبدی، کلیوی و قلبی با احتیاط مصرف شود. ☠️ عوارض جانبی مهم: خشکی دهان، تشنگی، یبوست، احتباس ادرار، سردرد و تپش قلب.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: علائم حیاتی مثل تعداد ضربان قلب و فشار خون را کنترل کنید. در سالمندان باید میزان کمتری تجویز شود. آموزش بیمار - خانواده: در صورت علائم خشکی دهان، غرغره آب و مصرف آدامس مفید است.

شرایط نگهداری: در درجه حرارت معمولی اتاق نگهداری شود.


☑️ نکته: این دارو در شکل تزریقی یکی از داروهای مفید در بیهوشی و اقدامات احیای قلب و ریه یا ایست‌های قلبی می‌باشد.

# آسپیرین (A.S.A)

نام تجاری: Aspirin

گروه دارویی: سالیسیلات‌ها

گروه درمانی: ضد درد، ضد تب و التهاب، ضد تجمع پلاکت

شکل دارویی: قرص، شیف 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درد، آرتریت (دردهای مفصلی)، ضایعات آمبولی

(لخته‌های خون در عروق) و حملات با نارسایی عروق مغزی (TIA) و

برای بیماران قلبی به منظور پیشگیری از لخته‌های پلاکتی

میزان مصرف: در بیماری‌های مختلف متفاوت است. در پیشگیری از

بیماری‌های قلبی یک قرص ۱۰۰ میلی گرمی، در آرتریت تا میزان

بالای ۴ تا ۸ گرم روزانه

موارد منع مصرف: آسم، افراد دارای سابقهٔ کهیر یا حساسیت شدید،

فاویسم (کمبود G6PD)، اختلالات خونریزی دهنده، کودکان مبتلا به

آبله مرغان و در نارسایی کلیه و کبد

عوارض جانبی مهم: مشکلات گوارشی، تهوع، خونریزی از معده،

نارسایی کلیوی، وزوز گوش

توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش‌های اولیهٔ کبد و کلیه باید انجام 

شود. وضع خونی بیمار باید کنترل شود. در صورت بروز علائم خارش و

زردی یا کهیر دارو را قطع کنید.

آموزش بیمار - خانواده: خونریزی یا تغییر رنگ مدفوع (قیری شدن



مدفوع) را اطلاع دهید. دارو را با غذا یا شیر میل کنید. آسپرین را بهتر است ۳۰ دقیقه قبل از غذا یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف کنید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.

☑ نکته: نوع کدئینه دارو دارای خاصیت ضد درد بیشتری است و عوارض و توجیهات مشابه A.S.A دارد.



# آستمیزول (ASTEMIZOLE)

نام تجاری: Hismanal

گروه دارویی: آنتی هیستامین

گروه درمانی: ضد حساسیت‌های غیر خواب آور

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: طبقه‌بندی نشده است.

موارد مصرف: حساسیت‌ها، کهیر، آلرژی (رینیت)

⚠️ میزان مصرف: در بالغین و کودکان بالای ۱۲ سال خوراکی ۱۰ mg/d

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، مصرف همزمان با ضد

قارچ‌ها مثل کتوکنازول و آنتی بیوتیکی مثل اریترومايسين

⚠️ عوارض جانبی مهم: سرگیجه، سردرد، یرقان، بی‌قراری، افزایش اشتها،

درد مفاصل

⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: در درمان دراز مدت دارو، آزمایش‌های

خونی و کلیوی ضروری است.

آموزش بیمار-خانواده: دارو را با معده خالی مصرف کنید. در صورت

بروز کاهش فشار خون به پزشک اطلاع دهید. خشکی دهان جزء

عوارض همراه است.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## آزاتیوپرین (AZATHIOPRIN)

نام تجاری: Imuran

گروه دارویی: آنتاگونیست متابولیسم پورین

گروه درمانی: سرکوب ایمنی - ضد رماتیسم

شکل دارویی: قرص و کپسول ۵۰ و ۲۵۰ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: در پیوند کلیه، سرکوب و مهار بیماری آرتریت روماتوئید

⚠ میزان مصرف: در پیوند کلیه میزان مصرف متفاوت است ولی در

بیماری رماتیسم مفصلی به میزان ۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن

۱ تا ۲ قرص مصرف می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید و حاملگی ولی در بیماری های

کبدی و کلیوی و مشکلات خونی با احتیاط مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع و استفراغ، مشکلات گلبول های خون، آسیب

کبدی، احتمال بروز خطر سرطان، یرقان (زردی) و خطر عفونت.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش های اولیه کلیوی و کبدی و خونی

ضروری است. کارکرد کلیه ها و میزان مایعات مصرفی و ادرار روزانه باید

اندازه گیری شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز ادرار تیره، زردی پوست

و چشم و خارش یا مدفوع روشن به پزشک اطلاع دهید. بیمار باید

در طول درمان صبور باشد به ویژه در رماتیسم مفصلی که جواب به

درمان ۳ تا ۴ ماه طول می کشد. هرگونه تب، اسهال یا خستگی شدید را

به پزشک گزارش دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

☑ نکته: این دارو سمیت شدید دارد و خطر بعضی از سرطان‌ها را در دراز مدت افزایش می‌دهد.



## باسیترا سین (BACITRACIN)

نام تجاری: AK-Tracin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک پلی پتید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

⑤ شکل دارویی: پماد چشمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: زخم قرنیه، التهاب و عفونت ملتحمه چشم

⚠ میزان مصرف: روزی یکبار یا بیشتر بر حسب دستور پزشک

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به دارو ولی در بیماران با میاستنی

گراویس با احتیاط مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: التهاب و تحریک موقتی، سوزش، خارش و کهیر

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تاریخچه حساسیت دارویی را از بیمار

پرسید. آزمایش های کلیوی برای تجویز ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: باید بیمار مایعات کافی بنوشد، در هنگام

مالیدن پماد به داخل پلک تحتانی، از تماس تیوب پماد با چشم

جلوگیری کنید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است. از یخ زدن دارو

جلوگیری نمایید.

## بکلوفن (BACLOFEN)

نام تجاری: Lioresal

گروه دارویی: مشتق کلروفنیل

گروه درمانی: شل کننده عضلات اسکلتی (مخطط)

⑤ شکل دارویی: قرص ۱۰ و ۲۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اسپاسم عضلات در بیماری‌های M.S (مولتیپل)

اسکلروزیس) و ضایعات نخاعی

⑤ میزان مصرف: ۴۰ تا ۸۰ میلی گرم در روز

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، تشنج، تهوع و استفراغ

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: - کنترل دروه‌ای قند خون و عملکرد کبد

ضروری است چونکه احتمال تشنج با این دارو بالاست. در بیماران

تشنجی مراقب باشید.

آموزش بیمار - خانواده: قطع ناگهانی دارو ممکن است باعث تشنج

بشود. دارو را با غذا میل کنید. از رانندگی باید اجتناب شود.

شرایط نگهداری: در درجه حرارت اتاق نگهداری شود.

## نمک متعادل شده (BALANCED SALT)

نام تجاری: B.S.S

گروه دارویی: الکترولیت

گروه درمانی: محلول شست و شوی چشم

شکل دارویی: محلول چشمی

مصرف در حاملگی: طبقه‌بندی نشده

موارد مصرف: شست و شوی چشم حین عمل جراحی

میزان مصرف: بر اساس نیاز و تشخیص پزشک

موارد منع مصرف: تزریق یا انفوزیون وریدی آن ممنوع است.

عوارض جانبی مهم: التهاب و تاول قرنیه، کدورت قرنیه

توجهات پزشکی - پرستاری: پرستاری می‌بایست سالم بودن ظرف

دارو، تاریخ مصرف و تاریخ انقضاء و شفاف بودن آن را کنترل کند.

آموزش بیمار - خانواده: پس از مصرف دارو را دور بریزید.

شرایط نگهداری: در دمای ۸ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

# محلول نمکی متعادل شده به همراه گلو تاتیون (BALANCED SALT - PLUS - GLUTATIONE)

نام تجاری: B.S.S Plus

گروه دارویی: الکترولیت

گروه درمانی: محلول شست و شوی داخل چشمی


شکل دارویی: محلول 


مصرف در حاملگی: طبقه بندی نشده

موارد مصرف: شست و شوی چشم حین عمل جراحی مثل آب مروارید  
(کاتاراکت)

میزان مصرف: براساس نیاز 

موارد منع مصرف: تزریق وریدی یا انفوزیون

عوارض جانبی مهم: مشابه مورد قبل 

توجهات پزشکی - پرستاری: استفاده از محلول باید به طریق استریل 

باشد. محلول تغییر رنگ یافته را دور بریزید.

آموزش بیمار - خانواده:

شرایط نگهداری: دارو در دمای ۸ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



## باریم (سولفات باریم) (BARIUM SULFAT)

نام تجاری: Baricon

گروه دارویی: ماده حاجب

گروه درمانی: ماده تشخیصی در ضایعات دستگاه گوارش

📌 شکل دارویی: پودر جهت ساختن محلول خوراکی یا از طریق مقعد (تنقیه)

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: رادیوگرافی معده و روده بزرگ و کوچک و مری

⚠️ میزان مصرف: در بالغین در معده ۶۰ تا ۴۵۰ گرم و در روده بزرگ ۱۵۰ تا ۷۵۰ گرم به صورت تنقیه (انما)

موارد منع مصرف: انسداد روده، احتمال پارگی دستگاه گوارش، بعد از

عمل نمونه برداری روده، بعد از اقدامات تشخیصی مثل رادیوترابی

⚠️ عوارض جانبی مهم: یبوست و در صورت سوراخ بودن دستگاه گوارش عفونت شکمی، اسهال و آپاندیسیت.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: شب قبل از اقدام تشخیص، برای بیمار

داروی اسهال آور (ملین) تجویز کنید یا شیاف بیزاکودیل بدهید.

آموزش بیمار - خانواده: به همراه دارو آب فراوان مصرف شود زیرا ممکن است یبوست ایجاد کند.

شرایط نگهداری: پودر خشک را در جای خشک نگهداری کنید.

☑ نکته: رادیوگرافی نوع باریم (HD) و معمولی برای اقدامات تشخیصی در

دوره حاملگی ممنوع است. نوع H.D بیشتر برای رادیوگرافی با هوا در مری و معده استفاده می شود.

## ب - ث - ژ داخل مثانه (B.C.G)

نام تجاری: Theracys

گروه دارویی: واکسن

گروه درمانی: ضد نتوپلاسم

⑤ شکل دارویی: محلول (ویال)

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان سرطان (تومور) مثانه و پیشگیری از تومورهای اولیه یا عود کننده مجاری ادراری

⑥ میزان مصرف: در بالغین یک ویال رقیق شده هفته‌ای یک مرتبه برای ۶ هفته

موارد منع مصرف: بیماران با ضعف ایمنی، ایدز، لنفوم و سرطان‌ها و مصرف کنندگان طولانی مدت کورتون، افراد دچار تب یا عفونت ادراری ❖ عوارض جانبی مهم: سرگیجه، بی حالی، سوزش ادرار، خون در ادرار، کم خونی و علائم شبه آنفلوآنزا و علائم چشمی و جلدی

① توجهات پزشکی - پرستاری: در ابتدا باید برای بیمار تست PPD انجام شود. وضعیت ادراری بیمار کنترل شود. مراقب باشید بیمار تب یا عفونت ادراری نداشته باشد. پرستار مربوطه باید دارو را با کمال احتیاط آماده تزریق کنید (دستکش، گان، ماسک ضروری است).

آموزش بیمار - خانواده: بیمار باید با عوارض احتمالی دارو آشنا شود. شرایط نگهداری: دارو در معرض آفتاب نباشد. پودر ب.ث.ژ و محلول

آماده شده باید در یخچال نگهداری شود. دمای مطلوب ۲ تا ۸ درجه می‌باشد.

☑ نکته: در طول درمان، حاملگی برای بیمار ممنوع است. در صورت تب و لرز یا علائم ادراری شدید به پزشک اطلاع دهید.



## ب.ث.ژ (BCG VACCINE)

نام تجاری: Tice BCG

گروه دارویی: واکسن

گروه درمانی: واکسن ضد مایکوباکتریال (بیماری سل)

⑤ شکل دارویی: پودر برای تزریق

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: برای واکسیناسیون افرادی که با بیماران دچار سل تماس نزدیک داشته‌اند.

⑥ میزان مصرف: ۰/۲ تا ۰/۳ میلی لیتر به صورت جلدی

موارد منع مصرف: اختلالات ایمنی، ایدز، واکسیناسیون آبله، سوختگی،

کورتون تراپی (مصرف کنندگان طولانی مدت کورتون)، حاملگی

⚠ عوارض جانبی مهم: تورم غده‌های لنفاوی، حساسیت (آلرژی)، عفونت

استخوانی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این واکسن را به صورت وریدی یا زیر

جلد یا داخل پوستی تزریق نکنید. حتماً داروهای احیاء و ضد حساسیت

ویژه مثل اپی نفرین در دسترس باشد. ۶ تا ۸ هفته بین واکسن زدن‌های

ب.ث.ژ فاصله بگذارید.

آموزش بیمار - خانواده: محل تزریق را تا ۲۴ ساعت خشک نگهدارید.

تست پوستی توبر کولین (PPD) را ۲ تا ۳ ماه بعد از واکسن انجام دهید.

شرایط نگهداری: دارو در یخچال نگهداری شود.

## ب - کمپلکس (B-COMPLEX)

نام تجاری: Becotal

گروه دارویی: ویتامین‌ها

گروه درمانی: B. کمپلکس

⑤ شکل دارویی: قرص، شربت، آمپول

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: درمان یا پیشگیری از کمبود ویتامین‌های گروه B

⚠ میزان مصرف: برای پیشگیری از کمبود ویتامین‌های گروه B، ۱ تا ۳

قرص روزانه یا ۱ تا ۳ قاشق مرباخوری شربت روزانه یا یک آمپول

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به دارو

⚠ عوارض جانبی مهم: ضایعات جلدی یا خارش

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: دارو در زمان تزریق باید فاقد رسوب باشد.

آموزش بیمار - خانواده: به همراه دارو، مواد غذایی حاوی ویتامین‌های گروه B را مصرف کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

☑ نکته: دارو بهتر است به صورت عضلانی تزریق شود.

## بکلومتازون (BECLOMETHASONE)

نام تجاری: Beclovent

گروه دارویی: کورتون (گلوکوکورتیکوئید)

گروه درمانی: ضد التهاب، ضد آسم

📦 شکل دارویی: اسپری دهانی، بینی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آسم، اسپاسم (گرفتگی) مجاری هوایی به صورت مزمن

مثل برونشیت، عود پولیپ بینی بعد از جراحی، آلرژی فصلی

📏 میزان مصرف: در آسم ۲ پاف اسپری ۳ تا ۴ بار روزانه ولی در اطفال ۱

تا ۲ پاف ۳ بار روزانه توصیه می‌شود.

موارد منع مصرف: حملات حاد آسم، سیل فعال، عفونت قارچی یا

میکروبی درمان نشده یا عفونت با ویروس تب خال (هرپس)

⚠️ عوارض جانبی مهم: سوزش بینی، سردرد، عطسه، خونریزی از بینی،

تهوع، استفراغ و خشکی دهان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: - به بیمار توصیه کنید مایعات کافی

مصرف کند. پس از مدتی میزان مصرف دارو را باید افزایش دهید. در

مورد عفونت قارچی بیمار را پس از مدتی معاینه کنید (دهان و بینی).

آموزش بیمار - خانواده: در صورتی که بیمار از اسپری سالبوتامول

استفاده می‌کند قبل از این دارو، استفاده کند. پس از هر بار استنشاق دارو

یک لیوان آب مصرف کند. این دارو در حملات آسم بی‌فایده است.

شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

☑️ نکته: در صورت عدم بهبودی طی ۳ هفته یا بروز عفونت دهانی به

پزشک اطلاع دهید.

## بلادونا- پی بی (BELLADONA P.B)

نام تجاری: Barbidona

گروه دارویی: ترکیب آکالوئید بلادونا

گروه درمانی: ضد درد، ضد موسکارین

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: زخم معده، بیماری روده تحریک پذیر (IBS) و عفونت

باکتریال روده، اسهال، درد شکمی به ویژه شیرخواران

میزان مصرف: ۵ تا ۱۰ میلی لیتر شربت ۳ تا ۴ بار در روز یا ۱ تا ۲

قرص روزانه ۲ بار در روز

موارد منع مصرف: انسداد لوله گوارش، زخم دستگاه گوارش (نوع

شدید) ولی در نارسایی قلبی و بیماری تیروئید با احتیاط مصرف شود.

در آب سیاه چشم (گلوکوم) منع مصرف دارد.

عوارض جانبی مهم: تاری دید، خشکی دهان، علائم عصبی و مشکلات

ادراری

توجهات پزشکی-پرستاری: پزشک باید سابقه بیماری های کلیوی -

کبدی و چشمی را بررسی کند. فاصله تجویز آنتی اسید با این دارو

حداقل یک ساعت باشد. بیمار بهتر است آنتی اسید را بعد از غذا مصرف

کند.

آموزش بیمار-خانواده: دارو را نیم ساعت قبل از غذا و شب موقع

خواب مصرف کنید. در صورت تاری دید یا خواب آلودگی از رانندگی

اجتناب کنید. مایعات کافی بنوشید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و جای خشک نگهداری شود.

☑ نکته: این دارو ترکیبی از آتروپین، هیوسین و فنوباریتال است و در موارد فوق درمان کمکی محسوب می‌شود.




## بلادونا - ارگوتامین پی بی (BELADONA ERGOTAMINE P.B)

نام تجاری: Bellergal

گروه دارویی: آلکالوئید بلادونا

گروه درمانی: پیشگیری از سردردهای میگرنی

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: پیشگیری از سردردهای میگرنی، مشکلات هیجانی و سردرد قبل از قاعدگی و کاهش علائم یائسگی

میزان مصرف: ۱ قرص صبح و ۱ قرص ظهر و ۲ قرص زمان خواب

موارد منع مصرف: به بلادونا پی بی مراجعه شود.

عوارض جانبی مهم: به بلادونا پی بی مراجعه شود.

توجهات پزشکی - پرستاری: به بلادونا پی بی مراجعه شود.

آموزش بیمار - خانواده: به بلادونا پی بی مراجعه شود.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.

نکته: ☒ این دارو از لیست داروهای ایران حذف شده است ولی در بازار وجود دارد.

## بنزوکائین (BENZOCAINE)

نام تجاری: oragel

گروه دارویی: مشتق اسید، بی حس کننده استری

گروه درمانی: موضعی

⑤ شکل دارویی: پماد موضعی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تسکین دردهای موضعی، آفتاب سوختگی خفیف،  
درد ناحیه هموروئید

⚠ میزان مصرف: به مقدار مورد لزوم روی موضع بمالید.

موارد منع مصرف: حساسیت به مواد استری و بنزوکائین.

⚠ عوارض جانبی مهم: کهیر، خارش و تورم موضعی

⚠ توجهات پزشکی-پرستاری: در سوختگی با مواد شیمیایی ابتدا زخم را  
با صابون یا آب یا سرم شست و شو دهید سپس از پماد موضعی استفاده  
کنید.

آموزش بیمار-خانواده: از تماس دست آلوده به پماد با چشم پرهیز  
کنید.

شرایط نگهداری: دارو در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

☑ نکته: طی یک دقیقه اثر آن شروع می شود و به مدت حداکثر یک  
ساعت باقی می ماند.

## بنزوئیل پراکساید (BENZOYL PEROXIDE)

نام تجاری: Benzac

گروه دارویی: کراتولیتیک

گروه درمانی: ضد آکنه

📦 شکل دارویی: ژل، لوسیون، صابون

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضد جوش (آکنه) در سر و صورت

⚖️ میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۲ بار ژل یا ۱ تا ۴ بار لوسیون

موارد منع مصرف: موارد خاصی وجود ندارد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: عارضه خاصی ندارد.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تجویز داروهای همزمان با الکل موضعی

مفید نیست.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار باید ابتدا با صابون معمولی موضع را

بشوید و سپس از دارو استفاده کند.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

# بنزوتروپین مسیلات

## (BENZOTROPIN MESYLATE)

نام تجاری: Akitan

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک

گروه درمانی: ضد پارکینسون

شکل دارویی: قرص و آمپول (۲ میلی گرم)

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پارکینسون، دیستونی (دو بیماری سیستم عصبی که اولی با لرزش (ترمور) اندام‌ها و مشکل در حرکت و راه رفتن به علت کاهش مواد ضروری درگیرنده‌های GABA در مغز بروز می‌کند و دومی سفتی عضلات نواحی گردن و اندام‌هاست)

میزان مصرف: ۵/۰ تا ۶ گرم روزانه از راه خوراکی برای پارکینسون موثر است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، آب سیاه چشم

عوارض جانبی مهم: ضعف و خستگی، کهیر، مشکل دید، تپش قلب، یبوست و سوزش ادرار

توجهات پزشکی - پرستاری: بیمار ممکن است دچار ضعف عضلانی بشود که باید میزان دارو را کاهش داد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو با غذا یا بلافاصله پس از غذا مصرف شود. شروع و قطع دارو باید تدریجی باشد. از رانندگی اجتناب شود.

شرایط نگهداری: دارو باید دور از نور و در حرارت معمولی نگهداری شود.

## اسید بنزوئیک (BENZOIC ACID)

نام تجاری: Drazoic

گروه دارویی: مشتقات اسید بنزوئیک

گروه درمانی: ضد قارچ

📦 شکل دارویی: محلول یا (Bulk) یا پماد

مصرف در حاملگی: طبقه‌بندی نشده است.

موارد مصرف: ضد قارچ و عفونت‌های میکروبی

⚖️ میزان مصرف: به طور موضعی استفاده می‌شود ۱ تا ۲ بار روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید موضعی

⚠️ عوارض جانبی مهم: حساسیت و ضایعات جلدی

⚠️! توجهات پزشکی - پرستاری: اسید بنزوئیک به عنوان ماده نگهدارنده

دارویی در غلظت یک درصد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش بیمار - خانواده: این ترکیب به عنوان ضد باکتری ادراری هم

مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع پماد آن در انگلستان در ترکیب با

سالیسیلیک اسید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و در ظروف در بسته نگهداری شود.

## تنتور بنزوئین (BENZOIN TINCTURE)

گروه دارویی: مشتقات و ترکیبات اسید بنزوئیک

گروه درمانی: درمان عفونت‌های ویروسی

⑤ شکل دارویی: توده حجیم (Bulk)

مصرف در حاملگی: طبقه‌بندی نشده است

موارد مصرف: زگیل‌ها، کراتوزها، پاپیلوم لارنکس، کراتوزهای همراه

سبوره یا ناشی از رادیوتراپی (اشعه x)

غلظت میزان مصرف: محلول ۲۵٪ آن کمتر استفاده می‌شود.

موارد منع مصرف: موردی گزارش نشده است.

⚠ عوارض جانبی مهم: در صورت تماس با پوست، زخم و یا التهاب

موضعی ایجاد می‌کند.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: معمولاً تا ۶ هفته منتظر جواب درمان

بمانید.

آموزش بیمار - خانواده: از استفاده آن بدون تجویز پزشک خودداری

کنید. در هنگام استفاده دست‌ها نباید با چشم در تماس باشد.

شرایط نگهداری: در دمای پایین‌تر از ۲۵ درجه نگهداری شود.

## بنزوئیل پراکساید (BENZOIL PEROXIDE)

نام تجاری: Benoxyl

گروه دارویی: کراتولیتیک‌ها

گروه درمانی: ضد آکنه - ضدباکتری

📦 شکل دارویی: محلول (لوسیون)، ژل موضعی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان آکنه و زخم‌های بستر یا زخم‌های ناحیه واریس پا  
📏 میزان مصرف: ۱ تا ۴ بار در روز استفاده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، زخم‌های باز یا پوست ملتهب و  
دچار کندی

⚠️ عوارض جانبی مهم: ضایعات پوستی و خشکی پوست از جمله عوارض  
این دارو است.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت مشاهده تحریک پوستی دارو  
را قطع کنید.

آموزش بیمار - خانواده: استفاده از نرم کننده‌ها پس از اتمام درمان  
مفید است. دارو نباید روی لب یا پلک مالیده شود.  
شرایط نگهداری: در دمای زیر ۲۵ درجه نگهداری شود.

## بنزتروپین (BENZTROPIN MESYLATE)

نام تجاری: Cogentin

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک

گروه درمانی: ضد پارکینسون

⑤ شکل دارویی: آمپول و قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: علائم مغزی بیماری‌های پارکینسون و اکستراپیرامیدال

⚠️ میزان مصرف: ۱ تا ۲ میلی گرم روزانه خوراکی یا تزریقی

موارد منع مصرف: انسداد روده، زخم گوارشی، بیماری میاستنی

گراویس و تنگی پیشابراه

⚠️ عوارض جانبی مهم: یبوست، حساسی به گرم‌زدگی و کاهش فشار خون

و علائم گیجی جزء مهمترین عوارض‌اند.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: ضعف عضلانی جزء عوارض است،

هشدار دهید. افسردگی و تهوع را به بیمار یادآور شوید.

آموزش بیمار - خانواده: سالمندان به میزان بالاتر آن حساس هستند.

از قطع ناگهانی دارو پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در جای خشک و دمای زیر ۲۵ درجه نگهداری شود.



## بنزیل بنزوات (BENZYL BENZOAT)

نام تجاری: Anusol

گروه دارویی: بنزیل ها

گروه درمانی: ضد گال و شپش

شکل دارویی: توده محلول حجیم (Bulk)

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: گال و شپش (پدیلولوز)

میزان مصرف: به مقدار مورد نیاز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

عوارض جانبی مهم: در صورت مصرف خوراکی فرد دچار تشنج و علائم عصبی می شود.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو به صورت محلول (امولسیون) روی موضع مالیده شود.

آموزش بیمار - خانواده: ممکن است علیرغم درمان موفق خارش تا ۲ هفته باقی بماند. از تماس چشم و مخاط دهان با دارو پرهیز کنید. همزمان، لباس زیر و ملحفه و روبالشی با آب جوش شسته شود. شرایط نگهداری: دور از نور و در دمای معمولی نگهداری شود.

# بفنیوم هیدروکسی نفتوات (BEPHENIUM HYDROXY NAPHTHOATE)

نام تجاری: Alcopar

گروه دارویی: گرانول (۵ گرم)

گروه درمانی: آگونیست گیرنده کولینرژیک

📌 شکل دارویی: ضد کرم

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آلودگی به کرم آسکاریس و کرم قلابدار (نکاتور آمریکانوس)

📌 میزان مصرف: ۵ گرم خوراکی ۱ تا ۲ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به دارو

⚠️ عوارض جانبی مهم: اسهال، استفراغ، سردرد

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: بیشترین کاربرد دارو علیه کرم آسکاریس است.

آموزش بیمار - خانواده: با معده خالی استفاده شود. تا یک ساعت بعد

از مصرف دارو، غذایی مصرف نشود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و در جای خشک نگهداری شود.

## بتاکاروتن (BETACAROTENE)

نام تجاری: Solatene

گروه دارویی: پرو ویتامین A

گروه درمانی: محافظت پوست

⑤ شکل دارویی: کپسول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کمبود ویتامین A، مهار واکنش‌های ناشی از حساسیت به نور

⚠️ میزان مصرف: ۶ تا ۱۵ گرم بتاکاروتن یا ۱۰ تا ۲۵ نوار واحد ویتامین A  
موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠️ عوارض جانبی مهم: تغییر رنگ پوست و اسهال، کبودی پوست، درد  
مفصل

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در طول مصرف دارو ممکن است پوست بیمار کمی زرد رنگ به نظر برسد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو همراه با غذا مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

☑️ نکته: مصرف بالای آن باعث مسمومیت با ویتامین A می‌شود.

## بتاهيستين (BETAHISTIN)

نام تجاری: Betaserc

گروه دارویی: گروه هیستامینی

گروه درمانی: ضد سرگیجه

⊗ شکل دارویی: قرص ۸ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: حملات سرگیجه (بیماری منیر) که با حملات سرگیجه توأم است.

⚠️ میزان مصرف: ابتدا ۱۶ میلی گرم از راه خوراکی ۲ تا ۳ بار در روز سپس ۲۴ تا ۴۸ میلی گرم روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، بیماری فتوکروموسیتوما

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، ضایعات جلدی، تهوع، استفراغ

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در آسم و زخم معده با احتیاط مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است دارو را با غذا و یک لیوان آب مصرف کنید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## بتامتازون (BETAMETHAZONE)

نام تجاری: Celestone

گروه دارویی: گلوکوکورتیکوئید (کورتون)

گروه درمانی: ضدالتهاب، مهار ایمنی

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب شدید و مهار سیستم ایمنی، نارسایی کورتکس  
آدرنال

حالت میزان مصرف: روزانه ۰/۶ تا ۷/۲ میلی گرم به صورت خوراکی یا ۰/۵ تا  
۹ میلی گرم وریدی

موارد منع مصرف: عفونت‌های قارچی و حساسیت شدید

عوارض جانبی مهم: سردرد، افزایش اشتها، ضعف، افزایش وزن، پرمویی  
صورت، بی‌خوابی و بی‌قراری

توجهات پزشکی - پرستاری: قطع داروی استروئیدی باید به تدریج و  
طی یک هفته صورت گیرد.

آموزش بیمار - خانواده: بتامتازون خوراکی را باید همراه غذا یا شیر  
استفاده کرد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

# بتامتازون (چشمی - گوشی) (BETAMETHAZONE)

نام تجاری: Betnesol

گروه دارویی: کورتون

گروه درمانی: ضد التهاب

📌 شکل دارویی: پماد چشمی یا گوشی یا قطره بینی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب قرنیه چشم، التهاب ملتحمه، ضایعات آلرژیک چشم، التهاب گوش خارجی

⚠️ میزان مصرف: ۱ تا ۲ قطره هر ۱ تا ۲ ساعت داخل چشم چکانده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، ضایعات قارچی، آبله مرغان و بیماری هرپس، عفونت‌های حاد و دارای ترشح در چشم

⚠️ عوارض جانبی مهم: باعث اختلال در دید چشم و تشدید عفونت‌های ثانویه، ترس از نور و اشک‌ریزی و احساس جسم خارجی در چشم می‌شود.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: خطر عفونت قارچی را در نظر داشته باشید. پزشک باید به یاد داشته باشد که بعد از عمل آب مروارید چشم، الیتام زخم را به تأخیر می‌اندازد.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز اختلال بینایی دارو را قطع کنید. معمولاً اگر تا ۵ روز بهبودی حاصل نشود به پزشک اطلاع دهید. شرایط نگهداری: در دمای معمولی ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## بتامتازون - این (BETAMETAZON-N)

نام تجاری: Betnesol-N

گروه دارویی: کورتون

گروه درمانی: ضد التهاب

⑤ شکل دارویی: قطره - پماد

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیماری التهابی غیر عفونی چشم یا مجرای خارجی گوش

⚠ میزان مصرف: در حد نیاز با تشخیص پزشک، هر ۱ تا ۲ ساعت ۱ تا ۲ قطره

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠ عوارض جانبی مهم: مصرف دراز مدت باعث عفونت قارچها و ویروسها می شود.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو ترکیب بتامتازون و نئومايسين است که از دسته آمینو گلیکوزیدها بر علیه باکتری گرم منفی و مثبت است.

آموزش بیمار - خانواده: تنها با دستور پزشک استفاده شود.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مناسب است.

## بتاکسولول (BETAXOLOL)

نام تجاری: Betoptic

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده‌های بتا

گروه درمانی: ضد آب سیاه (گلوکوم)

⑨ شکل دارویی: قطره

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: افزایش فشار داخل کره چشم و فشار بالای داخل چشمی

⚠️ میزان مصرف: بنا به دستور

موارد منع مصرف: بلوک قلبی درجه II و III، آسم، بیماری مزمن ریوی

و نارسایی قلبی

⚠️ عوارض جانبی مهم: ریزش اشک، قرمزی، ترس از نور و به ندرت

بی‌خوابی

⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: این دارو را پزشک پس از عمل لیزر در

بیماران با آب سیاه توصیه می‌کند. فشار خون بیمار کنترل شود. دارو

ممکن است باعث کاهش فشار خون شود زیرا می‌تواند جذب

سیستمیک داشته باشد.

آموزش بیمار-خانواده: بیمار نباید دارو را به طور ناگهانی قطع کند. از

رانندگی و کارهای دقیق و ظریف خودداری نمایید. ممکن است تنگی

نفس هم بروز کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

☑ نکته: با داروی تیمولول Timolol مشابه است و عوارضی مشابه آن دارد.



## بتانکول (BETHANECHOL CHOLORIDE)

نام تجاری: Urecholine

گروه دارویی: کولینرژیک

گروه درمانی: محرک دستگاه ادراری و گوارش

شکل دارویی: قرص ۱۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: احتباس ادراری و در ضایعه برگشت ترشحات معده به مری (ریفلاکس)

میزان مصرف: ۱۰ تا ۵۰ میلی گرم ۴ تا ۵ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، پرکاری تیروئید، زخم گوارشی، آسم، بیماری عروق کرونر قلب، کاهش فشار خون، تشنج

عوارض جانبی مهم: درد شکمی، سردرد، اسهال، تنگی نفس

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت بروز سرگیجه یا احساس گرگرفتگی به پزشک معالج اطلاع دهید. در مورد ترشح بیش از حد بزاق و درد شکم تذکر دهید.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت تنگی نفس حتماً به پزشک اطلاع دهید. دارو را با شکم خالی مصرف کنید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری کنید.

## بای پیریدن (BIPERIDEN)

نام تجاری: Akineton

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک

گروه درمانی: ضد پارکینسون

⊗ شکل دارویی: قرص ۲ میلی گرمی، آمپول ۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پارکینسون و علائم اکستراپیرامیدال در مسمومیت دارویی مثلاً در مسمومیت با داروی ضد استفراغ تزریقی یا خوراکی متوکلوپرامید

⚠ میزان مصرف: ۲ میلی گرم ۳ یا ۴ بار در روز یا ۲ میلی گرم از طریق عضلانی

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی شدید، آب سیاه چشم (گلوکوم)، انسداد روده، بیماری میاستنی گراویس

⚠ عوارض جانبی مهم: یبوست، استعداد گرمازدگی، خشکی دهان، استفراغ و احتباس ادرار

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: - قرص خوراکی آن با غذا میل شود. تزریق وریدی آن آهسته صورت گیرد. در صورت خشکی دهان، استفاده از مایعات و آدامس مفید است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورتی که مصرف دارو باعث احتباس ادراری شود به پزشک اطلاع دهید. در هوای گرم باعث افزایش گرمازدگی می شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک و دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## بیزاکودیل (BISACODYL)

نام تجاری: Biscolax

گروه دارویی: مشتقات دی فنیل متان

گروه درمانی: ملین و محرک دستگاه گوارش (اسهال آور)

📦 شکل دارویی: قرص و شیاف ۵ و ۱۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: یبوست حاد و گذرا یا آماده سازی بیمار برای اقدامات تشخیصی رادیوگرافی و کولونوسکوپی (آندوسکوپی تشخیصی)

⚖️ میزان مصرف: ۱ یا ۲ عدد قرص یا شیاف در بالغین و کودکان بالای ۱۲ سال

موارد منع مصرف: در تهوع و استفراغ، مشکلات شکم حاد، انسداد روده

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، درد شکمی، اسهال و درد و سوزش اطراف مقعد

⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: با توجه به زمان اثر دارو بهتر است شیاف ۱ تا ۲ ساعت قبل از اقدامات تشخیصی مثل رادیوگرافی استعمال شود و نوع خوراکی آن شب قبل استفاده شود.

آموزش بیمار-خانواده: بهتر است مایعات و غذاهای پرفیبر استفاده شود. عادت به دارو مطلوب نیست.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه نگهداری شود. پوشش شیاف را تا زمان استعمال باز نکنید.

# بیسموت ساب سیترات (BISMUTH SUBCITRATE)

نام تجاری: Pepto-Bismol

گروه دارویی: ترکیبات بیسموت

گروه درمانی: ضد زخم معده و روده، ضد اسهال مسافرتی

📦 شکل دارویی: قرص ۱۲۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: پیشگیری از اسهال مسافرتی، سوء هاضمه، زخم معده و روده و گاستریت (التهاب معده)

⚠️ میزان مصرف: درمان بر اساس مورد متفاوت است. ۱ تا ۲ قرص هر ۶

ساعت در پیشگیری از اسهال مسافرتی ولی در درمان سوء هاضمه یک

قرص هر نیم ساعت تا ۸ بار در ۲۴ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠️ عوارض جانبی مهم: سیاه شدن مدفوع، عوارض عصبی (مغزی) و

اعصاب محیطی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت وجود اسهال بیش از ۲ روز یا

همراه با تب مصرف نشود. برنامه پیشگیری کمتر از دو هفته باید ادامه

یابد.

آموزش بیمار - خانواده: بیسموت داروی کمکی در زخم دستگاه گوارش

به همراه داروهای دیگر می باشد.

شرایط نگهداری: در شرایط معمولی نگهداری شود.

## بلئومايسين (BLEOMYCIN SULPHAT)

نام تجاری: Blenoxane

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: ضد سرطان

⑤ شکل دارویی: آمپول ۱۵ واحدی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان‌های سلول‌های پوست، لنفوم و سرطان بیضه

⑥ میزان مصرف: طبق دستور متخصص شیمی درمانی ویال‌های ۱۵

واحدی را یک تا ۲ بار در هفته تزریق می‌کنند.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، حاملگی

⚠ عوارض جانبی مهم: فیبروز ریه به ویژه در افراد سالمند که مشکل

زمینه‌ای ریه دارند مهمترین عارضه جانبی می‌باشد. آثار پوستی بر روی

لثه و زبان

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: - بلئومايسين دارویی خطرناک است که

فقط توسط پزشک با تجربه باید تجویز شود و در افراد با نارسایی کلیه و

ریوی با احتیاط کامل باید تجویز شود.

در صورت التهاب دهان و زبان میزان دارو باید کاهش یابد.

تزریق عضلانی آن باید عمیق صورت گیرد.

پس از تزریق باید دستکش سرنگ و ماسک و داروی مانده دور ریخته

شود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار باید اطلاعات کافی از وضعیت ریه و کلیه

خود را در اختیار پزشک قرار دهد. در صورت تغییر رنگ پوست یا ایجاد سیانوز در انگشتان مراتب را به کادر پزشکی اطلاع دهد. مصرف این دارو با ریزش مو همراه است که پس از قطع دارو بهبود می‌یابد. شرایط نگهداری: محلول آن در یخچال به مدت ۴ هفته قابل نگهداری می‌باشد.



## بوراکس (BORAX)

نمک اسید بوریک است.

این دارو به شکل توده و پودر (BULK) است که کریستال‌های آن بدون رنگ و شفاف است. مصرف عمده این دارو ضد باکتری و نرم‌کننده در کرم‌ها و داروهای ساختگی پوست می‌باشد. عوارض و خواص مشابه اسید بوریک (صفحه ۱۱۱) دارد.

این دارو از طریق پوست زخمی و مخاط دهان و زبان قابل جذب است و ممکن است آثار سمی آن به صورت اسهال و ضایعات پوستی باشد.

## اسید بوریک (BORIC ACID)

نام تجاری: Borfax

گروه دارویی: اسیدهای معدنی

گروه درمانی: ضدباکتری، ضد قارچ ضعیف

⑤ شکل دارویی: فله‌ای و محلول

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: در محلول دهان شویه و در قطره‌های چشمی و حشره‌کش‌ها استفاده می‌شود.

⚠ میزان مصرف: دفعات و مقدار مصرف متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، زخم شدید در سطح پوست.

⚠ عوارض جانبی مهم: حساسیت موضعی در پوست، عوارض کلیوی و اسهال و عوارض کبدی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو به عنوان دهان شویه، لوسیون چشمی و لوسیون پوستی مصرف می‌شود. بارزترین علائم مسمومیت آن، پوسته پوسته شدن (ورقه شدن) پوست و استفراغ و اسهال و گاهی تشنج است.

آموزش بیمار - خانواده: مواردی از مرگ و میر دیده شده است. مصرف مکرر آن ممنوع است و بر اساس نظر پزشک دفعات مصرف آن تنظیم می‌شود.

شرایط نگهداری: در ظرف در بسته و دمای معمولی و محل خشک نگهداری شود.



## بوتولینوم توکسین - A (BOTULINUM TOXIN)

نام تجاری: BOTOX-Dysport

گروه دارویی: نوروتوکسین - مهار کننده عصبی عضلانی

گروه درمانی: شل کننده عضلانی

⑤ شکل دارویی: ویال (تزریقی)

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: استرابیسم (چشم)، بلفارو اسپاسم، کمردرد، گرفتگی

(اسپاسم) عضلات، ضایعات فلج مغزی و فلج اطفال

⚖ میزان مصرف: بنا بر مورد متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید و بیماران میاستنی گراویس

⚠ عوارض جانبی مهم: در چشم، ریزش اشک و ترس از نور و خشکی و

زخم قرنیه و در عضلات، شلی شدید عضلانی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در هنگام تزریق دارو، داروها و امکانات

احیاء را به علت احتمال بروز حساسیت دارویی آماده کنید. از یک ویال

فقط یک بار می توان استفاده کرد.

آموزش بیمار - خانواده: پس از تزریق گاهی بیمار خواب آلوده است و

دچار ضعف عمومی می گردد. این دارو با بعضی از آنتی بیوتیک ها مثل

جنتامایسین و تتراسایکلین تداخل دارویی دارد.

شرایط نگهداری: پودر آن در دمای زیر ۵ درجه نگهداری شود.

☑ نکته: این دارو گران قیمت است و تنها در موارد خاص که مداخله

دارویی دیگر ممکن نیست کاربرد دارد و از سم میکروب بوتولینوم که در

مواد غذایی کنسرو شده ایجاد می شود به صورت صنعتی تولید می شود.

## آنتی توکسین بوتولیسم (BOTULISM ANTITOXIN E-MONOVALENT)

گروه دارویی: ضد زهر بوتولیسم (میکروب بسیار خطرناک)

گروه درمانی: ایمونوسرم بوتولیسم (سم نوع E)

⑤ شکل دارویی: ویال تزریقی

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: پیشگیری و درمان مسمومیت با سم بوتولیسم (سم ناشی از میکروب در عسل یا کنسرو)

⚠️ میزان مصرف: ۲۰ سی سی از پادزهر در ۱۰۰ سی سی سرم نرمال رقیق و طی نیم ساعت تزریق شود. تکرار آن به فاصله ۲ ساعت مجاز است. موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: حساسیت، کهیر، کاهش فشار خون

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: ارجح است قبل از تزریق تست انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز واکنش حساسیتی تأخیری به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود.

☑️ نکته: نوع پلی والان این پادزهر که علیه سم‌های A و B و E مؤثر است کاربرد بیشتری دارد چون در صورت تماس با سم بوتولیسم یا آلودگی و مسمومیت غذایی نمی‌توان تنها به سم نوع E فکر کرد.

## برتیلیوم توسیلات (BRETLYUM TOSYLATE)

نام تجاری: Bretylol

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده آدرنرژیک ها

گروه درمانی: درمان آریتمی قلبی

شکل دارویی: آمپول ۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بی نظمی های ریتم قلبی به ویژه نوع بطنی (تاکیکاردی بطنی، فیبریلاسیون بطنی) در احیاء قلب و ریه (نوع پیشرفته)

نکته میزان مصرف: در درمان شوک قلبی و احیاء ۵ میلی گرم از فرم رقیق نشده برتیلیوم به ازای هر کیلوگرم و در درمان های عادی ۵ تا ۱۰ میلی گرم از آن به ازای هر کیلوگرم، رقیق شده طی چند دقیقه (۸ دقیقه) انفوزیون نمایید.

موارد منع مصرف: در مسمومیت با قرص یا آمپول دیگوکسین ممنوع است.

⚠ عوارض جانبی مهم: کاهش فشار خون، سرگیجه، تهوع، استفراغ

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: فشار خون، تعداد ضربان قلب و ریتم قلب را کنترل کنید.

آموزش بیمار - خانواده: وضعیت بیمار را از نظر نحوه قرار گرفتن بر روی تخت مورد توجه قرار دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

# بریمونیدین تارترات (BRIMONIDINE TARTRATE)

نام تجاری: Alphagan

گروه دارویی: آگونیست یگوند a دو آدرنرژیک

گروه درمانی: میوتیک‌ها، ضد آب سیاه چشم

شکل دارویی: قطره چشمی ۰/۲ درصد

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آب سیاه و چشم، برای کاهش فشار چشم (گلوکوم)

میزان مصرف: یک قطره ۳ بار در روز در چشم

موارد منع مصرف: حساسیت شدید و مصرف کنندگان داروهای (MAO)

⚠ عوارض جانبی مهم: سرگیجه، خشکی دهان، تاری دید، پرخوری، سرفه

⚠ توجهات پزشکی - پرسیاری: فشار داخل چشم را در هنگام مصرف به

طور منظم کنترل کنید.

آموزش بیمار - خانواده: به علت خستگی و سرگیجه از رانندگی و

کارهای دقیق اجتناب شود.

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۲۵ درجه نگهداری شود (جای


خشک و خنک)

# برینزو لامید (چشمی) (BRINZOLAMIDE(OPHTALMIC))

نام تجاری: Azopt

گروه دارویی: مهار کننده کربنیک آنهیدراز

گروه درمانی: ضد آب سیاه (چشم)

شکل دارویی: سوسپانسیون ۱٪ 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کاهش فشار کره چشم

غلظت میزان مصرف: یک قطره هر ۸ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت مصرف و نارسایی کلیه

⚠ عوارض جانبی مهم: سوزش چشم، تاری دید، تهوع و ضایعات جلدی و

چشمی

1. توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو از طریق سیستمیک جذب

می شود. این دارو آثار سیستمیک به جا می گذارد. وضعیت کبد و

آزمایش های کبدی را کنترل کنید.

آموزش بیمار - خانواده: در ابتدای درمان ممکن است اختلال بینایی به

طور موقت ظاهر کند.

شرایط نگهداری: در صورت استفاده از قطره های چشمی دیگر باید بین

آن دو ۱۰ دقیقه فاصله باشد.

☑ نکته: در دمای معمولی نگهداری شود.

## بُرْم هِگْزین کلراید (BROMHEXIN HCL)

نام تجاری: Bisolvon

گروه دارویی: اکسپکتورانت

گروه درمانی: خلط آور

شکل دارویی: شربت، قرص، آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: سرفه‌های توأم با خلط

میزان مصرف: در بالغین ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم خوراکی

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی ولی در آسم با احتیاط تجویز شود.

✿ عوارض جانبی مهم: ناراحتی دستگاه گوارش، سردرد و ضایعات پوستی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مسئله خاصی مطرح نیست، در صورت

مصرف طولانی تست کلیوی و کبدی باید کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: به همراه مصرف دارو ممکن است تعریق بروز

کند. در صورت مشکلات گوارشی مثل زخم معده به پزشک اطلاع

دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## بروموکریپتین (BROMOCRIPTINE)

نام تجاری: Parlodel

گروه دارویی: اگونیست دوپامینرژیک

گروه درمانی: مهار هورمون ترشح پرولاکتین

⑤ شکل دارویی: قرص ۲/۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عدم قاعدگی در زن بلوغ (آمنوره)، ترشح شیر نابجا،

بیماری اکرومگالی (درشتی غیرطبیعی اندامها)

⚠ میزان مصرف: روزانه ۱/۲۵ تا ۲/۵ میلی گرم استفاده می شود. البته بنابر

مورد متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، فشار خون شدید،

مسمومیت حاملگی

⚠ عوارض جانبی مهم: سرگیجه، استفراغ، یبوست، کرامپ شکمی، تشنج

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: عملکرد قلب - کلیه - کبد بررسی شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را با غذا مصرف کنید. رانندگی ممنوع

است. زنان مصرف کننده دارو باید از روش های دیگر جلوگیری از

بارداری غیر از قرص خوراکی یا کاشتنی استفاده کنند.

شرایط نگهداری: در دمای زیر ۲۵ درجه نگهداری شود.

# بوپی واکائین (BUPIVACAINE)

نام تجاری: Marcaine

گروه دارویی: مشتقات آمیدی

گروه درمانی: بی حس کننده نخاعی و اعصاب محیطی

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بی حسی موضعی - نخاعی، بلوک عصبی، جراحی چشم،

بی حسی برای زایمان طبیعی و سزارین

⚠️ میزان مصرف: میزان تزریق با توجه به سن و نوع بی حسی متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، در بلوک عصبی (Bier's)

ساعد و بلوک گردنی و حاملگی ممنوع است.

⚠️ عوارض جانبی مهم: ایست قلبی، تشنج، سرگیجه، تهوع، ضایعات موضعی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: میزان دارو باید دقیق باشد. تداخلات

دارویی با بوپی واکائین باید مد نظر پزشک باشد. بیمار می بایست

مونیتورینگ قلب بشود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت استفاده در چشم پزشکی یا

دندانپزشکی از خوردن به مدت چند ساعت خودداری شود.

بیمار می بایست اطلاعات مربوط به مصرف داروهای دیگر را به پزشک

بیهوشی اطلاع دهد.



شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود. از یخ زدن دارو جلوگیری کنید.



## بوپرنورفین (BUPRENORPHIN)

نام تجاری: Buprenex

گروه دارویی: آگونیست مُخدر

گروه درمانی: ضد درد (مخدر)

⑨ شکل دارویی: آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تسکین دردهای شدید، قبل از بیهوشی، کنترل و برگرداندن مهار تنفسی ناشی از فتانیل در بیهوشی

غلظت میزان مصرف: ۰/۳ میلی گرم عضلانی یا وریدی (آهسته تزریق شود) و ۶ ساعت بعد در صورت نیاز تکرار شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: سرگیجه، سردرد، کاهش فشار خون، تهوع، تعریق و بالا رفتن فشار خون

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مهار سیستم تنفسی احتمال بروز دارد.

آموزش بیمار - خانواده: احتمال سرگیجه وجود دارد. فیزیوتراپی قفسه سینه و انجام تنفس عمیق و یا سرفه‌های مکرر در صورت استفاده در بیهوشی بعد از عمل برای بیمار ضروری است.

شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۳۰ درجه نگهداری شود. در محفظه‌های محکم و به دور از نور نگهداری شود.

## بوپروپیون (BUPROPION)

نام تجاری: Wellbutrin

گروه دارویی: آمینوکتون

گروه درمانی: ضد افسردگی

📦 شکل دارویی: قرص ۱۰۰، ۷۵ و ۱۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: افسردگی و ترک سیگار

⚠️ میزان مصرف: با ۱۰۰ میلی گرم دوبار در روز شروع می شود و پس از آن، میزان مصرف قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، تشنج - البته در بیماری های قلبی و نارسایی کبد و کلیه با احتیاط مصرف شود.

☠️ عوارض جانبی مهم: فشار خون بالا یا پایین، خارش، تاری دید، خشکی دهان، تب و لرز، سردرد، ضعف، اختلال شنوایی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: احتمال تشنج با افزایش میزان مصرف بالا می رود. ناتوانی جنسی احتمال بروز دارد به بیمار گوشزد کنید.

آموزش بیمار - خانواده: - قطع ناگهانی دارو خطرناک است. دارو در ساعات معین باید مصرف شود. از رانندگی خودداری کنید.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

## پماد سوختگی (BURN OINMENT)

نام تجاری: Desitin

گروه دارویی: ضد سوختگی

گروه درمانی: ضد التهاب

شکل دارویی: پماد

مصرف در حاملگی: بی خطر (هر چند مطالعه‌ای بر روی خطرناک بودن آن انجام نشده است).

موارد مصرف: درمان سوختگی و پیشگیری و درمان التهاب و تحریک پوستی شیر خواران و زخم سطحی

میزان مصرف: ۳ تا ۴ بار در روز به طور موضعی

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

عوارض جانبی مهم: این دارو حاوی zinc oxid و روغن کبد ماهی Cod liver oil می‌باشد.

توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت تحریک پوست دارو را قطع کنید.

آموزش بیمار - خانواده: از تماس دارو با چشم پرهیز شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهدارید.

## بوسرلین (BUSERELIN ACETATE)

نام تجاری: Superfact

گروه دارویی: ضد نئوپلاسم (تومور)

گروه درمانی: هورمون‌های محرک (LHRH)

شکل دارویی: آمپول و اسپری بینی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آمادگی برای تحریک تخمک گذاری برای لقاح خارج رحمی (IVF)، سرطان پروستات، التهاب رحمی (اندومتریوز)، درد قاعدگی

میزان مصرف: در تحریک تخمک گذاری اسپری بینی ۴ بار در روز طبق دستور پزشک یا به شکل تزریق زیر جلدی، تزریق روزانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ میکروگرم زیر جلدی

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو

عوارض جانبی مهم: سردرد، بالا رفتن فشار خون، تورم اندام‌ها، کم خونی، تکرر ادرار، تنگی نفس، درماتیت، یبوست، تهوع و استفراغ شدید ⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: بیمار باید زیر نظر گرفته شود (از نظر علائم حیاتی). مصرف آن در افراد مسن باید با کنترل بیشتر باشد. گر گرفتگی و کاهش میل جنسی را متذکر شوید.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف مداوم و منظم دارو توصیه می‌شود. در صورت مشاهده سردرد شدید یا گر گرفتگی اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## بوسپيرون کلرايد (BUSPIRON HCL)

نام تجاری: Buspar

گروه دارویی: آزاسپيرون دکانديون

گروه درمانی: ضد اضطراب

📦 شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: اضطراب

📌 میزان مصرف: قرص ۵ میلی گرمی از راه خوراکی ۳ بار در روز شروع می شود و به تدریج قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، سرگیجه، تهوع، خشکی دهان، اسهال

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: علائم بهبودی طی ۷ تا ۱۰ روز آشکار می شود. بهترین نتایج طی ۴ هفته اول ظاهر می شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو به همراه غذا مصرف شود. از قطع ناگهانی داروی ضد اضطراب اجتناب کنید. از رانندگی و کارهای ظریف پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.

## بوسولفان (BUSULFAN)

نام تجاری: Myleran

گروه دارویی: آلکیل کننده‌ها

گروه درمانی: ضد سرطان

📦 شکل دارویی: قرص ۲ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان، کنترل و مهار سرطان CML (لوسمی میلوبلاستیک مزمن)

🕒 میزان مصرف: روزانه ۴ تا ۸ میلی گرم از راه خوراکی

موارد منع مصرف: مقاوم به درمان یا حساسیت شدید دارویی بروز کند.

⚠️ عوارض جانبی مهم: خونریزی، سردرد، افسردگی، تاری دید، وزوز گوش، عوارض تنفسی، بزرگ شدن پستان‌ها در مردان، یبوست و استفراغ و اسهال، کوچک شدن بیضه‌ها، فیبروز ریه، آب مروارید (چشم)

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش‌های خونی، کبدی و کلیوی کنترل شود. ریه‌ها را معاینه بالینی کنید. انجام هر نوع واکسن باید حتماً با اطلاع پزشک باشد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو باید هر روز در ساعت معین مصرف شود. بهتر است با معده خالی دارو مصرف شود. بیمار به علت احتمال خونریزی در هنگام مسواک و نخ دندان مراقب باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و به دور از نور نگهداری شود.

# کابرگولین (CABERGOLIN)

نام تجاری: Dostinex

گروه دارویی: اگونیست گیرنده D2 دوپامین

گروه درمانی: مهار ترشح پرولاکتین

شکل دارویی: قرص ۰/۵ و ۱ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: بیماری افزایش ترشح پرولاکتین و بیماری پارکینسون  
میزان مصرف: با ۰/۲۵ میلی گرم ۲ بار در هفته شروع و سپس ۰/۲۵ میلی گرم طی ۲ هفته افزایش داده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، فشار خون حاملگی  
(کلامپسی)، شیردهی

عوارض جانبی مهم: بی قراری، افسردگی، کاهش فشار خون، تهوع،  
یبوست، اسهال، درد پستان، سرگیجه، بی خوابی

توجهات پزشکی - پرستاری: میزان دارو به فواصل هر ۲ تا ۴ هفته  
افزایش یابد. اثر بخشی دارو را با اندازه گیری پرولاکتین سرم ارزیابی  
کنید. کاهش فشار خون (هیپوتانسیون) جزء مواردی است که باید مدنظر  
باشد.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف دارو تا ۶ ماه پس از طبیعی شدن  
سطح هورمون پرولاکتین باید ادامه یابد. به همراه این دارو مصرف  
ایندرال یا قرص ضد حاملگی مجاز نیست.

شرایط نگهداری: در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه نگهداری شود.



## کافئین (CAFFEINE)

نام تجاری: Vinuphos

گروه دارویی: آلکالوئید

گروه درمانی: محرک ملایم سیستم عصبی

📦 شکل دارویی: در ترکیب با A.C.A

مصرف در حاملگی:

موارد مصرف: افزایش بیداری، هشیاری و تسریع کارکرد عضلات و افزایش عملکرد سیستم تنفسی - به همراه ضد دردها (آسپیرین یا کدئین) مصرف می‌شود.

⚖️ میزان مصرف: در ترکیبات متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، سردرد، بی خوابی، تشنج، وزوز گوش، توهم بینایی و باعث افزایش ناراحتی گوارشی می‌شود.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت بروز علائم مسمومیت، شست‌وشوی معده و تخلیه آن مفید است.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف بیش از حد آن خطرناک می‌باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

☑️ نکته: در بیماران با زخم معده با احتیاط مصرف شود.

## روغن کاد (CADE OIL)

گروه دارویی: روغن‌های پوستی

گروه درمانی: ضد عفونی کننده‌ها و ضد خارش پوست

شکل دارویی: توده حجیم (پماد، شامپو)، فله

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: در درمان موضعی اگزما، خارش و شوره استفاده می‌شود.

میزان مصرف: پماد موضعی ۱ تا ۲ بار روزانه

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

عوارض جانبی مهم: جوش و کورک موضعی ایجاد کند.

توجهات پزشکی - پرستاری: روی زخم نباید استفاده شود.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو نباید با چشم در تماس باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.

## کالامین (CALAMINE)

نام تجاری: Calamox

گروه دارویی: اکسیدهای روی و آهن

گروه درمانی: ضد خارش موضعی

📦 شکل دارویی: لوسیون و کرم موضعی (۸٪)

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: خارش، التهاب خفیف پوستی، گرم‌زدگی (آفتاب سوختگی)

📏 میزان مصرف: یک تا ۳ بار در روز به صورت موضعی

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: مورد خاصی ندارد.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو از راه جلدی جذب نمی‌شود و آثار عمومی به جا نمی‌گذارد. این دارو فقط برای استعمال خارجی است. لوسیون را با پارچهٔ کتان روی محل بمالید و صبر کنید تا خودش خشک شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت خوردن کالامین به صورت اتفاقی، شیر یا آنتی اسیدهای خوراکی مفیدند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

# کالسی پوتریول (CALCIPOTRIOL)

نام تجاری: Dovonex

گروه دارویی: آنالوگ ویتامین D3

گروه درمانی: ضد پسوریازیس

شکل دارویی: پماد موضعی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضد پسوریازیس

میزان مصرف: روزانه ۲ بار پماد مالیده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، پوست سر و صورت،

افزایش شدید کلسیم خون

⚠️ عوارض جانبی مهم: تحریک پوست به صورت موضعی و افزایش کلسیم

خون به علت جذب ۶٪ از این دارو به صورت عمومی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: علائم بهبودی طی ۱ تا ۲ هفته ظاهر

می شود. در بیماری پسوریازیس شدید کاربرد ندارد.

آموزش بیمار - خانواده: پماد فقط باید روی ضایعه خوب مالیده شود. از

تماس آن با چشم جلوگیری شود. در صورتی که طی ۲ تا ۸ هفته بهبود

نسبی حاصل نشد به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## کالسی تونین (CALCITONIN)

نام تجاری: Salmon

گروه دارویی: پلی پپتید - هورمون تیروئید  
گروه درمانی: ضد پوکی استخوان (استئوپورز)

📌 شکل دارویی: تزریقی و اسپری بینی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پیشگیری از پوکی استخوان پس از یائسگی، بیماری پازه  
استخوان و نئوپلاسم‌های بدخیم

🕒 میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۰۰ واحد در روز یا یک روز در میان به صورت

زیر جلدی یا عضلانی یا یک پاف اسپری بینی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠️ عوارض جانبی مهم: حساسیت شدید و شوک، مشکلات قلبی، کمر درد،

خونریزی و سردرد، تهوع و استفراغ

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: سطح آلکالن فسفاتاز و کلسیم را باید

اندازه گرفت. بهتر است دارو را شب‌ها پیش از خواب تجویز کنید. هنگام

تزریق دارو کلسیم تزریقی آماده داشته باشید.

آموزش بیمار - خانواده: - گرگرفتگی صورت در درصد کمی از بیماران

رخ می‌دهد و بلافاصله بر طرف می‌شود. بیمار باید غذاها و داروهای

حاوی کلسیم مصرف کند. برای استفاده از اسپری برای اولین بار، بازوی

سفید کناری را ۶ بار به پایین فشار دهید تا مقدار کمی از اسپری خارج

شود. اسپری بینی را هر روز در یک سوراخ بینی استفاده کنید.

شرایط نگهداری: آمپول در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود و اسپری

در دمای اتاق حفظ شود.

# کالسی تریول (CALCITRIOL)

نام تجاری: Rocaltrol

گروه دارویی: آنالوگ ویتامین D

گروه درمانی: ضد هیپوکالسمی

شکل دارویی: کپسول ۰/۲۵ میکروگرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان کمبود کلسیم به ویژه در بیمارانی که تحت درمان با دیالیز قرار دارند. درمان هیپو پاراتیروئیدیسم، بیماری ریکتز (کمبود ویتامین D)

میزان مصرف: ۰/۵ تا ۲ میکروگرم و طی ۴ تا ۸ هفته میزان آن را افزایش می‌دهیم.

موارد منع مصرف: بیماران با کلسیم خون بالا و مسمومیت با ویتامین D  
عوارض جانبی مهم: فشار خون بالا، خارش، سردرد، ضعف، بی‌قراری، تهوع، سنگ کلیوی، کاهش میل جنسی، خشکی دهان، درد استخوان، بی‌نظمی ریتم قلبی (آریتمی)

توجهات پزشکی - پرستاری: سطح سرمی کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز و عملکرد کلیه قبل از شروع درمان بررسی شود. احتمال هیپرکالسمی وجود دارد.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز علائم قلبی یا مسمومیت به پزشک اطلاع دهید. دارو را می‌توان با غذا یا پیش از غذا مصرف کرد. شرایط نگهداری: دارو را در دمای معمولی نگهداری کنید.

## کربنات کلسیم (CALCIUM CARBONAT)

نام تجاری: D5-Cal

گروه دارویی: املاح و الکتrolیت‌ها

گروه درمانی: آنتی اسید، ترکیب کمکی کلسیم

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: هیپرفسفاتی ناشی از نارسایی کلیه، کاهش کلسیم، به

عنوان آنتی اسید در زخم معده

⚠️ میزان مصرف: در کاهش کلسیم به مقدار ۵۰۰ میلی گرم تا ۲ گرم، یک

تا ۴ قرص توصیه شده است.

موارد منع مصرف: هیپرکلسمی، هیپوفسفاتی، سنگ کلیوی،

فیبریلاسیون بطنی

⚠️ عوارض جانبی مهم: خشکی دهان، یبوست، احساس تشنگی و تکرر

ادرار، سنگ کلیه و حتی کوما

⚠️ توجهات پزشکی: پرستاری: مراقب بروز افزایش کلسیم باشید.

اندازه گیری کلسیم خون مفید است.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است دارو را یک ساعت بعد از غذا به

بیمار بدهید. در صورت علامت افزایش شدید کلسیم مثل خشکی دهان

و تشنگی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری کنید.

## کلسیم کلراید (CALCIUM CHLORIDE)

نام تجاری: Posture

گروه دارویی: جایگزین کلسیم

گروه درمانی: اختلال الکترولیتی

شکل دارویی: تزریقی (۱۰۰ میلی گرمی) 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: احیای قلب، کاهش کلسیم شدید، مسمومیت با منیزیم  
میزان مصرف: در کمبود کلسیم شدید ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم با فاصله  
۱ تا ۳ روز تزریق شود.

موارد منع مصرف: بالا بودن سطح کلسیم، سنگ کلیوی، نامنظمی  
قلبی

عوارض جانبی مهم: تحریک محل تزریق، احساس سوزش در محل  
تزریق، کاهش فشار خون، سنگ کلیه

توجهات پزشکی - پرستاری: خروج دارو در هنگام تزریق باعث مرگ  
بافت در محل نشت دارو می شود.

در تزریق دارو از اسکالپ وین استفاده نکنید.

پس از تزریق، بیمار به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به صورت درازکش بخوابد.

محلول را در هنگام تزریق تا ۳۷ درجه گرم کنید.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه عارضه را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



## کلسیم - د (CALCIUM-D)

گروه دارویی: کلسیم + ویتامین D

گروه درمانی: مکمل های غذایی

شکل دارویی: قرص حاوی کلسیم و ویتامین D

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کمبود کلسیم، استئوپورز (پوکی استخوان)، کمبود شدید

کلسیم و ویتامین D (ریکتز)

میزان مصرف: ۲ قرص روزانه

موارد منع مصرف: هیپرکلسمی و سنگ های کلیوی، فیبریلاسیون

بطنی

⚠ عوارض جانبی مهم: یبوست، خشکی دهان، بی اشتهایی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با داروهای آنتی بیوتیک

(تتراسیکلین)، فنی توئین، آهن و آسپیرین تداخل دارد.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت علائم خشکی شدید دهان، استفراغ

و تکرر ادرار را به پزشک اطلاع دهید.

به همراه یک لیوان آب مصرف شود.

دارو را یک ساعت بعد از غذا مصرف کنید.

مصرف زیاد آن خطرناک است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و در جای خشک نگهداری شود.

# کلسیم فورت (CALCIUM FORTE)

نام تجاری: Calcium sandozforte

گروه دارویی: جایگزین کلسیم

گروه درمانی: الکترویت‌ها

⑤ شکل دارویی: قرص جوشان کلسیم

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: کمبود کلسیم، (استئوپوز) پوکی استخوان

⚖️ میزان مصرف: ۲ قرص جوشان ۳ بار در روز تا یک هفته

موارد منع مصرف: از زمان افزایش کلسیم در خون و سنگ کلیه

⚠️ عوارض جانبی مهم: مثل دیگر موارد کلسیم

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: مشابه موارد فوق

آموزش بیمار - خانواده: مشابه موارد فوق

شرایط نگهداری: در دمای اتاق و در جای خشک نگهداری شود.

## کلسیم دُبسیلات (CALCIUM DOBESILATE)

گروه دارویی: مکمل های کلسیم

گروه درمانی: درمان اختلالات عروق

شکل دارویی: قرص ۲۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: مشخص نشده است.

موارد مصرف: اختلال عروق و نارسایی عروق، ضایعات شبکیه چشم،

ادم اندام ها

میزان مصرف: روزانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم خوراکی

موارد منع مصرف: بالا بودن کلسیم خون و سنگ کلیوی

عوارض جانبی مهم: مثل موارد قبل

توجهات پزشکی - پرستاری: مثل موارد قبل

آموزش بیمار - خانواده: دارو را همراه غذا یا پس از غذا مصرف کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

# کلسیم گلوکونات (CALCUM GLUCONATE)

نام تجاری: Kalcinate

گروه دارویی: جایگزین کلسیم

گروه درمانی: اختلالات الکترولیت

⑤ شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: درمان حاد کمبود کلسیم، بالا بودن پتاسیم، بالا بودن منیزیم، ایست قلبی

⚖ میزان مصرف: مشابه موارد قبل

موارد منع مصرف: مشابه موارد قبل

⚠ عوارض جانبی مهم: مشابه موارد قبل

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت مشاهده رسوب، دارو را تزریق نکنید.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت ناراحتی گوارشی نیم ساعت بعد از غذا دارو را مصرف کنید. مصرف اسفناج، شیر و لبنیات همزمان با مصرف دارو جذب کلسیم را کاهش می دهد.


شرایط نگهداری: در دمای اتاق و در جای خشک نگهداری شود.

## کلسیم پانتوتنات (CALCIUM PANTHOTENATE)

نام تجاری: Pantenil

گروه دارویی: اسید پانتوتنیک

گروه درمانی: ویتامین‌ها (B5)

شکل دارویی: قرص ۱۰۰ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کمبود ویتامین B5 و پیشگیری از کمبود آن

میزان مصرف: روزانه ۵ تا ۱۰ میلی گرم از راه خوراکی

موارد منع مصرف: گزارش نشده است

عوارض جانبی مهم: موردی وجود ندارد

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: جایگزین کلسیم نیست، زیرا کلسیم بالا ندارد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را ۲ تا ۳ ساعت بعد از غذا مصرف کنید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق ارجح است.

# کاپرئومايسين (CAPREOMYCIN SULFAT)

نام تجاری: Capastat

گروه دارویی: آنتی بیوتیک (استرپتومايسين)

گروه درمانی: ضد سِل (TB)

شکل دارویی: آمپول تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیماری سِل

میزان مصرف: ۱ گرم روزانه به مدت ۶۰ تا ۱۲۰ روز (۲ تا ۴ ماه)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، و در میاستنی گراویس و پارکینسون با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی مهم: آسیب شنوایی و کلیوی و ضایعات خونی

توجهات پزشکی - پرستاری: خونریزی و درد در محل تزریق جزء عوارض است. تست‌های کبدی و کلیوی قبل، حین و بعد درمان باید کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت کاهش شنوایی یا عدم تعادل به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود ولی محلول آماده به مدت ۲ هفته در یخچال قابل نگهداری است.

## کاپ سیکوم (CAPSICUM)

نام تجاری: Mentopin 544

گروه دارویی: ضد التهاب‌های موضعی

گروه درمانی: ضد خارش

شکل دارویی: چسب در قطعات مختلف

مصرف در حاملگی: مطالعه‌ای وجود ندارد

موارد مصرف: دردهای عضلانی و مفصلی، درد استخوانی و دردهای با

ریشه اعصاب محیطی

میزان مصرف: قطعات مختلف چسب

موارد منع مصرف: تحریک شدید

عوارض جانبی مهم: حساسیت موضعی

توجهات پزشکی - پرستاری: موردی ندارد

آموزش بیمار - خانواده: چسب تا ۴۸ ساعت روی بدن بماند

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## کاپتوپریل (CAPTOPRIL)

نام تجاری: Capoten

گروه دارویی: مهارکننده تبدیل آنژیوتانسین  
گروه درمانی: کنترل فشارخون و گشاده کننده عروق  
شکل دارویی: قرص ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی  
مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشارخون، نارسایی قلب، اختلال عملکرد بطن چپ  
قلب، ضایعات کلیوی، دیابت قندی  
میزان مصرف: ۱۲/۵ تا ۲۵ میلی گرم دوبار در روز  
موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و سابقه بروز حساسیت  
(آنژیوادم)

⚠ عوارض جانبی مهم: کاهش فشارخون، اختلال در حس چشایی،  
سرگیجه، مشکل خونی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: بیمار ممکن است دچار مشکلات خونی  
شود آزمایش ضروری است

- برای قضاوت درباره پاسخ درمانی ۲ هفته وقت لازم است.  
آموزش بیمار - خانواده: دارو را یک ساعت قبل از غذا استفاده کنید.  
در هنگام مصرف بار اول تا ۳ ساعت پس از مصرف در بستر بخوابید.  
در صورت بروز ضایعات جلدی و تورم گلو و دست و پا به پزشک مراجعه  
شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.




## کارباکول (چشمی) (CARBACHOL)

نام تجاری: Carbastate

گروه دارویی: پاراسمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: ضد آب سیاه چشم (گلوکوم)

شکل دارویی: قطره چشمی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کاهش فشار داخل کره چشم (گلوکوم)

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قطره از قطره چشمی ۰.۳٪ حداکثر ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید و انواع گلوکوم مقاوم به درمان

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، ترشح اشک و بزاق، تپش قلب،

تشنج

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو اثر تنگ کنندگی مردمک دارد. 

آموزش بیمار - خانواده: از قطع ناگهانی دارو پرهیز نمایید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.

# کارباماز پین (CARBAMAZ PIN)

نام تجاری: Tegretol

گروه دارویی: مشتق ایمینوستیلین

گروه درمانی: ضد تشنج و دردهای عصبی

شکل دارویی: قرص ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تشنج (جنرالیزه) و دردهای عصب سه شاخه (V) (تری ژمینال)

میزان مصرف: حداقل ۱۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز

موارد منع مصرف: بیماران با حساسیت شدید دارویی، بیماران با سابقه

مهار و نارسایی مغز استخوان

عوارض جانبی مهم: سرگیجه، کهیر، اسهال، زخم و التهاب دهان و زبان، اختلال خونی

توجهات پزشکی - پرستاری: قبل از شروع درمان با این دارو

تست‌های خونی و کبدی و عملکرد کلیوی به عمل آید.

میزان بالای دارو باعث بی نظمی ریتم قلب می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو بهتر است همراه غذا استفاده شود.

از رانندگی اجتناب شود. در افراد سالمند با احتیاط استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## کاربامید پراکساید (CARBAMID PEROXIDE)

نام تجاری: Murine

گروه دارویی: ضد عفونی کننده ها

گروه درمانی: ضد التهاب، ضد عفونت

⑤ شکل دارویی: محلول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تسکین التهاب، تحریکات و ضایعات دهان، زبان و پوست

⚖ میزان مصرف: متفاوت

موارد منع مصرف: برای کودکان و سالمندان تجویز نشود

⚠ عوارض جانبی مهم: مورد خاصی وجود ندارد.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: به عنوان غرغره در دهان یا به صورت

محلول برای نرم کردن واکس گوش استفاده می شود.

آموزش بیمار - خانواده: طبق دستور پزشک عمل شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

# کاربنی سیلین (CAR BENICILLIN)

نام تجاری: Pyopen

گروه دارویی: آنتی بیوتیک‌ها

گروه درمانی: پنی سیلین‌ها (ضد پseudomonas)

⑥ شکل دارویی: قرص و ویال تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: علیه عفونت‌های ادراری، مننژیت، عفونت بافت نرم و پوست

⚠️ میزان مصرف: در درمان عفونت ادراری ۱ تا ۲ قرص هر ۶ ساعت، حداقل ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۴ ساعت از راه وریدی یا عضلانی

موارد منع مصرف: حساسیت به پنی سیلین‌ها

⚠️ عوارض جانبی مهم: عوارض گوارشی، اسهال، درد شکم، تهوع و طعم تلخ  
⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: توجه به تاریخچه حساسیت دارویی به پنی سیلین‌ها مهم است

توصیه کنید دارو با معده خالی استفاده شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز اسهال و تهوع شدید به پزشک اطلاع دهید.

داروی خوراکی را با یک لیوان آب مصرف کنید.

دارو باید سر ساعت استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق و جای خشک نگهداری شود.

## کاربوپلاتین (CARBOPLATIN)

نام تجاری: Paraplatin

گروه دارویی: الکیله کننده‌ها

گروه درمانی: ضد نئوپلاسم

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان تخمدان، سرطان ریه، سرطان‌های رحمی، لوسمی، تومور بیضه

میزان مصرف: ۳۶۰ میلی گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن که بعد

از ۴ هفته تکرارپذیر است ولی در درمان کمکی با سیکلوفسفاماید، ۳۰۰

میلی گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن فرد تجویز می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، نارسایی کلیه و حاملگی

عوارض جانبی مهم: تهوع و استفراغ، کاهش فعالیت مغز استخوان و کم

خونی، عوارض شدید کلیوی به ویژه اگر همراه داروهایی مثل

جنتامایسین استفاده شود.

توجهات پزشکی - پرستاری: تجویز توسط پزشک با تجربه در زمینه

درمان سرطان‌ها (آنکولوژیست) صورت گیرد.

آزمایش‌های خونی و کلیوی در ابتدا و در حین درمان انجام شود.

عفونت یا گلو درد در حین درمان مهم تلقی شود.

- احتمال خونریزی از لثه و مجاری ادراری بالا می‌رود.

آموزش بیمار - خانواده: - هرگونه کبودی یا خونریزی از بینی را به

پزشک اطلاع دهید.

اختلالات حسی و بینایی را به پزشک اطلاع دهید و مراقب باشید در طول درمان، ضربه یا آسیب فیزیکی به بدن وارد نشود.  
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



## کارموستین (CARMUSTIN)

نام تجاری: Bicnu

گروه دارویی: آلکیل کننده (نیتروس اوره)

گروه درمانی: ضد سرطان

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: در درمان سرطان‌های مغز و ساقه مغز، لنفوم، مولتیپل میلوما

⑥ میزان مصرف: ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی گرم به ازای هر متر مربع وریدی هر ۶ هفته

موارد منع مصرف: در عفونت ویردلی مثل آبله یا هرپس، نارسایی کلیه و کاهش پلاکت خون مصرف آن ممنوع است.

⚠ عوارض جانبی مهم: باعث ایجاد ترومبوسیتوپنی (کاهش سلول‌های پلاکتی خون) و باعث لوسمی حاد، اسهال، بی‌اشتهایی و ترومبوز (ایجاد لخته در وریدها) می‌شود.

⚠ توجهات پزشکی-پرستاری: تست‌های کبدی و کلیوی و خونی قبل و حین درمان انجام شود.

بیمار به علت عوارض شدید این دارو باید زیر نظر مستقیم پزشک باشد. احتمال خونریزی را به بیمار گوشزد کنید.

آموزش بیمار-خانواده: پس از تزریق، در محل تزریق یخ قرار دهید. حین درمان ممکن است برافروختگی رخ دهد که بزودی از بین می‌رود.

ریزش مو و احتمال عفونت ویروسی را به بیمار تذکر دهید.  
شرایط نگهداری: محلول آن را در دمای ۲ تا ۸ درجه می توان نگهداری کرد.





## کارنیتین (CARNITINE)

نام تجاری: Vitacarn

گروه دارویی: اسید آمینه

گروه درمانی: مکمل غذایی

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: کمبود کارنیتین در برنامه‌های بدنسازی (تقویت

عضلات)، جلوگیری از کرامپ عضلانی در همودیالیز

میزان مصرف: برای فرد ۵۰ کیلویی ۱ تا ۳ گرم همراه غذا

موارد منع مصرف: موردی نیست

عوارض جانبی مهم: تهوع، اسهال و تغییر بوی بدن

توجهات پزشکی - پرستاری: پزشک معالج می‌بایست سطح کارنیتین

را قبل از درمان اندازه بگیرد.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار بهتر است دارو را با فاصله هر ۳ تا ۴

ساعت مصرف کند.

شرایط نگهداری: به شرایط خاص کارخانه سازنده توجه شود.

## روغن کرچک (CASTOR OIL)

نام تجاری: Neoloid

گروه دارویی: داروهای تشخیصی

گروه درمانی:

📦 شکل دارویی: روغن (BUIK)

مصرف در حاملگی: مطالعه‌ای ندارد.

موارد مصرف: رادیوگرافی تشخیص یا آمادگی قبل از عمل

⚠️ میزان مصرف: ۱۵ تا ۶۰ سی سی از محلول قبل از انجام رادیوگرافی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠️ عوارض جانبی مهم: اسهال، دل درد

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت شک به انسداد روده از مصرف آن خودداری شود.

آموزش بیمار - خانواده: نباید قبل از خواب مصرف شود زیرا باعث بروز اسهال شدید و اختلال خواب بیمار می‌شود.


شرایط نگهداری: در جای خنک (کمتر از ۱۵ درجه) نگهداری شود.

## سفازولین (CEFAZOLIN)

نام تجاری: Kefzol

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: سفالوسپورین نسل اول

شکل دارویی: آمپول (ویال) 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت‌های تنفسی، دستگاه ادراری، پوستی، مجاری صفراوی، عفونت خون (سپتی سمی)، عفونت دریچه‌های قلبی و پیشگیری قبل از عمل

میزان مصرف: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت وریدی یا ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم هر ۶ تا ۸ ساعت عضلانی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به گروه پنی سیلین‌ها  
⚠️ عوارض جانبی مهم: واکنش حساسیت، عوارض کلیوی، عوارض خونی، توهّم، تشنّج

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: بیمار پس از مصرف سفالوسپورین مستعد خونریزی می‌شود.

تزریق عضلانی ممکن است با درد شدید همراه باشد.  
آموزش بیمار - خانواده: هرگونه خون دماغ شدن را به پزشک اطلاع دهید.

هرگونه اسهال یا علائم عفونت ثانویه را اطلاع دهید.  
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## سفیکسیم (CEFIXIME)

نام تجاری: Suprax

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

Ⓢ شکل دارویی: قرص ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی، شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان عفونت ادراری، التهاب و عفونت گوش میانی،

عفونت حلق، برونشیت حاد و سوزاک

Ⓜ میزان مصرف: ۲۰۰ میلی گرم دوبار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠ عوارض جانبی مهم: عوارض کبدی - کلیوی، تهوع، استفراغ، نفخ، خواب

آلودگی، اسهال

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: پیش از شروع درمان کشت و آنتی

بیوگرام انجام شود.

در صورت تشنج، دارو را قطع کنید.

عوارض کلیوی در افراد بالای ۵۰ سال رخ می دهد.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه اسهال را گزارش دهید.

شرایط نگهداری: شربت آن بعد از تهیه تا ۱۴ روز در یخچال نگهداری

شود.

دور از نور و حرارت نگهداری شود.

## سفوتاکسیم (CEFOTAXIME)

نام تجاری: Claforan

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

⑤ شکل دارویی: ویال تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت ریه، عفونت ادرار، عفونت پوستی، پریتونیت، عفونت مغزی، سزارین

⚠ میزان مصرف: ۵/۰ تا ۱ گرم هر ۱۲ ساعت وریدی یا عضلانی

موارد منع مصرف: شبیه سفالوتین (حساسیت به پنی سیلین)

⚠ عوارض جانبی مهم: آلرژی، واکنش محل تزریق، اسهال، اختلالات خونی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در محل تزریق ترومبوفلیت (لخته و

انسداد وریدی به همراه التهاب) ایجاد می‌گردد.

به علت نارسایی کلیه، تست‌های کنترل کبدی انجام شود.

تزریق عضلانی باید عمیق باشد.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز اسهال اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: پودر آن در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## سفتازیدیم (CEFTAZIDIME)

نام تجاری: Fortum

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

📌 شکل دارویی: ویال

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت ریوی، عفونت ادراری - پوستی، عفونت استخوان

آبسه‌های داخل شکم، عفونت پرده مغز (مننژیت)

📏 میزان مصرف: ۵/۰ یا ۱ گرم سفتازیدیم از راه عضلانی

موارد منع مصرف: شبیه سفالوتین (صفحه ۱۶۱)

⚠️ عوارض جانبی مهم: خارش، کهیر، ادم، عارضه کلیوی، درد محل تزریق

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت اسهال شدید دارو قطع شود.

محلول تهیه شده طی ۳ تا ۵ دقیقه تزریق شود.

آموزش بیمار - خانواده: هر گونه تب مجدد یا عفونت در محل جدید را

به اطلاع پزشک برسانید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## سفتی زوکسیم (CEFTIZOXIME)

نام تجاری: Cafizox

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: ویال ۵/۰ و ۱ گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت‌های ریوی، ادراری، سوزاک، عفونت داخل

شکمی، عفونت پوستی، استخوان و مفاصل

میزان مصرف: ۱ تا ۲ گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت به پنی سیلین‌ها

⚠ عوارض جانبی مهم: مسمومیت، سوزش و درد محل تزریق، پارستزی،

راش پوستی، تهوع، استفراغ، اسهال، سردرد، عوارض کلیوی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی قبل و حین درمان باید انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: سابقه آلرژی به پنی سیلین و سفالوسپورین را به پزشک اطلاع دهید.

هرگونه اسهال را به پزشک اطلاع دهید.

ادامه تب یا ترشحات چرکی در هر محلی را به اطلاع پزشک برسانید.

شرایط نگهداری: پودر در دمای معمولی نگهداری شود.

## سفتریاکسون (CEFTRIAXONE)

نام تجاری: Rocephin

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

📦 شکل دارویی: ویال ۲۵۰، ۵۰۰ میلی گرمی و ۱ گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت‌های تنفسی، عفونت پوست و استخوان و کلیه  
میزان مصرف: ۱ تا ۲ گرم هر ۱۲ ساعت تا ۴ گرم حداکثر مصرف روزانه  
است. در مورد عفونت گونوره تزریق یک بار ۱۲۵ تا ۲۵۰ میلی گرم به  
همراه مصرف ۷ روز واکسی سیکلین

موارد منع مصرف: مثل دیگر سفالوسپورین‌ها  
⚠ عوارض جانبی مهم: عوارض خونی، آلرژی، اسهال، ضایعات کیسه  
صفرا، اکیموز، درد محل تزریق

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مواظب باشید این دارو تمایل به  
خونریزی را افزایش می‌دهد.

از مصرف آن در کودکان با زردی اجتناب کنید.  
آموزش بیمار - خانواده: - هر گونه اسهال یا شل شدن مدفوع را به  
پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: پودر آن در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## سفالکسین (CEPHALEXIN)

نام تجاری: Keflex

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل اول

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

📦 شکل دارویی: کپسول و شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت‌های تنفسی، عفونت گوش میانی، عفونت پوستی

استخوان و مفاصل و عفونت ادراری - تناسلی

📏 میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۴ گرم: هر ۶ ساعت ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم

به صورت معمول

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به پنی سیلین یا سفالوسپورین‌ها

⚠️ عوارض جانبی مهم: آلرژی، کهیر، اسهال، خارش

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت مصرف طولانی مدت عملکرد

کلیه و کبد کنترل شوند.

بیمار از نظر واکنش آلرژیک مانند خارش و کهیر بررسی شود.

آموزش بیمار - خانواده: هر گونه علائم نشانگر حساسیت را به پزشک اطلاع دهید.

دارو را در ساعت معین مصرف کنید.

شرایط نگهداری: کپسول در دمای اتاق و پودری که با مایع حل شده

است فقط ۱۴ روز در یخچال نگهداری شود.

## سفالوتین (CEPHALOTIN)

نام تجاری: Keflin

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل اول

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

⑤ شکل دارویی: ویال یک گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: مسمومیت، عفونت‌های ادراری، عفونت ریوی (پنومونی)، عفونت استخوانی (استئومیلیت)

⚠ میزان مصرف: ۵۰۰ میلی گرم تا ۲ گرم هر ۴ تا ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، افراد مستعد خونریزی، ولی در افراد با سابقه کم خونی و تشنج یا مشکلات کلیوی با احتیاط مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: واکنش حساسیتی (آلرژی)، کهیر، راش، تهوع، اسهال، تحریک معده، درد محل تزریق، مشکلات خونی، نارسایی کلیه  
⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: هرگونه کاهش ادرار باید مورد توجه قرار گیرد.

تب به همراه اسهال بسیار مهم است.

داروی آماده تزریق به مدت ۴ روز در یخچال قابل نگهداری است.  
آموزش بیمار - خانواده: اسهال و هرگونه تب بعد از درمان را به پزشک اطلاع دهید.

استفاده از دوغ یا ماست، زمینه بروز عفونت ثانویه را در تخمیر

میکروب‌های عادی روده از بین می‌برد.  
کبود شدن پوست و خون دماغ شدن را اطلاع دهید.  
شرایط نگهداری: پورد را در دمای معمولی اتاق نگهدارید.



## سفرا دین (CEPHRADINE)

نام تجاری: Velosef

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل اول

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول، ویال و شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت ریه، گلودرد چرکی، عفونت گوش میانی، عفونت

پوستی، پیشگیری از عفونت در جراحی‌ها

میزان مصرف: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت و در انواع شدید

عفونت ۱ گرم هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت به گروه پنی سیلین

عوارض جانبی مهم: حساسیت محل تزریق، اسهال و عوارض مشابه

سفالوتین‌ها

توجهات پزشکی - پرستاری: دریافت شرح حال از سابقه حساسیت به

پنی سیلین مهم است.

آموزش بیمار - خانواده: دوره درمان را کامل کنید. بروز اسهال و تب را

به پزشک معالج اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: پودر سفرا دین در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری

شود.

## ستریمید - سی (CETRIMIDE-C)

نام تجاری: Cetavlon

گروه دارویی: آمونیوم کواترنر

گروه درمانی: ضد عفونی کننده

شکل دارویی: محلول 

مصرف در حاملگی: مطالعه‌ای نشده است.

موارد مصرف: ضد عفونی زخم‌های ناشی از سوختگی و تمیز کننده

پوست و التهاب پوست و شست و شوی حین جراحی در کیست هیداتید

غلظت میزان مصرف: به طور موضعی برای ضد عفونی زخم‌ها استفاده

می‌شود.

موارد منع مصرف: خوردن آن ممنوع است و مسمومیت و آلودگی

شدید ایجاد می‌کند.

⚠ عوارض جانبی مهم: در صورت استفاده موضعی با غلظت زیاد، پوست را

تحریک می‌کند.

تهوع و استفراغ، مهار فعالیت مغزی، کاهش فشارخون و مشکل تنفسی

ایجاد می‌کند.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: واکنش حساسیت ممکن است بروز کند

(به ویژه در غلظت‌های بالا).

آموزش بیمار - خانواده: از تماس محلول با مخاط بدن مثل دهان،

زبان و حفره بینی شدیداً اجتناب شود.

از تماس مکرر با پوست خودداری شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

# ستیل پیریدینیوم

## (CETYL - PYRIDINIOM CHOLORIDE)

نام تجاری: Cepaco

گروه دارویی: پیریدینیوم

گروه درمانی: ضد عفونی کننده ها

📌 شکل دارویی: محلول

مصرف در حاملگی: مصرف خوراکی ممنوع است.

موارد مصرف: ضد عفونی و درمان التهاب لثه ها و عفونت های جزیی دهان

📏 میزان مصرف: ۳ بار در روز غرغره شود تا تمام حفره دهان شست و شو شود.

موارد منع مصرف: مشابه ستیریمید C (صفحه قبل)

⚠ عوارض جانبی مهم: مشابه ستیریمید C

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مشابه ستیریمید C

آموزش بیمار - خانواده: مشابه ستیریمید C

شرایط نگهداری: مشابه ستیریمید C

## شارکول فعال (CHARCOAL ACTIVATED)

نام تجاری: Charcocaps

گروه دارویی: زغال فعال

گروه درمانی: ضد مسمومیت، ضد التهاب

⑤ شکل دارویی: قرص و محلول و پودر

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: مسمویت‌های دستگاه گوارش، نفخ، پوشش زخم بدبو،

درمان خارش در نارسایی کلیه

⚠ میزان مصرف: برای سم زدایی در معده و روده ۱ تا ۲ گرم به ازای هر

کیلوگرم وزن بدن

موارد منع مصرف: در موردی که ضد سم خوراکی مثل میتیونین

استفاده شده ممنوع است.

⚠ عوارض جانبی مهم: استفراغ، اسهال و یبوست گزارش شده است.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو در درمان مسمومیت با نفت

تأثیری ندارد.

ارجح است دارو طی ۳۰ دقیقه پس از مسمومیت مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: می‌توان دارو را با آب میوه مصرف کرد.

در موارد اوزان‌س محلول با آب معمولی تهیه و مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

# قرص سرماخوردگی اطفال (CHILDREN COLD)

نام تجاری: Coricidindemilets

گروه دارویی: آنتی هیستامین

گروه درمانی: ضد حساسیت و ضد تب و سرماخوردگی

شکل دارویی: قرص جویدنی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: این دارو شامل ترکیب استامینوفن و آنتی هیستامین فیل پروپانول آمین و کلرفنیر آمین است که در درمان سرماخوردگی و آبریزش بینی و عطسه با تب به کار می‌رود.

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص هر ۴ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت به آنتی هیستامین و انسداد روده

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، بی قراری، سرگیجه، یبوست، اسهال، ضعف عمومی

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو دارای خاصیت ضد درد و ضد تب و ضد احتقان می‌باشد. وضعیت تنفسی بیمار را تحت نظر داشته باشید.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو با گیجی و خواب آلودگی همراه خواهد بود.

شست و شوی همزمان دهان، جلوی خشکی دهان را خواهد گرفت. شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## کلرامبوسیل (CHOLORAMBUCIL)

نام تجاری: Leukeran

گروه دارویی: الکیله کننده

گروه درمانی: ضد نئوپلاسم (ضد سرطان)

📦 شکل دارویی: قرص ۲ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان‌هایی مثل: لنفوم (هوچکین و غیر هوچکین)، به طور جانبی در درمان روماتوئید آرتریت و سندرم بهجت استفاده می‌شود.

⚖️ میزان مصرف: درمان اولیه ۰/۱ تا ۰/۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن به مدت ۳ تا ۶ هفته می‌باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به کلرامبوسیل یا گروه داروهای الکیله کننده

⚠️ عوارض جانبی مهم: کاهش سلول‌های خونی (WBC) و اختلالات خونی،

کم خونی، عوارض ریوی، سرفه، مشکلات گوارشی، زخم دهان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: بررسی آزمایش‌های خونی قبل و حین درمان ضروری است.

اسیداوریک اندازه‌گیری شود.

احتمال بروز عفونت و خونریزی به بیمار گوشزد شود.

در خانم‌ها عملکرد تخمدان و دوره ماهانه مختل می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: هر ۲ هفته یک بار بیمار می‌بایست تحت نظر

پزشک معاینه شود.

زنان در سن بارداری باید از روش جلوگیری استفاده کنند.  
این دارو به شدت برای حاملگی خطرناک و توام با اختلالات در جنین  
است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## کلرامفنیکل (CHLORAMPHENICOL)

نام تجاری: Chloromycetin

گروه دارویی: مشتقات دی کلرواستیک

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

⑤ شکل دارویی: کپسول، محلول تزریقی و قطره

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت‌های شدید پرده مغزی (مننژیت)، عفونت

تیفوئید، آبسه‌های مغزی، گازگنگرن

⚠ میزان مصرف: به میزان ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: کم خونی، کاهش تعداد سلول‌های خونی، مشکل

بینایی، واکنش حساسیت شدید، مشکلات گوارشی، نارسایی کبدی،

زردی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: قبل از شروع درمان، حتماً کشت عفونت

تهیه شود.

سطح خونی کلرامفنیکل باید اندازه‌گیری شود.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه کاهش ادرار را به پزشک اطلاع دهید.

احساس طعم تلخی در دهان پس از تزریق، مشکل معمول است.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

# کلرامفنیکل (چشمی) (CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC)

نام تجاری: Chlorofair

گروه دارویی: مشتق دی کلرواستیک

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قطره چشمی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت‌های باکتریال سطح چشم، التهاب قرینه، التهاب و عفونت ملتحمه چشم

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قطره هر ۳ تا ۶ ساعت در چشم

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، عفونت تب خالی چشم، آبله مرغان، عفونت میکروبی (مایکوباکتریوم)، سیل چشم و بیماری قارچی

عوارض جانبی مهم: خارش، سوزش، کهیر، عوارض خونی

توجهات پزشکی - پرستاری: گاهی برای درمان عفونت‌های شدید نیاز به تجویز همزمان آنتی بیوتیک خوراکی یا تزریقی می‌باشد.

آموزش بیمار - خانواده: با شرایط استریل از قطره استفاده کنید یعنی قطره چکان با چشم یا پوست تماس نداشته باشد. شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## کلرودیازپوکساید (CHLORODIAZPOXID)

نام تجاری: Librium

گروه دارویی: بنزودیازپین

گروه درمانی: ضد اضطراب

شکل دارویی: قرص ۵ و ۱۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اضطراب، محرومیت از الکل و عوارض ناشی از ترک آن

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص ۳ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: مثل دیازپام (صفحه ۲۵۱)

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، سردرد، اختلال فکری، احتباس ادراری، مشکلات گوارشی، مشکلات تنفسی، اختلال کارکرد کبد، خشکی دهان، یبوست

توجهات پزشکی - پرستاری: در بیماران با نارسایی ریه، پورفیری (نوعی بیماری ارثی و نادر خون) و بیماران دچار کاهش آلومینیوم خون با احتیاط استفاده شود.

آموزش بیمار - خانواده: بعد از مصرف دارو رانندگی ممنوع است. شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

# کلرهگزیدین گلوکونات

## (CHLORHEXIDINE GLUCONATE)

نام تجاری: 5Chlorohex

گروه دارویی: ضد عفونی کننده ها

گروه درمانی: دهان شویه ها

Ⓢ شکل دارویی: محلول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های دهان، زخم های دهان و لثه  
⚡ میزان مصرف: روزی ۲ بار هر بار چند دقیقه غرغره شود.

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی شدید

⚠ عوارض جانبی مهم: تغییر در احساس چشایی، پوسته پوسته شدن  
مخاط، بزرگی غدد بزاقی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت حساسیت موضعی یا پوسته  
ریزی میزان دارو را کاهش دهید.

آموزش بیمار - خانواده: پس از غرغره کردن دهان شویه، به مدت نیم  
ساعت از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## کلرمتین کلراید ((CHLORMETHINE (HCL))

نام تجاری: Mustargen

گروه دارویی: الکیله کننده

گروه درمانی: ضد سرطان مهار سیستم ایمنی

شکل دارویی: تزریقی (۱۰ میلی گرم) 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: لنفوم، لنفوسارکوم، سرطان ریه و سرطان‌های CML و

CLL

⚠ میزان مصرف: ۰/۴ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم تزریق شود.

موارد منع مصرف: آبله‌مرغان، زونا (بیماری پوستی و ویروسی)، نقرس

(بیماری التهابی مفاصل ناشی از افزایش اسیداوریک خون)

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، تمایل به خونریزی، سرگیجه، خواب

آلودگی، بی اشتها

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در هنگام تزریق از دستکش و ماسک

استفاده کنید.

آموزش بیمار - خانواده: طبق دستور به صورت متوالی به پزشک

مراجعه شود. در صورت خونریزی و خونمردگی به پزشک اطلاع دهید.

کچلی ناشی از دارو و برگشت‌پذیر است

مسواک زدن باید با دقت و با مسواک نرم باشد.

استعمال سیگار و نوشیدن الکل خطرناک است.

از برخورد نزدیک با بیماران ویروسی باید پرهیز شود.

شرایط نگهداری: پودر در دمای معمولی نگهداری شود.

# کلروکین فسفات (CHLOROQUIN PHOSPHAT)

نام تجاری: Aralen

گروه دارویی: آمینوکینولین

گروه درمانی: ضد مالاریا

شکل دارویی: قرص و آمپول ۲۵۰ و ۱۵۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت‌های مالاریایی، عفونت با آمیب داخل و خارج روده‌ای، کنترل التهاب رماتیسم مفصلی، زخم روده بزرگ و التهاب مفصل، آسم، بیماری‌های التهابی و ناشناخته پوستی مثل درماتومیوزیت، لیکن پلان، اریتم ندوزم

نقشه میزان مصرف: مصرف اولیه در بالغین ۶۰۰ میلی گرم و سپس ۶ ساعت ۳۰۰ میلی گرم و در اطفال، با ۱۰ میلی گرم شروع شود و با ۵ میلی گرم به ازای هر کیلو وزن ادامه یابد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، نارسایی کلیه، مشکلات پرده شبکیه چشم، پورفیری

عوارض جانبی مهم: تهوع، اسهال، اختلال بینایی، اضطراب، خستگی، ضعف عمومی، بی قراری، افسردگی و بی اشتها

توجهات پزشکی - پرستاری: معاینه چشم و بررسی عملکرد کلیه در بیماران، قبل از درمان ضروری است.

نوار قلب در حین درمان ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار در حین درمان دراز مدت باید تحت نظر



چشم پزشک باشد.  
در بیماران مبتلا به فاویسم با احتیاط مصرف شود  
بیمار باید دوره درمان را کامل کند.  
شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



# کلوروکسیلنول (CHLOROXYLENOL)

نام تجاری: Dettol

گروه دارویی: دی متیل فنل

گروه درمانی: ضد عفونی کننده

⑤ شکل دارویی: محلول موضعی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: ضد عفونی زخم

⚠ میزان مصرف: برای شست و شوی زخم‌ها و خراش‌های سطحی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠ عوارض جانبی مهم: تحریکات پوستی در غلظت‌های بالا

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: روی میکروب‌های شایع مثل استاف اثر

کمی دارد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو ممکن است در زمان استفاده به میکروب

آلوده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## کلرفنیرآمین مالئات (CHLORPHENIRAMIN MALEAT)

نام تجاری: Chlor -Trimeton

گروه دارویی: الکیل آمین

گروه درمانی: ضد حساسیت، بی حس کننده موضعی

⑤ شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان علامتی حساسیت‌ها، کهیر، آنژیوادم، آب‌ریزش آلرژیک بینی و بیماری‌های التهابی پوست

⚖ میزان مصرف: ۴ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت و نوع تزریقی ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم تزریقی

موارد منع مصرف: حساسیت به آنتی هیستامین‌ها ولی در آسم با احتیاط مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: خواب‌آلودگی، گیجی، خشکی دهان، مشکلات خونی و گوارشی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در افراد با زخم معده، آب سیاه چشم و احتباس ادراری با احتیاط مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو را می‌بایست به میزان کمتری در سالمندان استفاده کرد. رانندگی بعد از مصرف دارو ممنوع است. مصرف همزمان داروهای خواب‌آور ممنوع می‌باشد. از مایعات کافی استفاده شود.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

# کلرپرومازین (CHLORPROMAZINE HCL)

نام تجاری: Largactile

گروه دارویی: فنوتیازین‌ها

گروه درمانی: ضد سایکوز، آرامبخش

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اختلالات روانی شدید (سایکوز) یا حملات حاد مانیا و به عنوان آرامبخش، سکسکه مقاوم، بی‌اشتهایی عصبی، میگرن و در فشار خون حاملگی، درمان وابستگی به مخدرها و در نوزادان و دیستونی گردنی

میزان مصرف: ۲۵ میلی گرم عضلانی تزریق شود و در صورت لزوم تکرار شود

در تهوع و استفراغ ۱۰ تا ۲۵ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت خوراکی  
موارد منع مصرف: حساسیت شدید، حالت کوما منع مصرف دارد ولی در بیماران تنفسی و کبدی و تشنجی یا مصرف کنندگان داروهای همزمان اعصاب و روان با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، کاهش فشار خون، عوارض چشمی، کهیر، آسم، تورم خنجره، تغییر رنگ پوست

توجهات پزشکی-پرستاری: پزشک می‌بایست سابقه بیماران مبتلا به آسم، تشنج و کهیر را بررسی کند.

داروهای اعصاب و روان دیگر تجویز نکند.

علائم حیاتی بیمار مثل فشارخون باید توسط پرستار کنترل شود.  
آزمایش‌های BUN و کراتینین بررسی شود.  
در صورت نیاز به میلوگرافی (رادیوگرافی نخاع با ماده خاص) ۴۸ ساعت  
قبل دارو را قطع کنید.  
آموزش بیمار - خانواده: - از رانندگی و کارهای دقیق خودداری شود.  
استفاده از الکل و داروهای خواب آور همزمان اجتناب شود.  
خشکی دهان از عوارض شایع است، مایعات بیشتر مصرف شود  
بیمار باید در انجام آزمایش‌های حین مصرف دارو همکاری کند.  
بیمار نباید در گرما یا سرمای شدید قرار گیرد.  
شرایط نگهداری: در دمای اتاق و در جای خشک نگهداری شود.  
دارو در معرض نور نباشد.

## کلرپرو پامید (CHLORPROPAMID)

نام تجاری: Diabinese

گروه دارویی: سولفونیل اوره

گروه درمانی: ضد دیابت قندی

📌 شکل دارویی: قرص ۲۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیماری قند (تیپ ۲ یا دیابت بزرگسالان) دیابت بی مزه  
⚠️ میزان مصرف: یک عدد روزانه که قابل افزایش نیز هست و در  
سالمندان و نارسایی کلیه قابل کاهش است.

موارد منع مصرف: در دیابت جوانان (تیپ ۱) منع مصرف دارد و یا در  
تیپ (I) که بیمار در کوما یا دچار عفونت شدید یا ترومای وسیع است  
ممنوع است.

⚠️ عوارض جانبی مهم: عوارض گوارشی، مشکلات خونی، حساسیت،  
کاهش قند خون

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: سطح قند خون کنترل شود. دارو را در  
یک نوبت تجویز کنید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را صبح‌ها همراه صبحانه مصرف کنید.

همیشه شکلات یا بیسکویت همراه داشته باشید.

خشکی شدید، عرق کردن و کرخت شدن اندام نشانگر کاهش قندخون

است در این هنگام از خوراکی بیشتری استفاده کنید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## کلر تالیدون (CHLORTHALIDONE)

نام تجاری: Hygroton

گروه دارویی: دیورتیک

گروه درمانی: ضد فشارخون، ادرار آور

📦 شکل دارویی: قرص ۱۰۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: ادم ناشی از نارسایی قلبی، اختلالات کبدی و فشارخون بالا و ورم قاعدگی

📏 میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص روزانه، هر چند در فشارخون می توان نصف قرص را هم استفاده کرد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارو، عدم توانایی در ادرار کردن (آنوری)

⚠️ عوارض جانبی مهم: عوارض خونی و التهاب پانکراس، تحریک معده، تهوع، استفراغ، اسهال و ضایعات جلدی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: علائم حیاتی بیمار را اندازه گیری و ثبت کنید.

آموزش بیمار - خانواده: بیوست جزء عوارض دارو می باشد، غذاهای حاوی فیبر مثل سبزی و میوه مصرف کنید.

از رانندگی به علت خواب آلودگی ناشی از دارو اجتناب شود.  
از مصرف الکل اجتناب شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

# کلستیر آمین (CHOLESTYRAMINE)

نام تجاری: Questran

گروه دارویی: ضد هیپرلیپدمی (رزین)

گروه درمانی: ضد چربی خون

⑤ شکل دارویی: پودر برای محلول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: افزایش کلسترول خون، خارش ناشی از انسداد صفراوی،

سندرم روده تحریک پذیر و کاهش بروز سکتۀ قلبی

⑥ میزان مصرف: در درمان افزایش کلسترون خون ۴ گرم ۱ تا ۳ بار در

روز

موارد منع مصرف: انسداد مجاری صفراوی یا حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: یبوست، تهوع، ضایعات جلدی، خونریزی معده و

روده، افزایش میل جنسی، تمایل به خونریزی، التهاب پوست، سکسکه،

سردرد، اضطراب، سنکوپ، پوکی استخوان

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: سطح چربی های خون اندازه گیری شود.

بهتر است دارو پیش از غذا و هنگام خواب مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است همراه دارو ملین استفاده کنید.

هرگز پودر را بدون آب مصرف نکنید و بهتر است به صورت محلول در

آب استفاده شود.

شرایط نگهداری: پودر در دمای اتاق نگهداری شود.



## گونادوتروپین جفتی انسانی «HCG» (CHORIONIC. GONADOTROPIN. HUMAN)

نام تجاری: Pregnyl

گروه دارویی: گونادوتروپین (هورمون‌ها)

گروه درمانی: محرک تخمک گذاری زنان، محرک اسپرماتوژنز مردان

شکل دارویی: آمپول (۵۰۰ و ۵۰۰۰ واحدی)

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: در موارد ناباروری، نازایی زنان، در مردان دچار کاهش

هورمون (درمان بیضه‌های نزول نکرده)

میزان مصرف: در نازایی ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ واحد یک روز پس از آخرین

زمان استفاده از داروی HMG

موارد منع مصرف: در زمان بارداری ممنوع است، در بلوغ زودرس،

سرطان پروستات

عوارض جانبی مهم: کیست تخمدان، شوک، درد محل تزریق، افسردگی،

بی‌قراری، بزرگ شدن پستان مردان، تشکیل لخته در عروق، درد

ناگهانی شکم

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو در مردان باعث افزایش

پرخاشگری و بزرگی بیضه‌ها می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو به علت گران بودن و حساس بودن طبق

دستور استفاده شود.

در صورت بروز عوارض جانبی با پزشک تماس بگیرید.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## سیکلوسپورین (CICLOSPORIN)

نام تجاری: Sandimmune

گروه دارویی: پلی پپتید

گروه درمانی: سرکوب کننده ایمنی

⑤ شکل دارویی: کپسول، محلول خوراکی و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: مهار ایمنی در پیوند کلیه، ضد رماتیسم، درمانیت،

عوارض پوستی، آلورسی، پیوند قرنیه چشم، تیپ ۱ دیابت

⚠ میزان مصرف: ۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن به مدت چهار روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، افراد حساس به روغن کرچک

⚠ عوارض جانبی مهم: عوارض کبدی، تشنج، حساسیت کشنده، ضخیم

شدن لثه، پر مویی، نارسایی کلیه، سکسکه، یبوست، فشارخون، تهوع

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: آنزیم‌های کبدی آزمایش شوند.

CBC و آزمایش‌های کبدی را انجام دهید.

آموزش بیمار - خانواده: - برای خوش طعم شدن محلول، دارو را با آب

میوه بخورید.

در صورت خونریزی یا کبودی به پزشک اطلاع دهید.

تهوع و استفراغ در اوایل درمان بروز می‌کند ولی زودگذر است.

برای پیشگیری از عفونت قارچی، محلول نیستاتین را غرغره کنید.

شرایط نگهداری: در محیط خشک و خنک نگهداری شود.

## سایمتیدین (CIMETIDINE)

نام تجاری: Lagamet

گروه دارویی: آنتاگونیست گیرنده (H<sub>2</sub>)

گروه درمانی: ضد زخم و اسید معده

📦 شکل دارویی: شربت، قرص، آمپول ۲۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: زخم معده، برگشت مواد معده به مری، التهاب و اختلال در معده

🕒 میزان مصرف: ۲ قرص ۲ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، اسهال، سرگیجه، کاهش میل جنسی، درد عضلانی، بلوک قلبی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: بهتر است دارو با غذا مصرف شود.

آزمایش خون (CBC) در حین درمان انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است از رانندگی اجتناب شود.

تا زمان بهبودی کامل، مصرف دارو را ادامه دهید.

بیمار باید بداند احتمالاً راش و بزرگی پستان در مردان ممکن است رخ دهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## سیناریزین (CINARIZINE)

نام تجاری: Stugeron

گروه دارویی: پپیرازین

گروه درمانی: ضد حساسیت، آرام بخش

شکل دارویی: قرص ۲۵ و ۷۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان علامتی سرگیجه و اختلالات عروق محیطی

میزان مصرف: یک قرص ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: مثل سایر آنتی هیستامین‌ها، ضمناً در برفیری حاد

هم ممنوع است

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، افزایش اشتها و...

توجهات پزشکی - پرستاری: مثل دیفن هیدرامین (صفحه ۲۷۳)

آموزش بیمار - خانواده: از رانندگی اجتناب شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## سیپروفلوکساسین (CIPROFLOXACIN)

نام تجاری: Ciproxin

گروه دارویی: فلوروکینولون

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت‌های ادراری، عفونت ریوی، پوستی و التهاب مجاری ادراری و استخوانی

میزان مصرف: در زمان عفونت سطحی (خفیف تا متوسط) ۵۰۰ میلی گرم روزانه در دو مرحله قسمت شده و در موارد شدید ۱۰۰۰ میلی گرم خوراکی در دو مرحله روزانه تقسیم شده طی ۷ تا ۱۴ روز، شکل تزریقی برای نوع خفیف ۴۰۰ میلی گرم و برای نوع شدید ۸۰۰ میلی گرم وریدی موارد منع مصرف: حساسیت به کینولون‌ها و نالیدیکسیک اسید

عوارض جانبی مهم: عوارض گوارشی مثل سوء هاضمه، تهوع، تشنج، خواب آلودگی، ضایعات پوستی مثل راش، آسیب کلیوی، کندی بالا رفتن فشارخون، کم خونی

توجهات پزشکی-پرستاری: در صورت بروز اسهال باید بیمار را از نظر آب و الکترولیت اداره کرد.

مصرف مایعات کافی به همراه دارو توصیه می‌شود.

در نارسایی کلیه میزان دارو باید کاهش یابد.

آموزش بیمار - خانواده: بین مصرف سیپرو و آنتی اسید باید ۴ ساعت فاصله باشد.

افرادی که سابقه تشنج (صرع) دارند قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت کنند.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## سیپروفلوکساسین (چشمی) (CIPROFLOXACIN HCL)

نام تجاری: Ciloxan

گروه دارویی: فلوروکینولون

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

⑤ شکل دارویی: پماد استریل چشمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت میکروبی (ملتحمه) چشم، زخم عفونی قرنیه،

عفونت گوش خارجی و میانی

⚠️ میزان مصرف: ۱ تا ۲ قطره هر ۲ ساعت در ایام بیدار بودن بیمار به

مدت ۲ روز و در زمان خواب هر ۶ تا ۸ ساعت و ۱ تا ۲ قطره هر ۴

ساعت تا ۵ روز ادامه یابد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠️ عوارض جانبی مهم: ضایعات پوستی اطراف محل تماس، ضایعات

قرنیه، تورم پلک، ریزش اشک، ترس از نور و پرخونی چشم

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: دارو باید طی مدت ۷ روز استفاده شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت ایجاد ترس از نور یا اشک ریزش

شدید به پزشک اطلاع دهید.

از تماس نوک قطره چکان با بافت چشم یا پلک جلوگیری کنید.

در مدت درمان از لنز چشمی (نوع تماسی) استفاده نشود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## سیساپراید (CISAPRIDE)

نام تجاری: Propulsid

گروه دارویی: پروکینتیک دستگاه گوارش

گروه درمانی: داروی گوارش

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: احساس ترش کردن در معده، کم تحرکی دستگاه

گوارش، برگشت مواد معدی به مری

میزان مصرف: ۱ تا ۲ عدد قرص ۳ بار در روز یا ۱۰ سی سی شربت هر ۸ ساعت میل شود.

موارد منع مصرف: خونریزی معده و روده، انسداد روده، سوراخ شدن روده، بعد از اعمال جراحی روی دستگاه گوارش نباید مصرف شود.

عوارض جانبی مهم: به علت بعضی از عوارض قلبی مجوز جهانی ندارد (FDA). درد شکمی، تهوع، یبوست، عوارض خونی، سرفه، بی خوابی و راش پوستی ممکن است بروز کند.

توجهات پزشکی - پرستاری: در بیماران قلب و عروق با احتیاط مصرف شود.

این دارو نباید همزمان با داروهای ضد افسردگی یا آنتی بیوتیکها مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است بیمار بعد از مصرف دارو رانندگی نکند.



دارو را نیم ساعت قبل از غذا و به هنگام خواب مصرف کند.  
اثر داروی وارفارین را تشدید کرده و تست (PT) را طولانی می‌کند.  
شرایط نگهداری: به دور از نور و در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## سیس پلاتین (CISPLATIN)

نام تجاری: Platinol

گروه دارویی: آلکیل کننده‌ها

گروه درمانی: ضد سرطان

شکل دارویی: تزریقی 


مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان کمکی در سرطان‌های بیضه، ریه، مثانه،  
تومورهای تخمدان

میزان مصرف: ۲۰ میلی گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن روزانه به  
مدت ۵ روز در دوره‌های سه هفته‌ای به مدت ۳ دوره به همراه  
بلئومایسین، وین بلاستین

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، نارسایی کلیه، نارسایی مغز  
استخوان، اختلال شنوایی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، عوارض خونی، تمایل به خونریزی،  
مشکلات گوارشی

توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کلیوی قبل و حین درمان باید  
انجام شود. 

احتمال اختلالات شنوایی وجود دارد.

- ممکن است فرد دچار مشکلات قلبی، فشارخون و... بشود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار باید برای انجام معاینات دوره‌ای پیگیر  
باشد.

نه بیمار و نه خانواده و نه کسانی که با او زندگی می‌کنند نباید واکسن  
زنده ویروسی مثل فلج اطفال یا سرخک بزنند.  
مایعات کافی مصرف شود.  
درد پهلوی یا سوزشی و مشکلات ادراری را به پزشک اطلاع دهد.  
شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود.

## اسید سیتریک (CITRIC ACID)

نام تجاری: Citrosteril

گروه دارویی: اسیدها

گروه درمانی: آنتی اکسیدان

شکل دارویی: پودر، کریستالی

مصرف در حاملگی: بررسی نشده است.

موارد مصرف: در درمان سنگ‌های ادراری اگزالاتی و در درمان نقرس و اسیدوز متابولیک مزمن

میزان مصرف: ۱۵ تا ۳۰ سی‌سی از محلول رقیق شده با آب را پس از غذا یا موقع خواب بنوشند.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید ولی در نارسایی کلیه و مشکلات گوارشی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی مهم: مصرف طولانی مدت به میزان زیاد باعث عوارض گوارشی و احساس طعم نامطبوع و آلكالوز متابولیک می‌شود.

توجهات پزشکی - پرستاری: مراقبت برای پرستاری در حین استفاده ضروری است.


آموزش بیمار - خانواده: این پودر باید دور از نور نگهداری شود. شرایط نگهداری: در ظروف دربسته و در حرارت معمولی اتاق نگهداری شود.

## کلادریبین (CLADRIBINE)

نام تجاری: Levstatin

گروه دارویی: پورین

گروه درمانی: ضد سرطان

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان خون (لوسمی)، لنفوم، آنمی (کم خونی لیزکننده)  
میزان مصرف: حداکثر ۰/۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  
روزانه به صورت انفوزیون مداوم وریدی به مدت ۷ روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید و زنان حامله

عوارض جانبی مهم: عوارض خونی، عوارض کلیوی، تب شدید، علائم  
گوارشی

توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی و کلیوی قبل از شروع  
درمان انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه کبودی باید به پزشک اطلاع داده شود.  
این دارو کاملاً سمی و خطرناک است و باید به دستورهای پزشک برای  
پیگیری آزمایش‌ها توجه کرد.

خانواده و بیمار نباید تحت واکسیناسیون با ویروس زنده قرار گیرند.  
این دارو باعث کاهش فعالیت غدد جنسی مردانه و زنانه می‌شود.  
شرایط نگهداری: محلول رقیق شده دارو باید در یخچال نگهداری شود.  
ویال‌های باز نشده در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شوند.

## کلاریترو مایسین (CLARYTHROMYCINE)

نام تجاری: Biaxin

گروه دارویی: ماکرولیدها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قرص و پودر برای محلول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب و عفونت گلو و لوزه (فارنژیت)، سینوزیت و عفونت‌های ریه ناشی از مایکوباکتریوم آویوم و میکروب هلیکو باکتر در

معدده

میزان مصرف: به میزان ۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت به طور شایع استفاده می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: عوارض گوارشی مثل تهوع، اسهال، شکم درد،

سردرد و استفراغ و آسیب کبدی و کاهش پلاکت‌های خون

توجهات پزشکی - پرستاری: در نارسایی کلیه با احتیاط تجویز شود.

در سالمندان میزان کمتر دارو تجویز شود.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف این دارو با غذا یا با معده خالی یکسان است

در صورت فراموش کردن مصرف یک مرحله آن تا هنگامی که نوبت

مصرف بعدی نرسیده، در هر زمان میزان فراموش شده مصرف شود.


شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## کلماستین (CLEMASTINE)

نام تجاری: Tavegil

گروه دارویی: اتانول آمین

گروه درمانی: آرام بخش

شکل دارویی: قرص و آمپول 

مصرف در حاملگی: گروه B


موارد مصرف: حساسیت‌ها (کهیر، آنژیوادم، ریزش آب از بینی


حساسیتی)، التهاب ملتحمه چشم، بیماری‌های پوستی خارش دار

میزان مصرف: حداقل یک قرص ۲ بار در روز یا ۲ تا ۴ گرم از راه

تزریق عضلانی یا وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید و نوزادان

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، لرز، گیجی 

توجهات پزشکی - پرستاری: دارو را بهتر است با آب، غذا یا شیر 

مصرف کنند. احتمال کاهش فشارخون وجود دارد.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت خواب آلودگی رانندگی ممنوع است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.

## کلیدینیوم سی (CLIDINIUM-C)

نام تجاری: Librax

گروه دارویی: بنزودیازپین + آنتی کولینرژیک  
گروه درمانی: آرام بخش و ضد اسپاسم معده و روده

شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: این دارو و ترکیب کلردیازوپوکساید و کلیدینیوم بروماید است. درمان کمکی زخم معده و روده تحریک پذیر

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص هر ۴ تا ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی شدید، انسداد دستگاه گوارش، بیمار کلیوی و میاستنی گراویس

عوارض جانبی مهم: مشکلات مغزی (بی خوابی یا تحریک پذیری)، اضطراب، بی قراری، زردی، خشکی دهان، احتباس ادرار و مدفوع، خواب آلودگی

توجهات پزشکی - پرستاری: تست های کبدی و خونی در حین درمان انجام شود. مصرف آن در دراز مدت به دلیل وجود کلردیازوپوکساید اعتیادآور است.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف آن نیم ساعت قبل از غذا مفیدتر است. در صورت ضایعات پوستی به پزشک اطلاع دهید.

از اشتغال به کار ظریف، دقیق و رانندگی خودداری شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



## کلیندا مایسین (CLINDA MYCIN)

نام تجاری: Dalacin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک‌ها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول، محلول و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت‌های ریوی، پوستی و استخوانی، درمان کمکی در

ایدز و عفونت میکروبی واژن و مالاریا

میزان مصرف: در عفونت خفیف ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت و

در عفونت شدید ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت استفاده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، نارسایی کلیه

عوارض جانبی مهم: ضایعات پوستی، خارش، تهوع، استفراغ، کاهش

وزن، التهاب مری و معده، اسهال شدید، احساس طعم فلز در دهان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: کلیندا مایسین را هیچگاه نباید به سرعت

وارد ورید بیمار کرد (بولوس). تست‌های کبدی برای بیمار می‌بایست

انجام شود.

تست‌های شمارش سلول خون انجام شود.

افت فشارخون جزء عوارض احتمالی است مدنظر داشته باشید.

تزریق عضلانی باید به شکل عمیق صورت گیرد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو (کپسول) را با یک لیوان کامل آب مصرف

کنید.

دوره درمان خوراکی یا تزریقی را کامل کنید.  
بروز اسهال را به پزشک اطلاع دهید.  
شرایط نگهداری: - محلول آن را در یخچال نگهداری کنید.  
کپسول آن را در دمای اتاق نگهداری کنید.




# کلیندا مایسین موضعی (CLINDAMYCIN)

نام تجاری: Dalacin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک موضعی

گروه درمانی: ضدجوش و آکنه

شکل دارویی: پماد و محلول 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آکنه و جوش سر و صورت، عفونت‌های پوستی و

زخم‌های سطحی عفونی

میزان مصرف: ۱ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید

⚠ عوارض جانبی مهم: خشکی و پوسته ریزی، خارش، در صورت مصرف

گوارشی اسهال

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در منابع پزشکی آمده که مصرف موضعی

کلیندا باعث اسهال می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت اسهال به پزشک اطلاع دهید.

پماد موضعی را آلوده نکنید.

از تماس چشم و مخاط دهان و بینی با دارو پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

# کلیندا مایسین فسفات (CLINDAMYCIN (Vaginal))

نام تجاری: Dalacin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: ضد میکروب

⑤ شکل دارویی: کرم داخل واژن

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت میکروبی واژن در خانم‌ها کاربرد فراوان دارد.

غلظت میزان مصرف: یک اپلیکاتور یا ۱۰۰ میلی گرم از کرم ۲ درصد یک بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: التهاب موضعی و علائم عمومی چونکه احتمال جذب عمومی می‌رود.

⚠ توجهات پزشکی-پرستاری: بعد از ماه ششم حاملگی از اپلیکاتور با احتیاط استفاده شود.

آموزش بیمار-خانواده: بهتر است قبل از خواب استعمال شود.


شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مطلوب است.

## کلوبازام (CLOBAZAM)

نام تجاری: Frisium

گروه دارویی: بنزودیازپین ها

گروه درمانی: ضداضطراب، آرام بخش

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده

موارد مصرف: اضطراب، بی قراری، تشنج و دردهای بعد از قطع عضو

میزان مصرف: ۲ تا ۳ قرص ۱ تا ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: به دیازپام مراجعه شود (صفحه ۲۵۱)

⚠ عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، سردرد، لرزش دست ها، مشکلات

گوارشی، کاهش فشارخون، خشکی دهان، تهوع، یبوست، افزایش اشتها

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مصرف مداوم، عادت و وابستگی به

همراه دارد.

از داروهای دیگر اعصاب و روان بدون اطلاع پزشک استفاده نکنید.

آموزش بیمار - خانواده: از رانندگی اجتناب شود.

دارو را نباید به طور ناگهانی قطع کرد.


شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مطلوب است.

## کلوبتازول (CLOBETAZOL)

نام تجاری: Temovate

گروه دارویی: کورتون

گروه درمانی: ضدالتهاب موضعی

شکل دارویی: کرم و پماد موضعی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضایعات پوستی، بیماری‌های التهابی پوست،  
خارش‌های موضعی

میزان مصرف: ۱ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: عفونت‌های میکروبی، قارچی یا ویروسی

⚠ عوارض جانبی مهم: حساسیت‌های موضعی، خارش، قرمزی، ترک  
خوردگی پوست، آتروفی یا تغییر رنگ پوست

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت بروز حساسیت دارو را قطع  
کنید.

از داروهای موضعی کورتون دار در ناحیه سر و صورت استفاده نشود.

آموزش بیمار - خانواده: پوست مرطوب جذب دارو را افزایش می‌دهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## کلوبوتینول (CLOBUTINOL)

نام تجاری: Silomat

گروه دارویی: ضد سرفه‌ها

گروه درمانی: ضد سرفه

شکل دارویی: قرص، قطره، تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان سرفه‌های مقاوم یا به علت نامشخص

میزان مصرف: به میزان ۱ تا ۲ قرص یا ۳۰ تا ۴۰ قطره ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، تشنج

عوارض جانبی مهم: خواب‌آلودگی، سرگیجه

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو به علت اثر روی مغز (بصل

النخاع) سرفه را کنترل می‌کند، ارجح است که پزشک علت سرفه را

بررسی کند و علت آن را درمان کند.

آموزش بیمار - خانواده: بعد از مصرف دارو از رانندگی و کارهای دقیق

پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## کلوفازیمین (CLOFAZIMINE)

نام تجاری: Lamprene

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: ضد جذام

شکل دارویی: کپسول ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان جذام شایعترین مورد مصرف این دارو می باشد. البته این دارو به صورت کمکی با داروهای ضدجذام دیگر مصرف می شود.

⚠️ میزان مصرف: ۲ قرص در روز به همراه دو داروی دیگر

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ولی در نارسایی کبد با احتیاط مصرف شود.

⚠️ عوارض جانبی مهم: تغییر رنگ ادرار، پوست و ترشحات بدن (رنگ قرمز - قهوه ای)، ضایعات پوستی، خارش و راش از موارد شایع می باشند. ⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در بیماران با مشکلات گوارشی با احتیاط مصرف شود.

به بیمار گوشزد شود که درد استخوان ها و مفاصل و خونریزی جزء عوارض شایع می باشند.

در صورت افزایش میزان مصرف دارو مراقبت باید جدی باشد.

آموزش بیمار - خانواده: تغییر رنگ پوست به مدت چند ماه و تا چند سال ممکن است باقی بماند.

به علت اختلالات بینایی و خواب آلودگی از رانندگی پرهیز شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## کلو فیبرات (CLOFIBRAT)

نام تجاری: Atromid-s

گروه دارویی: فیبرات‌ها

گروه درمانی: پایین آورنده چربی خون

شکل دارویی: کپسول ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضد افزایش چربی خون (تری گلیسرید بالا)، دیابت بی

مزه، بیماری قلبی، گزانتوم توبرسوم

میزان مصرف: ۱ تا ۲ گرم در روز

موارد منع مصرف: نارسایی کلیه، کبد، سنگ مثانه، سنگ کیسه صفرا و

حاملگی

عوارض جانبی مهم: تهوع، بی‌نظمی قلبی، استفراغ، ریزش مو، کهیر،

اسهال، کاهش میل جنسی، مشکل انعقادی، کم‌خونی، درد عضلانی،

عوارض عصبی، پرخوری و اختلالات تست کبدی

توجهات پزشکی - پرستاری: از تجویز همزمان با داروهای ضد انعقاد

خوراکی مثل وارفاین خودداری کنید.

دارو می‌بایست چند ماه قبل از بارداری قطع شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو همراه با غذا میل شود.

مصرف چربی باید محدود شود.

از مصرف همزمان لووستاتین خودداری شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق و دور از نور نگهداری شود.

## کلومیفن (CLOMIPHENE)

نام تجاری: Clomid

گروه دارویی: آنتی استروژن

گروه درمانی: تحریک تخمک گذاری

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان نازایی و نارسایی تخمدان، در موارد تشخیص عملکرد تخمدان به کار می‌رود.

⑥ میزان مصرف: ۵۰ میلی گرم در روز به مدت ۵ روز

موارد منع مصرف: حاملگی، خونریزی ناشناخته زنانگی، کیست تخمدان، نارسایی کبد و تیروئید یا سرطان رحمی

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، تاری دید، فشارعصبی، خستگی، ضایعات پوستی، ریزش مو، درد شکمی، اسهال یا یبوست، زردی، حساسیت به نور

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: پزشک می‌بایست قبل از شروع درمان تاریخچه پزشکی و سوابق بیماری بیمار را مطالعه کند.

قرص را از روز پنجم قاعدگی به مدت ۵ روز تجویز کنید.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت اثبات حاملگی دارو باید قطع شود.

هرگونه درد شکمی یا دل پیچه را که ممکن است نشانه بزرگی کیست تخمدان باشد جدی تلقی کنید و به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## کلونازپام (CLONAZPAM)

نام تجاری: Rivotril

گروه دارویی: بنزودیازپین‌ها

گروه درمانی: ضد تشنج

شکل دارویی: قرص ۱ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تشنج، اختلالات حملات عضلانی (میوکلونیک) در  
صرع

میزان مصرف: به میزان نصف قرص ۳ بار در روز شروع و تا ۱ میلی  
گرم قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبد و آب سیاه  
چشم (گلوکوم)، زاویه بسته

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، دو بینی، حرکات غیر طبیعی کره  
چشم، افسردگی، توهّم، تپش قلب، پرمویی، تورم صورت و قوزک پا،  
خشکی دهان، تنگی نفس

توجهات پزشکی - پرستاری: قطع ناگهانی کلونازپام یا مصرف داروی  
جدید بدون قطع تدریجی کلونازپام ممنوع است.

تست‌های کبدی ارزیابی شوند.

آموزش بیمار - خانواده: از مصرف همزمان داروهای خواب آور دیگر یا  
ضد اضطراب خودداری شود.

در حاملگی با احتیاط و فقط در صورت ضرورت فقط استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## کلونیدین (CLONIDINE)

نام تجاری: Catapres

گروه دارویی: آدرنژیک

گروه درمانی: ضد فشارخون

⑤ شکل دارویی: قرص ۰/۲ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در کنترل فشارخون به ویژه همراه بیماری‌های کلیوی و درمان محرومیت از مواد مخدر، در کودکان بسیار فعال کم توجه، در سردردهای میگرنی

⑥ میزان مصرف: با نصف قرص سه بار در روز شروع و تا ۰/۲ میلی گرم (یک قرص) ادامه یابد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارو، زنان باردار

✳ عوارض جانبی مهم: خشکی دهان، تهوع، استفراغ، یبوست، نارسایی قلب، عصبانیت، بی‌قراری، کهیر، نازک شدن مو، ناتوانی جنسی، خارش، عود فشارخون بالا

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: معاینه چشم به طور مرتب انجام شود.

دارو باید به تدریج قطع شود. فشارخون بیمار مرتب کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: از مصرف همزمان آنتی هیستامین‌ها خودداری شود.

بهتر است آخرین نوبت دارو، در هنگام خواب استفاده شود.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.

## کلوتریمازول (CLOTRIMAZOL)

نام تجاری: Canesten

گروه دارویی: ایمیدازول

گروه درمانی: ضد قارچ

📌 شکل دارویی: کرم موضعی، کرم و قرص واژینال، ژل موضعی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت کاندیدایی پوست، عفونت کانیدایی واژن

⚖️ میزان مصرف: موضعی روزانه ۲ بار روی پوست مالیده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: افسردگی و عوارض ادراری و اختلالات

آزمایش‌های کبدی در مواردی که جذب عمومی می‌شود بروز می‌کند.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در طول یک ماه نتایج درمانی باید ظاهر

شده باشد وگرنه باید تشخیص را قطعی کرد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را تا پایان دوره استفاده کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## کلوگزاسیلین - سدیم (CLOXACILLIN SODIUM)

نام تجاری: Orbenin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: پنی سیلین مقاوم به پنی سیلیناز

📌 شکل دارویی: کپسول و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت‌های میکروبی با استاف طلائی (میکروبی است که تولید کننده پنی سیلیناز است)، عفونت‌های پوستی و دستگاه تنفس  
📏 میزان مصرف: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت‌های شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: کهیر، تهوع، اسهال و عوارض دیگری مشابه دیگر  
گروه پنی سیلین‌هاست

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: دوره درمان می‌بایست کامل باشد.  
تاریخچه حساسیت به پنی سیلین را از بیمار باید پرسید. در دوره مصرف طولانی مدت آزمایش‌های خونی انجام شود. عملکرد کلیوی می‌بایست بررسی شود.

آموزش بیمار - خانواده: کپسول پودر آن در جای خنک نگهداری شود.  
شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مطلوب است.

## کلوزاپین (CLOZAPINE)

نام تجاری: Clozarit

گروه دارویی: دی بنزاپین ها

گروه درمانی: ضدسایکوز (اختلال روانی شدید)

📦 شکل دارویی: قرص ۲۵ و ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: بیماری های روانی (سایکوز، اسکیزوفرنی)، اختلال رفتاری ناشی از فراموشی پیری (دمانس)، سایکوز همراه بیماری پارکینسون

📏 میزان مصرف: با ۲۵ میلی گرم ۱ تا ۲ بار در روز شروع می شود و طی ۲ هفته به ۳۰۰ میلی گرم در روز می رسد.

موارد منع مصرف: تشنج، بیماری های مغز استخوان، اختلال سیستم اعصاب مرکزی (CNS)

⚠️ عوارض جانبی مهم: کاهش سلول های خونی، تشنج، فشار خون بالا یا پایین، مشکلات قلبی، کاهش میل جنسی، افسردگی، خارش، اسهال، خون در ادرار، هماچوری، کاهش وزن، درد کمری، آسم و....

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش های خونی می بایست به صورت دوره ای انجام شود. قطع دارو باید به تدریج صورت گیرد.

آموزش بیمار - خانواده: از رانندگی اجتناب شود. دارو خود سرانه قطع نشود. انجام آزمایش های خونی پیگیری شود. در صورت بروز علائم عفونی گلو درد و سرماخوردگی در حین مصرف به پزشک اطلاع دهید. شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور و در جای خشک نگهداری شود.

## کل تار (COAL TAR)

نام تجاری: Polytar

گروه دارویی: کراتولیتیک‌ها

گروه درمانی: ضد شوره، ضد سبوره

📌 شکل دارویی: محلول (لوسیون)، شامپو

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: درمان پسوریازیس، دفع خارش پوستی، اگزما، التهاب پوستی

📏 میزان مصرف: لوسیون ۵ درصد را مستقیم روی پوست قرار می‌دهند یا شامپو ۱ درصد کل تار را از یک تا چند بار در هفته استفاده می‌کنند.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، زخم پوستی

⚠️ عوارض جانبی مهم: ضایعات جلدی، احساس گزش خفیف، حساسیت به نور، جوش

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تغییر رنگ موی بیمار موقتی است. این دارو در کودکان کمتر از ۴ سال تجویز نشود. این دارو در کمک با اشعه ماوراء بنفش (UV) در درمان پسوریازیس کاربرد دارد.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است در هنگام استفاده از شامپو، موی سر ابتدا با آب ولرم مرطوب شود. پوست محل استفاده نباید زخمی یا دارای تاول باشد. از تماس آن با چشم خودداری شود. شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.




## کواآموکسی کلاو (CO-AMOXICLAV)

نام تجاری: Augmentin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: بتالاکتام

شکل دارویی: پودر، قرص 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت ریه، عفونت گوش میانی، سینوزیت، عفونت‌های پوستی و کلیه و مجاری ادراری

⚠ میزان مصرف: ۲۵۰ میلی گرم هر ۸ ساعت تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: اسهال، تشنج، عوارض کلیوی، ضایعات پوست، تهوع و استفراغ

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو ترکیب آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید است. در اختلال عملکرد کلیوی با احتیاط مصرف شود. راش و ضایعات جلدی که دیر هنگام بروز می‌کند ممکن است نشانگر حساسیت باشد.

آموزش بیمار - خانواده: برای آماده کردن دارو از شکل پودر به شربت، باید طی ۲ مرحله آب اضافه کرد تا پودر در آب حل شود.

در خانم‌ها علائم عفونت قارچی مجاری تناسلی (واژن) ممکن است به صورت ترشحات سفید و پنیری بروز کند.


شرایط نگهداری: در شرایط و دمای معمولی و جای خشک نگهدارید و بعد از ۱۰ روز محلول (شربت) آن را دور بریزید.

## روغن کبد ماهی (COD LIVER OIL)

نام تجاری: Adecaps

گروه دارویی: روغن کبد تازه ماهی

گروه درمانی: ویتامین‌های ضروری و محلول در چربی (A,D)

شکل دارویی: روغن 


مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: نوع موضعی در درمان ضایعات پوستی و زخم‌های بستر استفاده می‌شود. این روغن حاوی ویتامین‌های A و D و اسیدهای چرب ضروری می‌باشد.

میزان مصرف: یک تا چند بار در روز به صورت موضعی

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

عوارض جانبی مهم: عارضه خاصی ذکر نشده است.

توجهات پزشکی - پرستاری: دلایل و گزارش‌های علمی برای اثر بخشی آن وجود ندارد. 

آموزش بیمار - خانواده: این داروی موضعی در بهبود زخم‌ها و خراش‌های پوستی به کار می‌رود.

شرایط نگهداری: دور از نور و در جای خنک نگهداری شود.

## کدئین فسفات (CODEINE PHOSPHAT)

نام تجاری: Evacode

گروه دارویی: مشتق فنانترن

گروه درمانی: ضد درد

⑤ شکل دارویی: قرص ۳۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درد و گاهی سرفه‌های بدون خلط (تحریکی)

Ⓐ میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص هر ۴ تا ۶ ساعت استفاده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به کدئین و مرفین

ⓧ عوارض جانبی مهم: تپش قلب، خستگی، خواب آلودگی، تهوع، استفراغ،

کاهش سطح تنفس، تحریک پذیری

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: احتمال بروز تشنج و بی‌نظمی ریتم قلب

(آریتمی) وجود دارد.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است دارو با شیر میل شود. از رانندگی

پرهیز شود. از داروهای خواب آور و مهار کننده مغز و اعصاب بدون

اجازه پزشک استفاده نشود.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## کلشی سینین (COLCHICINE)

نام تجاری: Colgout

گروه دارویی: آکالوئیداز کولشیسون

گروه درمانی: ضد نقرس، ضد التهاب

شکل دارویی: قرص ۱ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان نقرس، درمان آ میلوئیدوز، آرتریت بهجت، سیروز کبدی

میزان مصرف: ۱ تا ۳ قرص در ابتدا و ۰/۵ میلی گرم (نصف قرص) هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: زخم‌های شدید دستگاه گوارش، حساسیت شدید دارویی، بیماری کلیوی، نارسایی قلبی و ضایعات خونی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، عوارض پوستی، کهیر، درماتیت، درد شکم، اسهال، پایین آمدن فشار خون، گیجی، ریزش مو، تکرر ادرار

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش‌های کلیوی و خونی برای کنترل لازم است. پس از بهبود علائم بایستی دارو را قطع کنید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را با شیر یا غذا مصرف کنید. در صورت بروز استفراغ یا اسهال شدید، مشکل تنفسی و کاهش ادرار که علائم مسمومیت هستند به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: دمای معمولی مطلوب است.

## کولفوسریل (COLFOSCERIL PALMITATE)

نام تجاری: Exosurf Nedvatal

گروه دارویی: سورفاکتانت ریوی

گروه درمانی: ضدنارسایی ریه (نوزادان)

⑤ شکل دارویی: محلول در تراشه مجاری هوایی (نای) نوزادان نارس تزریق می‌شود.

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: درمان و پیشگیری از خطر ناتوانی تنفسی در نوزدان به ویژه نارس‌ها و کمبود مادرزادی سورفاکتانت داخلی در ریه

⚠ میزان مصرف: به میزان ۶۷/۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم معادل ۵ سی‌سی از طریق لوله تراشه

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

☠ عوارض جانبی مهم: خونریزی، عفونت ریوی، تشنج، ایست تنفسی و عفونت پرده مغز

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در هنگام مصرف داخل نایی باید لوله‌ها با اندازه‌های مختلف در دسترس باشد. دارو را قبل از مصرف با ۸ میلی لیتر آب مقطر آماده کنید. آموزش کادر درمانی کاملاً ضروری است. آموزش بیمار - خانواده: با والدین در مورد اثربخشی دارو و عوارض احتمالی قبلاً صحبت کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی قابل نگهداری است.

## کولیستین (COLISTIN SULPHATE)

نام تجاری: Colomycin

گروه دارویی: پلی میکسین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک - ضد باکتری

⑤ شکل دارویی: پودر (محلول - سوسپانسیون)

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان عفونت‌های دستگاه گوارش و گرم منفی مثل  
پسودومونا

⑥ میزان مصرف: ۱/۵ تا ۳ میلیون واحد ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: عوارض کلیوی، مشکلات عضلانی، کهیر، خارش  
پوستی، تهوع، استفراغ

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: ارزیابی تست‌های کبدی ضروری است.  
اختلالات هشجاری از جمله عوارض است.

آموزش بیمار - خانواده: از رانندگی پرهیز شود. این دارو با داروهای  
بسیاری تداخل دارویی دارد، داروهای مصرفی خود را به پزشک اطلاع  
دهید.

شرایط نگهداری: پودر در دمای معمول اتاق نگهداری شود. محلول در  
یخچال نگهداری شود.

## کولودیون (COLLODION)

گروه دارویی: حاوی الکل، اتر و پیروکسیلین

گروه درمانی: بیماری‌های پوست

Ⓢ شکل دارویی: محلول (مایع)

مصرف در حاملگی: مصرف موضعی آن مطالعه نشده است.

موارد مصرف: برای حفاظت از پوست در ضایعات پوستی و التهاب

پوستی به کار می‌رود. در ساخت ترکیبات دارویی نیز به کار می‌رود.

Ⓢ میزان مصرف: بستگی به نوع ضایعه پوستی دارد.

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

⚠ عوارض جانبی مهم: به سرعت آتش می‌گیرد و در صورت استفاده از

غلظت بالا تحریکات پوستی می‌دهد.

⚠ توجهات پزشکی-پرستاری: این دارو به عنوان یک جزء داروهای

پوستی که خواهان اثر طولانی مدت آنها بر روی پوست هستیم به کار

می‌رود.

آموزش بیمار-خانواده: این ماده قابل اشتعال است.

شرایط نگهداری: در ظرف دربسته و دور از حرارت نگهداری شود.

# استروژن کنژوگه (CONJUGATED ESTROGEN)

نام تجاری: Premarin

گروه دارویی: استروژن

گروه درمانی: هورمون ها - جانشین استروژن

📌 شکل دارویی: تزریقی - قرص

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان علائم گر گرفتگی و یائسگی، درمان استئوپورز، ضد نئوپلاسم، شکایت های مجرای اداری و تناسی در زنان یائسه، کمبود استروژن

📏 میزان مصرف: ۲/۵ تا ۷/۵ میلی گرم در روز در کمبود استروژن و در

ضایعات ناشی از یائسگی ۰/۳ تا ۱/۲۵ میلی گرم به صورت خوراکی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارو - به استرادیول مراجعه شود.

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، سردرد، اضطراب، ریزش مو، کرامپ شکمی،

اسهال، خارش، علائم آنفلوآنزا، هیپرکلسمی، احتمال بروز سرطان رحم

و سرطان سینه و ضایعات کبدی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: کنترل فشار خون و چربی خون باید به

طور معمول و منظم انجام شود. در صورت تزریق وریدی به آهستگی

آن را انجام دهید. تزریق عضلانی توسط پرستار باید به صورت عمیق

صورت گیرد.

آموزش بیمار - خانواده: بیماری باید مکرراً معاینه شود (پستان و رحم).

نوع کرم واژینال را طبق دستور استفاده کنید. احتمال اختلالات بینایی

وجود دارد، به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.



## کنتراسپتیوها (CONTRACEPTIVES)

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: پیشگیری از بارداری

📌 شکل دارویی: قرص‌های LD، HD، DE و تری فازیک

مصرف در حاملگی: گروه x

موارد مصرف: پیشگیری از بارداری، جلوگیری از بارداری پس از مقاربت (فوری)، درمان قاعده نشدن (آمنوره)، پرمویی (هیرسوتیسم)، درد قاعدگی، خونریزی بیش از حد و خونریزی غیر معمول رحمی  
⚠️ میزان مصرف: برای پیشگیری از حاملگی به صورت رژیم ۲۱ روزه مصرف می‌شود.

موارد منع مصرف: در صورت اختلالات عروقی (ترومبوامبولی) بیماری عروق مغزی یا کرونر قلبی، ضایعات دو بینی چشم، به علت عروق سکتة حاد قلبی، سرطان سینه، ممنوع است.

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، سردرد، سرگیجه، تومور کبدی، ضایعات پوستی، فشار خون بالا، افسردگی، درد شکمی، اسهال، یبوست، تغییر میل جنسی، بدخیمی رحمی، تومور هیپوفیز و ضایعات جلدی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: مراقب عوارض جانبی دارو باشید. در صورت افسردگی شدید، دارو را قطع کنید. آسم یا میگرن ممکن است با دارو تشدید شود.

آموزش بیمار - خانواده: یک قرص از روز پنجم قاعدگی شروع می‌شود و پس از ۲۱ روز مصرف یک عدد روزانه، دارو را به مدت ۷ روز قطع

کنید و در روز هشتم دوره بدون آنکه منتظر قطع خونریزی قاعدگی باشید مصرف دارو را شروع کنید. قرص را هر روز در ساعت معین استفاده کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

☑ نکته: در صورت پیشگیری پس از مقاربت، دو قرص HD حداکثر ۱۲ ساعت پس از نزدیکی و ۲ قرص دیگر را ۱۲ ساعت بعد میل کنید.

## کور تیکوتروپین (CORITCOTROPIN)

نام تجاری: Acthar

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: هورمون هیپوفیز قدامی

⑤ شکل دارویی: تزریقی ۴۰ و ۸۰ واحدی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: موارد مصرف: تست تشخیصی نارسایی غدهٔ آدرنال،

درمان حملهٔ حاد اسکروز مولتیپل، تشنج میوکلونیک کودکان، سرکوب

ایمنی و درمان التهاب

⚠️ میزان مصرف: در حملهٔ حاد اسکروز مولتیپل ۸۰ تا ۱۲۰ واحد به مدت

۲ تا ۳ هفته

موارد منع مصرف: در افراد با عفونت‌های ناشی از قارچ و ویروس تب

خال، نارسایی قلب، فشار خون بالا، زخم معده و پوکی شدید استخوان

ممنوع است.

⚠️ عوارض جانبی مهم: خونریزی معده، تشنج، نارسایی قلبی، تهوع،

عوارض پوستی، ضعف عضلانی، پوکی استخوان، عفونت‌های ریوی

(آبسه)، کاهش رشد در کودکان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این هورمون در افراد خاص با تشخیص

قطعی به شکست می‌انجامد، وزن و وضعیت الکترولیت‌های بیمار

کنترل شود. از تجویز دراز مدت آن در کودکان خودداری کنید.

آموزش بیمار - خانواده: تزریق دارو توام با درد شدید است. برای

درست کردن محلول از پودر از آب مقطر استفاده کنید.  
شرایط نگهداری: محلول در یخچال و دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری  
شود.




## کو تریمکسازول (CO-TRIMOXAZOLE)

نام تجاری: Bactrim

گروه دارویی: سولفونامید (اسید آمینه دی آلانین)

گروه درمانی: ضد باکتری (آنتی بیوتیک)

شکل دارویی: محلول (پودر) - قرص - تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C (در ۲-۳ ماهه آخر ممنوع)

موارد مصرف: عفونت‌های مجاری ادراری، اسهال‌های عفونی، عفونت

گوش میانی، عفونت پروستات حاد یا مزمن، عفونت شدید ریوی

میزان مصرف: در بالغین ۲ قرص صبح و ۲ قرص عصر (با فاصله ۱۲

ساعت)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، در فارنژیت ناشی از

استرپتوکوک گروه A بتاهمولیتیک نارسایی شدید کلیوی

✳ عوارض جانبی مهم: تهوع - استفراغ، ضایعات پوستی، تشنج، توهم، سر

درد، زردی و اسهال شدید

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: - بررسی عملکرد کلیه و کبد ضروری

است.

- میزان دریافت مایعات و ادراک کنترل شود.

- در افراد با اختلالات خونی با احتیاط تجویز شود.

آموزش بیمار - خانواده: - زخم دهانی و زردی و ضایعات پوستی و

خون در ادرار نشانگر مسمومیت جدی است به پزشک اطلاع دهید.

- بی‌اشتهایی و کپیر نیز از جمله علائم هستند

شرایط نگهداری: - در دمای معمولی نگهداری شود.

## کرومولین سدیم (CROMOLIN SODIUM)

نام تجاری: Intal

گروه دارویی: کرومون ها

گروه درمانی: ضد آسم و آلرژی

📦 شکل دارویی: اسپری و محلول برای نبولایزر، کپسول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: پیشگیری از آسم، علائم آلرژی، تنگی مجاری بزرگ هوایی

⚖️ میزان مصرف: به صورت اسپری یا محلول یک تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، حملات حاد آسم

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، سرفه، سردرد، درد شکمی، کهیر و مزه بد دهان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو در حملات حاد آسم مفید نیست.

ارزیابی عملکرد ریوی توسط پزشک معالج می بایست انجام شود.

ارزیابی آزمایش های خونی (به ویژه تعداد ائوزینوفیل) ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: برای اصلاح مزه بد دهان، آب غرغره شود.

سالبوتامول را ۵ دقیقه قبل از کرومولین سدیم استفاده کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

## کومارین (CUMARIN-SR)

نام تجاری: lodema

گروه دارویی: کومارین ها

گروه درمانی: ضد انعقادی

شکل دارویی: قرص ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: ادم و تورم لنفاوی در بیماری های فیلاریازیس و پس از عمل جراحی برداشتن پستان (ماستکتومی)

میزان مصرف: یک قرص در روز به مدت یک ماه و نیم قرص در روز به مدت ۲ سال

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و نارسایی شدید کبدی

عوارض جانبی مهم: عوارض کبدی و عوارض گوارشی

توجهات پزشکی - پرستاری: تست های عملکرد کبدی باید انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو در افراد با ضایعات کبدی با احتیاط مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

# سیکلو پنتولات (چشمی) (CYCLOPENTOLATE)

نام تجاری: Cyclogyl

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک (آمین‌ها)

گروه درمانی: گشاد کننده مردمک

⑤ شکل دارویی: قطره ۱٪ چشمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: برای آماده سازی چشم برای معاینه چشم پزشکی  
⚠️ میزان مصرف: «یک قطره» قبل از معاینه و در صورت لزوم تکرار می‌شود.

موارد منع مصرف: آب سیاه (گلوکوم) با زاویه بسته و حساسیت مفرط  
⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، اختلال خواب، تاری دید، اشک ریزش، اختلال در تکلم

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو جذب عمومی (سیستمیک) دارد. دارو می‌تواند عامل اختلال خلق یا رفتار شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز علائم جدی و عمومی به پزشک اطلاع داده شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.



## سیکلوفسفاماید (CYCLOPHOSPHAMIDE)

نام تجاری: Endoxan

گروه دارویی: آلکیل کننده‌ها

گروه درمانی: ضد سرطان

شکل دارویی: تزریقی و قرص

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان سرطان‌های لنفوم، لوسمی، سرطان تخمدان، پستان و در بیماری نارسایی کلیه (سندرم نفروتیک) و رماتیسم و بیماری بافت همبند

میزان مصرف: در نوع وریدی ۴۰ تا ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در ۲ تا ۵ روز و سپس میزان ثابت دارو ۱ تا ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و در نوع خوراکی ۲ تا ۴ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به مدت ۱۰ روز و سپس میزان ثابت دارو  
موارد منع مصرف: در حاملگی، شیردهی، افرادی که واکسن ویروس زنده دریافت کرده‌اند

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، خون در ادرار، عوارض خونی، خونریزی، اختلال الکترولیت‌های خون، عوارض قلبی، اسهال  
توجهات پزشکی - پرستاری: قرص آن با معده خالی تجویز شود.  
آزمایش‌های خونی انجام شود.

عملکرد کلیه قبل و حین درمان بررسی شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز هرگونه خونریزی در ادرار، مدفوع، دهان یا زیر پوست به پزشک اطلاع داده شود. اسهال به همراه درد شکمی متناوب و تهوع و ضعف عمومی نشانگر کمبود پتاسیم است، به پزشک مراجعه شود.  
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

## سیکلوسرین (CYCLOSERINE)

نام تجاری: Seromycin

گروه دارویی: از گروه د - آلانین

گروه درمانی: ضد سل

📦 شکل دارویی: قرص یا کپسول ۲۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان سل ریوی یا خارج از ریه

⚠️ میزان مصرف: یک قرص هر ۱۲ ساعت طی ۲ هفته و سپس یک قرص هر ۸ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، نارسایی کلیوی

⚠️ عوارض جانبی مهم: ضایعات پوستی، ضعف، سردرد، بیقراری، تحریک پذیری

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: به همراه دارو، ویتامین B6 هم تجویز شود.

آموزش بیمار - خانواده: به علت خواب آلودگی از رانندگی پرهیز شود.

تاری دیدی و زردی نیز می تواند بروز کند.

دوره درمان را کامل کنید.

دارو بعد از غذا میل شود.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## سیپروهپتادین (CYPROHEPTADINE)

نام تجاری: Periaction

گروه دارویی: آنتی هیستامین

گروه درمانی: ضد حساسیت - اشتهاآور

شکل دارویی: قرص ۴ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: افزایش اشتها و درمان آلرژی و سردردهای عروقی  
(میگرن)

میزان مصرف: یک قرص ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت بیش از حد، کودکان زیر ۲ سال

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، چاقی و زردی از جمله عوارض  
است.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: دارو بهتر است با غذا استفاده شود.

گیجی جزء عوارض است، هشدار دهید.

آموزش بیمار - خانواده: افزایش وزن باید مرتب اندازه گیری شود.

خشکی دهان را با نوشیدن مایعات و غرغره کردن آب برطرف کنید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مطلوب است.

## سیپروترون (استات) (CYPROTERONE)

نام تجاری: Androcur

گروه دارویی: ضد آندروژن

گروه درمانی: هورمون‌ها (ضد آندروژن)

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان افزایش شدید میل جنسی (برای کاهش میل

جنسی) و درمان سرطان پروستات و پر مویی و آکنه

⚠️ میزان مصرف: یک قرص ۲ بار در روز

موارد منع مصرف: نارسایی یا سرطان کبد، افسردگی شدید و بیماری

دیابت قندی و سابقه ترومبوآمبولی

⚠️ عوارض جانبی مهم: زردی، عقیمی، افسردگی، خواب آلودگی، عوارض

پوستی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در زنان حامله حتی الامکان تجویز

نشود. تست‌های کبدی باید بررسی شود.

آموزش بیمار - خانواده: به علت خواب آلودگی از کارهای دقیق و

رانندگی پرهیز شود.

در صورت ترشح شیر از پستان یا بزرگی پستان مردانه به پزشک اطلاع

داده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## سیپروترون (کامپاند) (CYPROTERONE)

نام تجاری: Diane

گروه دارویی: آنتی آندروژن

گروه درمانی: ضد آندروژن و استروژن

⑤ شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان آکنه و پرمویی غیر طبیعی (هیرسوتیسم)

Ⓐ میزان مصرف: یک قرص روزانه به مدت ۲۱ روز در سیکل‌های ماهانه. اولین دارو باید از روز اول سیکل یا دوره ماهانه شروع شود و پس از ۷ روز آثار دوره دوم شروع می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی - به موارد منع مصرف داروهای کنتراستیتیو مراجعه شود (صفحه ۲۲۴).

Ⓢ عوارض جانبی مهم: احساس خستگی، ضایعات جلدی، ترشح شیر از پستان، افسردگی

Ⓐ/ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت بروز زردی یا مشکلات دیگر به پزشک مراجعه شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت علائم جدی به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## سیتارابین (CYTARABIN)

نام تجاری: Cytosar

گروه دارویی: ضد سرطان

گروه درمانی: آنتی متابولیت

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: ضد سرطان های خون: CML, ALL, AML

⚠ میزان مصرف: بنابر نوع بیماری متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و میه‌ار و ناتوانی مغز

استخوان و افرادی که واکسن زنده دریافت کرده‌اند.

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، کم خونی، زردی، تب، سردرد، زخم

دهان

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو بسیار سمی است و فقط

پزشکان متخصص و با تجربه کافی باید تجویز نمایند.

تست‌های عملکرد کلیوی و کبدی به صورت منظم باید کنترل شوند.

زنان در سنین باروری نباید آن را مصرف کنند و در صورت مصرف نباید

باردار شوند.

آموزش بیمار - خانواده:

ممکن است استفراغ‌های مکرر داشته باشد.

ریزش مو ناشی از دارو قابل برگشت می‌باشد.

در صورت قیری شدن رنگ مدفوع می‌بایست به پزشک اطلاع داد.

شرایط نگهداری: محلول آماده تزریق را در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه فقط

به مدت ۴۸ ساعت نگهداری کنید.

## داکاربازین (DACARBAZINE)

نام تجاری: DHC

گروه دارویی: آلکیل کننده

گروه درمانی: ضدسرطان

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان های خونی، سرطان پوست (ملانوم بدخیم)

میزان مصرف: ۲ تا ۴/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز  
به مدت ۱۰ روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، واکسن ویروس های زنده و  
آبله مرغان

عوارض جانبی مهم: عوارض خونی، اسهال، زخم دهان، استفراغ،  
بی اشتها، کم خونی

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو باید فقط از طریق وریدی  
استفاده شود.

بهتر است شمارش سلول های خونی به طور منظم انجام شود.

ارجح است بیمار در ابتدای درمان در بیمارستان بستری شود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار می بایست با پزشک در پیگیری  
آزمایش ها همکاری کند. تاری دید و اختلال حس، نشانه مسمومیت  
است.

شرایط نگهداری: محلول آماده تا ۸ ساعت در دمای معمولی نگهداری  
شود.

## داکتینوما یسین (DACTINO MYCIN)

نام تجاری: Cosmegen

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: ضد سرطان

📌 شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان های شایع: در کلیه (تومور ویلمز)، تومور عضلات (رابدومیوسارکوم)، سرطان بیضه، سارکوم استخوان

⚠️ میزان مصرف: از ۱۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم یا ۴۰۰ تا ۶۰۰ میکروگرم به ازای هر متر مربع تا ۵ روز

موارد منع مصرف: آلودگی ویروسی (هرپس)، و حاملگی و شیردهی

⚠️ عوارض جانبی مهم: اختلالات خونی، سلولیت، تورم پوست، تاول

پوستی، زردی، خستگی، ضعف عمومی، تب و درد عضلانی، زخم دهان

⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: محل تزریق باید مورد بررسی مکرر قرار گیرد.

آموزش بیمار-خانواده: بیمار باید هرگونه کمبودی را اطلاع دهد. بیمار نباید با افراد واکسینه شده با ویروس زنده در تماس باشد.  
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## دانا زول (DANAZOL)

نام تجاری: Danocrine

گروه دارویی: هورمون‌ها (آندروژن)

گروه درمانی: تستوسترون

شکل دارویی: کپسول

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: بیماری‌های اندومتریوز (رحم زنان)، بیماری فیبروکیستیک پستان

میزان مصرف: از ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌گرم و ۲ تا ۳ بار در روز متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبدی و کلیوی، حاملگی و شیردهی

عوارض جانبی مهم: چاقی (افزایش وزن)، پرمویی صورت، کوچک شدن پستان، چرب شدن پوست، گرگرفتگی، خشکی و سوزش، تغییر خلق، آکنه، کاهش پلاکت خون، افسردگی و درد عضلانی

توجهات پزشکی - پرستاری: بیمار از نظر عوارض جانبی می‌بایست قبلاً مطلع شده باشد.

آموزش بیمار - خانواده: در بیماران مبتلا به صرع (تشنج)، میگردن، نارسایی قلبی با احتیاط مصرف شود. قاعدگی بعد از ۲ تا ۳ ماه طبیعی می‌شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## دانترولن (DANTROLEN)

نام تجاری: Dantrium

گروه دارویی: هیدانتوئین‌ها

گروه درمانی: شل کننده عضلات مخطط

شکل دارویی: کپسول و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در بیهوشی، هیپرترمی بدخیم، اسپاسمی مزمن

میزان مصرف: ۴ تا ۸ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم خوراکی یا ۲/۵

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم انفوزیون وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی، نارسایی کبدی، شیردهی

عوارض جانبی مهم: سرگیجه، ضعف، خستگی، تشنج، زردی، عوارض

قلبی، ضایعات پوستی

توجهات پزشکی-پرستاری: بیمار باید از نور حفاظت شود. تست‌های

کبدی و کلیوی لازم است.

آموزش بیمار-خانواده: اثر بهتر دارویی در مصرف دارو با غذا حاصل

می‌شود. ممکن است در بلع و غذا خوردن اشکال ایجاد کند.

شرایط نگهداری: داروی آماده شده می‌بایست طی ۶ ساعت استفاده

شود و در دمای معمولی نگهداری شود.

## دایسون (DAPSONE)

نام تجاری: Aulosulfon

گروه دارویی: سولفونامید

گروه درمانی: ضد جذام

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آلودگی به توکسوپلاسموز، جذام، درماتیت، ایدز، آلودگی قارچی

میزان مصرف: از ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم متفاوت است (یک تا دو بار در روز)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی به دایسون و سولفونامید  
✖ عوارض جانبی مهم: زردی (یرقان)، استفراغ، تشنج، تهوع، بی خوابی، کم خونی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش های خونی و کبدی به صورت منظم تکرار شود.

آموزش بیمار - خانواده: در بیماران مبتلا به فاویسم با احتیاط استفاده شود.

در کمتر از ۶ ماه بیمار مبتلا به جذام می بایست بهبود یابد یا رو به بهبودی رود.

در صورت زردی و تب به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: به دور از نور و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

## دانوروبیسین (DAUNORUBICIN)

نام تجاری: Dauno Xorne

گروه دارویی: آنتراسیکلین ها

گروه درمانی: ضد سرطان (آنتی بیوتیک)

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان های خون (AML)، (ALL)

میزان مصرف: ۴۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بیماری قلبی،

واکسیناسیون، شیردهی

عوارض جانبی مهم: عوارض خونی و قلبی، زخم دهانی، تهوع و

استفراغ، زردی

توجهات پزشکی - پرستاری: بیمار مستعد خونریزی است، به بیمار

مستدکر شوید اختلالات خونی ممکن است بروز نماید، شمارش

سلول های خونی را مرتب انجام دهید.

آموزش بیمار - خانواده: حاملگی در دوره مصرف دارو ممنوع است.

ریزش مو قابل برگشت می باشد (۲ تا ۳ ماه).

در صورت بروز کبودی به پزشک اطلاع دهید.

ماینعات کافی باید بنوشید.

در صورت تب به همراه گلو درد به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## دِفِرُوکَسَامین (DEFEROXAMINE)

نام تجاری: Desferal mesylate

گروه دارویی: آنتاگونیست

گروه درمانی: دفع کننده آهن

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: مسمومیت با آهن، بیماران تالاسمی (ماژور)، هموسیدروز، مسمومیت با آلومینیوم، و به منظور تشخیص افزایش آهن خون

میزان مصرف: ۵ تا ۱۰ گرم را در ۵۰ تا ۱۰۰ سی سی آب حل می کنند و پس از شست و شوی معده به بیمار می خوراند. در نوع تزریقی ۵۰۰ میلی گرم در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی شدید کلیوی، آنوری و پیلونفریت

عوارض جانبی مهم: تزریق سریع داخل وریدی دارو باعث بروز واکنش حساسیتی می شود.

درد عضلانی شدید در تزریق عضلانی مشاهده می شود.

توجهات پزشکی - پرستاری: کم خونی کشنده و نارسایی کلیه گزارش شده است بنابراین تست های لازم باید انجام شود.

دِفِرُوکَسَامین با هپارین ناسازگار است.

آموزش بیمار - خانواده: تغییر رنگ ادرار بروز می کند.

تاری دیدی و هر نوع اختلال بینایی را گزارش دهید.

شرایط نگهداری: پودر در دمای ۲ تا ۸ درجه باید نگهداری شود.

## دزی پرامین (DESIPRAMIN)

نام تجاری: Norpramin

گروه دارویی: دی بنزاپین ها

گروه درمانی: ضد درد، ضد افسردگی (سه حلقه ای)

📦 شکل دارویی: قرص ۲۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: افسردگی مزمن، درد مزمن، کودکان بیش فعال کم توجه،

پر خوری عصبی، افسردگی ناشی از مصرف الکل و کوکائین

⚖️ میزان مصرف: ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم حداکثر ۱۵۰ میلی گرم در روز

موارد منع مصرف: مثل آمی تریپ تیلین (صفحه ۵۲)

☠️ عوارض جانبی مهم: مشابه آمفی تریپ تیلین

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت گزارش علائم زیر مثل

سرگیجه و خواب آلودگی شدید به فکر مسمومیت باشید.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است دارو با غذا یا پس از غذا میل شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## دزموپرسین (DESMORESSIN)

نام تجاری: Octostim

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: ضد ادرار، ضد خونریزی

شکل دارویی: تزریقی و محلول از طریق بینی، قرص

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: دیابت بی‌مزه (با مشکل مغزی)، شب ادراری

میزان مصرف: ۱۰ میکروگرم در هنگام شب (خواب) و هر شب به

میزان ۲/۵ میکروگرم به آن اضافه می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، درد شکمی، اشکال در ادرار کردن،

افزایش وزن

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: - عملکرد کلیوی باید کنترل شود.

وزن بیمار کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: خواب آلودگی، تنگی نفس از عوارض شدید

است که بایستی به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: محلول آن در یخچال و در دمای ۴ درجه نگهداری

شود.

## دگزامتازون (DEXAMETHASONE)

نام تجاری: Decadrol

گروه دارویی: آدرنو کورتیکوئید

گروه درمانی: ضد التهاب، مهار ایمنی

شکل دارویی: تزریقی، قرص، شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب دهان، داروی مخصوص تست تشخیص

بیماری‌های غده فوق کلیه، ورم مغزی، استفرغ، التهاب مفاصل، درمان

کمکی در مننژیت باکتریال، ورم مجاری هوایی

میزان مصرف: در التهاب مغزی یک تا ۲ آمپول هر ۶ تا ۱۲ ساعت - در

مننژیت ۰/۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم هر ۶ ساعت در روز اول تا

چهارم درمان، یا ۱۰ میلی گرم تزریق وریدی و سپس هر ۴ میلی گرم و

هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: مشابه دیگر کورتون‌ها

عوارض جانبی مهم: زخم دستگاه گوارش، بی خوابی، احساس انرژی و

سرخوشی، تشنج

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مشابه بتامتازون است (صفحه ۱۰۰).

آموزش بیمار - خانواده: مشابه بتامتازون است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## دکس کلرفنرآمین (DEX CHLOR PHENIRAMINE)

نام تجاری: Polaraminea

گروه دارویی: ضد حساسیت‌ها

گروه درمانی: ضد آلرژی

شکل دارویی: قرص، شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان علامتی وضعیت آلرژی، کهیر، حساسیت چشمی،

بیماری خارش دار پوستی

میزان مصرف: ۲ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت

موارد منع مصرف: به دیفن هیدرامین مراجعه شود.

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، اختلالات خونی، کم خونی

توجهات پزشکی - پرستاری: وضعیت اداری بیمار را کنترل کنید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را با شیر یا آب کافی مصرف کنید.


شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## دکس پانتنول (DEXPANTHENOL)

نام تجاری: Panthoderm

گروه دارویی: اسید پانتوتنیک

گروه درمانی: ضد التهاب پوستی

شکل دارویی: کرم موضعی 

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: التهاب موضعی پوستی، اگزما، خارش و حساسیت و تحریک پوستی

⚠ میزان مصرف: کرم به صورت ۱ تا ۲ بار روزانه استفاده شود.

موارد منع مصرف: در هموفیلی و انسداد روده ممنوع است.

⚠ عوارض جانبی مهم: مشکل خاصی گزارش نشده است

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مسئله خاصی ندارد.

آموزش بیمار - خانواده: در گزش حشرات و ضایعات التهابی پوستی

کاربرد دارد. در زخم یا ضایعات عفونی مفید نیست.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## دکستران (DEXTRAN)

نام تجاری: Dextraran

گروه دارویی: پلی ساکارید

گروه درمانی: سرم‌ها

شکل دارویی: سرم تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: مورد اصلی مصرف آن وقتی است که در موارد اورژانس خون در دسترس نباشد و با این محلول حجم داخل عروق افزایش می‌یابد.

میزان مصرف: ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌لیتر مایع تجویز می‌شود.

موارد منع مصرف: در بیماری کلیوی و ناتوانی بیمار در ادرار و حساسیت شدید ممنوع است. در خونریزی شدید این محلول جایگزین خوبی برای خون نیست مگر در موارد اورژانس تا خون تهیه شود.

عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، استفراغ، کاهش غلظت خون، خونریزی، کهیر، خارش

توجهات پزشکی - پرستاری: احتمال شوک یا واکنش حساسیتی شدید وجود دارد. در موارد نارسایی قلبی با احتیاط تجویز شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت عوارض جانبی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود. محلول باید فاقد رنگ باشد.

## دiazepam (DIAZEPAM)

نام تجاری: Valium

گروه دارویی: بنزودیازپین‌ها

گروه درمانی: آرام بخش - ضد اضطراب

شکل دارویی: قرص، آمپول

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان اضطراب، تشنج، ضد لرزش، ضد حملات ترس (پانیک) در اسپاسم عضلانی (به عنوان شل‌کننده عضلات، اسپاسم در بیماران کزاز)

میزان مصرف: به نوع بیماری بستگی دارد (۲ تا ۲۰ میلی گرم) Diazepam (IV, IM)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، مسمومیت شدید با الکل که در حالت کوما هستند، آب سیاه چشم (گلوکوم زاویه بسته)

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی شدید، گیجی، خشکی دهان، یبوست، زردی، درد عضلانی، تنگی نفس، کم خونی، اختلالات سلول‌های خونی و کاهش فشارخون

توجهات پزشکی - پرستاری: خواب آلودگی شدید از جمله علائم مسمومیت است.

- قطع دارو به طور ناگهانی خطرناک است.

آموزش بیمار - خانواده: در تجویز ویریدی احتمال کاهش فشار خون و وقفه تنفسی می‌رود. می‌بایست بیمار از مصرف داروهای آرام‌بخش

دیگر به طور همزمان پرهیز نماید. پس از مصرف دارو، از انجام کارهای نیازمند دقت و رانندگی خودداری شود.  
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## دiazoxide (DIAZOXIDE)

نام تجاری: HyPerstat

گروه دارویی: مشتق تیازیدی

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: کپسول، قطره، تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون بالای بیمار و فشار خون بعد از عمل جراحی

میزان مصرف: ۱ تا ۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم (حداکثر ۱۵۰ میلی گرم)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به گروه دیازکساید، سولفونامید

عوارض جانبی مهم: سردرد، کاهش فشار خون، هیپرگلیسمی گذرا، استفراغ، سرگیجه

توجهات پزشکی - پرستاری: در اورژانس نوار قلب بیمار را تحت کنترل داشته باشید.

سطح قند خون را اندازه بگیرید.

هنگام تزریق نباید دارو از ورید خارج شود.

وزن بیمار را مرتب اندازه گیری کنید.

آموزش بیمار - خانواده:

هنگام بلند شدن از وضعیت خوابیده آهسته این کار را انجام دهید. نیم

ساعت پس از تزریق دراز بکشید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## دیکلوفناک سدیم (DICLOFENAC)

نام تجاری: Voltaren

گروه دارویی: اسید فنیل استیک

گروه درمانی: ضد درد، ضد التهاب

شکل دارویی: قرص، شیاف، آمپول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آرتروز (استئوآرتریت)، رماتیسم مفصلی، التهاب بورس و تاندون‌ها، درد کلیوی

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص یا یک شیاف یک تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت به دارو، زخم معده فعال، بیماری پورفیری  
عوارض جانبی مهم: تشنج، سردرد، عوارض کلیوی، کبدی، تمایل به خونریزی، فشار خون بالا و افزایش قند خون، خونریزی از دستگاه گوارش، کهیر و عوارض پوستی، تنگی نفس

توجهات پزشکی - پرستاری: برای کاهش تحریک معده قرص را با یک لیوان کامل آب مصرف کنید. برای جذب بهتر دارو آن را یک ساعت قبل یا بعد از غذا مصرف کنید.

آموزش بیمار - خانواده: از رانندگی به علت خواب‌آلودگی ناشی از مصرف دارو پرهیز شود. مصرف به شکل تزریقی با فلج عصب سیاتیک همراه است و ممنوع شده است.

شرایط نگهداری: از مصرف همزمان داروهای ضد درد دیگر مثل آسپیرین خودداری شود.

## دی سیکلومین (DICYCLOMINE)

نام تجاری: Dilomine

گروه دارویی: ضد درد موسکارینی (آنتی کولینرژیک)

گروه درمانی: ضداسپاسم دستگاه گوارشی

📦 شکل دارویی: قرص، شربت، تزریقی (آمپول)

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: دردهای دستگاه گوارش، درمان کمکی در اسهال، روده

تحریک پذیر، درد شکمی (کولیک) در شیرخواران

📏 میزان مصرف: یک تا ۴ قرص در روز و در کودکان ۱۰ میلی گرم ۳ تا ۴

بار در روز که معادل یک قاشق مرباخوری است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، تشنج، سنکوپ و اختلال هشیاری

⚠️ عوارض جانبی مهم: تپش قلب، بی خوابی، سرگیجه، خستگی، تاری دید،

یبوست، اتساع شکم

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: مایعات دریافتی و خروجی را کنترل کنید.

این دارو با داروهای آنتی هیستامین تداخل عملکرد دارد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را با غذا میل کنید.

در نوع تزریقی، بیمار پس از تزریق در وضعیت دراز کش بخوابد و به

طور ناگهانی تغییر وضعیت ندهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.




## داینستروول (DIENESTROL)

نام تجاری: Estragvard

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: استروژن ساختگی

شکل دارویی: کرم واژینال 

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان عوارض یائسگی در دستگاه تناسلی زنان (آتروفی واژن)

میزان مصرف: یک اپلیکاتور از دارو یک تا ۲ بار در روز به مدت ۲ هفته

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، حاملگی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، و به صورت مصرف مزمن خطر مشکلات قلبی عروقی، احتمال سرطان سینه، آدنوم کبد و سکتۀ قلبی در مصرف سیستمیک گروه دارویی استروژنی بروز می‌کند ولی به صورت موضعی علائم محدودی دارد.

توجهات پزشکی - پرستاری: معاینۀ سالانۀ فرد لازم است. بی حرکتی طولانی برای بیمار ممنوع است.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است دارو قبل از خواب استعمال شود. شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## دی اتیل کاربامازین سیترات (DIETHYL CARBAMAZINE)

نام تجاری: Hetrazan

گروه دارویی: پیرازین

گروه درمانی: ضد کرم

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: آلودگی انگلی به کرم فیلاریاز، انکور سرکیاز، لوآلوا و آسکاریس (کرم‌های روده و مجاری لنفاوی بدن)

⚖ میزان مصرف: در آسکاریس ۱۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و در

فیلاریاز ۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، استفراغ، تب، ضایعات پوستی، خواب

آلودگی، بی‌اشتهایی، درد استخوان و علائم تنگی نفس

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با سرعت از دستگاه گوارش

جذب می‌شود و عمدتاً از طریق ادرار دفع می‌گردد.

احتمال سقط جنین در این دارو فراوان است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز علائم جانبی و عوارض

دارویی به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## دی اتیل استیل بسترول (DIETHYLSTIBESTROL)

نام تجاری: Stilbestrol

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: ضد نئوپلاسم (ضد سرطان)

📌 شکل دارویی: قرص ۱ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان سرطان‌های پیشرفته پروستات و پستان و جلوگیری از حاملگی بعد از نزدیکی

📌 میزان مصرف: در سرطان‌ها ۱ تا ۳ میلی گرم خوراکی در روز - در جلوگیری از حاملگی ۲۵ میلی گرم دو بار در روز به مدت ۵ روز (البته حداکثر ۷۲ ساعت بعد از نزدیکی باید مصرف دارو شروع شود).

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، حاملگی، ترومبوفلیت (سابقه لخته شدن خون در وریدها بویژه اندام تحتانی ساق - ران و لگن)، ترومبوز، مشکلات قلبی و عروقی

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، تشنج و اختلالات جنینی (اگر در حاملگی استفاده شود).

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: معاینه دوره‌ای در مصرف کنندگان دارو ضروری است. در صورت اسهال و استفراغ شدید باید به فکر مسمومیت دارویی باشید. در مسمومیت دارویی، شست و شوی معده مفید است.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار برای معاینات دوره‌ای پستان و دستگاه تناسلی به پزشک مراجعه کند. در صورت بروز تنگی نفس یا سفتی در پاها یا احساس درد قفسه سینه به پزشک رجوع شود.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مطلوب است.

## دایجستیو (DIGESTIVE)

نام تجاری: Onoton

گروه دارویی: آنزیم‌های گوارشی

گروه درمانی: پانکراتین، سایمیتیکون، لیپاز

📌 شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیماری‌های گوارشی ناشی از کیسه صفرا، پانکراس، عمل جراحی معده، درمان اسهال ناشی از جراحی (برداشتن معده) و درمان نفخ

📌 میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص همراه با هر وعده غذا

موارد منع مصرف: در حساسیت شدید دارویی یا علائم بروز پانکراتیت حاد منع مصرف دارد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع و اسهال و درد شکمی از جمله عوارض است.   
⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با آنتی‌اسیدها تداخل دارد. این دارو آثار ضد نفخ دارد.

آموزش بیمار - خانواده: ارجح است بیمار پس از مصرف دارو مقداری غذا بخورد. قرص نباید جویده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## دیگوکسین (DIGOXIN)

نام تجاری: lanoxine

گروه دارویی: گلیکوزید دیژیتال

گروه درمانی: ضد آریتمی قلبی، نارسایی قلبی

⑤ شکل دارویی: قرص، آمپول، قطره، شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: نارسایی قلبی، بی‌نظمی‌های ریتم قلبی (نوع

سوپراونتریکولار)

⚠️ میزان مصرف: در نوزادان تا بالغین میزان مصرف متفاوت و برای

شروع درمان باید میزان خاصی را تجویز کرد که به آن دیژیتالیزاسیون بیمار گفته می‌شود.

موارد منع مصرف: در صورت ابتلای بیمار به آریتمی قلبی و مسمومیت با گلیکوزید قلبی منع مصرف دارد.

☠️ عوارض جانبی مهم: عوارض گوارشی، تهوع و استفراغ، بی‌اشتهایی، ضعف عمومی، سردرد، تغییرات بینایی، ترس از نور و هذیان جزء عوارض شدید دارویی است.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: غذا هیچ اثری بر میزان جذب دارو ندارد.

در صورت کاهش تعداد ضربان قلب (برادیکاردی) تزریق را متوقف کنید. - اغلب برای پیشگیری از مسمومیت دارویی ۱ تا ۲ روز در هفته مصرف دارو حذف می‌شود مثلاً (دوشنبه و جمعه)

آموزش بیمار - خانواده: به دستور پزشک توجه کافی شود.

- بیمار از سبزی کافی و سیب زمینی استفاده کند.  
شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.



## دی هیدروارگوتامین (DIHYDRO ERGOTAMINE)

نام تجاری: Migranal

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده آلفا

گروه درمانی: تنگ کننده عروق محیطی، ضد درد

📦 شکل دارویی: قرص ۱/۵ و ۲/۵ میلی گرمی و آمپول ۱ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: سردردهای حمله‌ای میگرنی، سردرد خوشه‌ای و سردردهای مزمن

🕒 میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص و تکرار آن هر ۳۰ دقیقه و یا ۱ میلی گرم آمپول از راه عضلانی

موارد منع مصرف: بیماران عروق محیطی و در حاملگی منع مصرف دارد، همچنین در بیماری شریان کرونر و فشار خون بالا که تحت کنترل نیست ممنوعیت مصرف دارد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: سرگیجه، تهوع، استفراغ، اختلال دید، خشکی دهان، تورم در دست و پا به همراه درد.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت بروز تهوع، استفراغ، درد وضعف در اندام به فکر مسمومیت دارویی باشید.

این دارو اغلب در آغاز سردرد مفیدتر است.

آموزش بیمار - خانواده:

دست و پا را گرم نگه دارید.

میزان مصرف دارو را تغییر ندهید.

مصرف همزمان ارگوتامین با اریترومايسين ممنوع است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## دی هیدروارگوتوکسین (DIHYDROERGOTOXIN)

نام تجاری: Hydergine

گروه دارویی: ارگوت آکالوئید

گروه درمانی: درمان دمانس پیری

📌 شکل دارویی: قرص ۱/۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: درمان دمانس یا زوال عقلی در سالمندان

📏 میزان مصرف: ۱ میلی گرم سه بار در روز و به تدریج به ۶ میلی گرم در روز تا شش ماه

موارد منع مصرف: اختلالات روانی (سایکوز حاد)

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، زخم‌های دهانی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: برای ظهور علائم بهبود حداقل یکماه وقت لازم است.

آموزش بیمار - خانواده: اختلالات گوارشی ممکن است بروز کند.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



## دی هیدروتاکی استرول (DIHYDROTACHYSTEROL)

نام تجاری: Hytakerol

گروه دارویی: ویتامین ها

گروه درمانی: ویتامین (D3)

⑤ شکل دارویی: محلول خوراکی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان کمبود کلسیم خون و هیپوفسفاتی فامیلیال، هیپوکلسیمی ناشی از کم کاری پاراتیروئید و استئودیسτροφی کلیوی در اورمی مزمن (نارسایی کلیه) و بیماری ریکتز (کمبود ویتامین D)

Ⓜ میزان مصرف: روزانه ۰/۵ تا ۲ گرم

موارد منع مصرف: بالا بودن کلسیم خون، حساسیت به ویتامین D و سندرم سوء جذب

⚠ عوارض جانبی مهم: سردرد، یبوست تهوع، استفراغ، خشکی دهان، بی اشتهایی، احساس تشنگی، رسوب کلسیم در قلب و کلیه

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: - تغییراتی در آزمایش های کبدی ایجاد می شود.

مصرف بالای دارو باعث مسمومیت می شود.

بروز احساس خشکی شدید دهان ممکن است از علائم اولیه مسمومیت دارویی باشد.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار نباید میزان مصرف دارو را خودسرانه افزایش دهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## دیلوکسانید (DILOXANIDE)

نام تجاری: Furamid

گروه دارویی: دی کلرواستامیدها

گروه درمانی: ضد انگل، ضد آمیب

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: ضد آلودگی انگلی با آمیب می باشد. در آلودگی باکیست هم مفید است.

⑥ میزان مصرف: یک قرص سه بار در روز به مدت ۱۰ روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، درد شکمی، خارش، اسهال

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: دوره درمان را می توان تکرار کرد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو بهتر است همراه غذا میل شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## دیلتیاژم (DILTIAZEM)

نام تجاری: Cardizem

گروه دارویی: بلوک کننده کلسیم

گروه درمانی: ضد آنژین، ضد فشار خون

شکل دارویی: تزریقی، قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آنژین مزمن قلبی، فشار خون، آریتمی قلبی، جلوگیری از سکته قلبی، میگرن

میزان مصرف: ۳۰ میلی گرم قرص ۴ بار در روز تا ۶۰ میلی گرم ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بلوک های قلبی، کاهش فشار خون، حمله حاد قلبی

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، سردرد، تهوع، استفراغ، نارسایی قلبی، آریتمی، ضعف روانی، شب ادراری، خونریزی، سختی تنفس، کاهش اشتها

توجهات پزشکی - پرستاری: فشار خون بیمار می بایست کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو قبل از غذا مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## دیمن هیدرینات (DIMENHYDRINATE)

نام تجاری: Dramamine

گروه دارویی: اتانول آمین

گروه درمانی: ضد حساسیت

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تهوع، استفراغ، اختلالات تعادل به واسطه مشکل گوش داخلی

⑥ میزان مصرف: یک تا ۲ قرص ۲ تا ۳ بار در روز

برای پیشگیری از تهوع و استفراغ در مسافرت می بایست نیم ساعت قبل از شروع حرکت (مسافرت) مصرف شود.

موارد منع مصرف: در BP.H (بزرگی پروستات مردان) و آب سیاه زاویه بسته (چشم)

⚠ عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، ضعف عمومی، سردرد، خشکی دهان، تشنج، فشار خون بالا

⚠ توجهات پزشکی-پرستاری: برای جلوگیری از خشکی دهان، مایعات بیشتری تجویز شود. دیگر داروهای خواب آور و همراه الکل باعث تشدید علائم می شود.

آموزش بیمار-خانواده: بهتر است دارو با مقداری غذا مصرف شود. از رانندگی و کار ظریف باید اجتناب نمود.

شرایط نگهداری: دمای معمولی برای دارو دمای ۱۵ تا ۲۰ درجه است.

## دایمر کاپرول (DIMERCAPROL)

نام تجاری: Bal

گروه دارویی: ضد مسمومیت (شلات کننده)

گروه درمانی: ضد مسمومیت فلزات سنگین

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: این دارو به عنوان شلاتور یا دفع کننده و متصل شونده به بعضی از فلزات سنگین کاربرد دارد و در مسمومیت با آرسنیک، سرب، طلا و جیوه به کار می‌رود.

میزان مصرف: ۳ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم هر ۴ ساعت در ۴۸ ساعت اول و به میزان ۴ بار در روز سوم و ۲ بار در روزهای بعد تا دهمین روز به شکل تزریق عمیق عضلانی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبد

⚠️ عوارض جانبی مهم: بالا رفتن تعداد ضربانهای قلب (تاکیکاردی)، بالا رفتن فشار خون، احساس تنگی نفس، سردرد، مشکلات خونی، درد موضعی

⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: تزریق عضلانی به شدت دردناک است و احتمال آبسه استریل محل تزریق بالاست.

فشار خون بیمار باید کنترل شود.

این دارو ممکن است عوارض کلیوی داشته باشد.

آموزش بیمار-خانواده: به علت اختلالات خونی، بیمار باید تست‌های

خونی انجام دهد.

این دارو در مسمومیت با بیسموت و تالیم خیلی موثر نیست.

در بیماران مبتلا به فاویسم با احتیاط مصرف شود.

شرایط نگهداری: دارو در دمای داخل یخچال ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود.

## دایمتیکون (DIMETHICON)

نام تجاری: Degas

گروه دارویی: دی متیل سیلوکسان‌ها

گروه درمانی: ضد نفخ

شکل دارویی: قرص و قطره

مصرف در حاملگی: گروه بدون مطالعه و برای شیردهی بی خطر است.

موارد مصرف: نفخ شکم، درمان کمکی در زخم معده، روده

تحریک‌پذیر، عدم تحمل به لاکتوز

میزان مصرف: ۳ تا ۴ قرص ۳ بار در روز پس از غذا جویده شود.

موارد منع مصرف: مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی مهم: عارضه خاصی وجود ندارد.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو قبل از آندوسکوپی یا رادیوگرافی

روده مفید است.

آموزش بیمار - خانواده: وعده شب دارو بهتر است هنگام خواب

استفاده شود.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## دی متیل سولفوکساید (DIMETHYL SULFOXIDE)

نام تجاری: Rimso-50

گروه دارویی: سولفوکسایدها

گروه درمانی: ضد التهاب موضعی

شکل دارویی: محلول ۵۰٪ (ویال) 


مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب مثانه

میزان مصرف: بوسیله سوند فلاتون ۵۰ میلی لیتر از محلول ۵۰٪ آن به داخل مثانه وارد و بعد از ۱۵ دقیقه خارج شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: راش پوستی، کهیر، واکنش حساسیت، تهوع، اسهال

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو برای تزریق عضلانی در بدن 

مفید نیست

دارو را با کاتتر یا سرنگ مستقیماً وارد مثانه کنید.

دارو توسط ادرار دفع می شود.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو در عفونت های مثانه مفید نیست.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## دیفن هیدرامین کامپاند (DIPHENHYDRAMIN COMPOUND)

گروه دارویی: آنتی هیستامین

گروه درمانی: ضد احتقان - ضد سرفه

شکل دارویی: شربت 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان علامتی سرماخوردگی، گرفتگی بینی، آلرژی، سرفه

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قاشق هر ۴ ساعت

موارد منع مصرف: در پورفیری نباید استفاده کرد.

⚠ عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، تپش قلب، یبوست، خشکی دهان،

سردرد، سرگیجه، بی خوابی، لرزش، تشدید حملات آسم، تشنج

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو اثر خلط آوری دارد. در درمان کم خوابی نیز موثر است.

آموزش بیمار - خانواده: بعد از مصرف آن رانندگی نکنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

تذکر: این دارو ترکیبی از دیفن هیدرامین + آمونیوم کلراید + متول +

سیترات سدیم است.

## دیفن هیدرامین (DIPHENHYDRAMIN)

نام تجاری: Benadryl

گروه دارویی: اتانول آمین ها

گروه درمانی: آرام بخش، ضد حساسیت

شکل دارویی: شربت، قرص، تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: علائم آلرژی، کهیر، پرخونی چشم، بیماری های خارش دار پوستی، حساسیت شدید، درمان پارکینسون و دیستونی حاد

میزان مصرف: ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: در پورفیری نباید استفاده شود.

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، فشار خون بالا، تشنج، تاری دید، خشکی دهان، یبوست

توجهات پزشکی - پرستاری: مصرف دارو به همراه غذا مفیدتر است.

اثر ضد تهوع آن نیز مطلوب است به ویژه در بیماری مسافرت.

در صورت وجود فشار خون بیمار، علائم چاقی پس از مصرف اندازه گیری شود.

آموزش بیمار - خانواده: پس از مصرف از رانندگی اجتناب شود.

تزریق عضلانی آن باید عمیق باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## دیفنوکسیلات (DIPHENOXYLAT)

نام تجاری: Iomotil

گروه دارویی: مخدرها

گروه درمانی: ضد اسهال

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C


موارد مصرف: اسهال‌های مزمن، درمان اسهال ناشی از ترک مواد مخدر

میزان مصرف: ۲ قرص هر ۶ ساعت تا کنترل اسهال

موارد منع مصرف: در مبتلایان به یرقان، اسهال ناشی از میکروب و التهاب روده بزرگ منع مصرف دارد.

عوارض جانبی مهم: خشکی دهان، یبوست، درد شکمی، بی‌اشتهایی،

خواب‌آلودگی، خارش، کهیر، افزایش ضربان قلب

توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت قطع اسهال میزان مصرف دارو کاهش یابد. 

در اسهال‌های عفونی مثل شیگلا و سالمونلا مفید نیست.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت مصرف همزمان داروهای اعصاب به پزشک اطلاع دهید.

در صورت وجود تب یا اسهال خونی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## دیپی و فرین (DIPIVEFRIN)

نام تجاری: propine

گروه دارویی: سمپاتو میمیتیک

گروه درمانی: ضد آب سیاه

⑤ شکل دارویی: قطره استریل چشمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آب سیاه چشم (گلوکوم زاویه باز)

⚠ میزان مصرف: یک قطره هر ۱۲ ساعت

موارد منع مصرف: گلوکوم زاویه بسته و حساسیت شدید دارو

⚠ عوارض جانبی مهم: سوزش چشم، تاری دید، سرگیجه، سردرد، پرخونی

چشم

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت مصرف اپی نفرین چشمی آن را قطع کنید.

آموزش بیمار - خانواده: پس از چکاندن قطره دست‌ها را با آب و صابون بشویید و خشک کنید.

در ابتدای ورود دارو به چشم ممکن است سوزش ایجاد شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## دی پیریدامول (DIPYRIDAMOLE)

نام تجاری: Persantine

گروه دارویی: پیریمیدین‌ها

گروه درمانی: مهار کننده تجمع پلاکتی

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: پیشگیری از ترومبوآمبولی (لخته شدن خون در وریدها)

به ویژه در دریچه‌های مصنوعی قلبی، به منظور تشخیص بیماری

قلبی، پیشگیری از سکتۀ قلبی مجدد

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص، ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: تاری دید، سردرد، فشار خون پایین و سوزش و درد

قفسۀ سینه، استفراغ، اسهال

توجهات پزشکی - پرستاری: در افراد با کاهش فشار خون با احتیاط

تجویز شود. در صورت بروز سردرد از ضد درد خفیف استفاده کنید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو بهتر است همراه غذا استفاده شود. در

صورت احساس درد قفسۀ سینه به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## دیزوپیرامید (DISOPYRAMID)

نام تجاری: Napamide

گروه دارویی: مشتقات پیریدین

گروه درمانی: ضد آریتمی قلبی

⑤ شکل دارویی: کپسول ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آریتمی‌های قلبی با منشأ فوق بطنی (فلوتر و فیبریلاسیون دهلیزی)

⚠️ میزان مصرف: میزان تجویز اولیه ۳۰۰ میلی گرم خوراکی و میزان نگهدارنده آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی گرم روزانه

موارد منع مصرف: در بلوک قلبی درجه ۲ و ۳ ممنوع است. در شوک نیز ممنوع است.

⚠️ عوارض جانبی مهم: یبوست، کاهش فشار خون، سردرد، بی‌نظمی قلبی (آریتمی)، درد قفسه سینه، بی‌اشتهایی، اسهال، حالات روانی خاص

⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: همیشه علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.

ممکن است نیاز به بررسی الکترولیت‌های سرم باشد.

احتمال کاهش قند خون بعد از مصرف دارو وجود دارد.

آموزش بیمار-خانواده: دارو باعث خشکی دهان می‌شود، با مصرف مایعات این مشکل کاهش می‌یابد.

میزان داروها را افزایش یا کاهش ندهید.

در صورت بروز اختلال هشیاری یا قطع تنفس به فکر مسمومیت با دارو باشید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



## دیترانول (DITHRHNOL)

نام تجاری: Anthranol

گروه دارویی: آنترانول ها

گروه درمانی: ضد پسوریازیس

شکل دارویی: کرم موضعی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پسوریازیس مزمن (غیر حاد بدون ضایعات، تاول دار پوستچولی)

میزان مصرف: به صورت موضعی روی نقاط ضایعه بمالید.

موارد منع مصرف: روی صورت منع مصرف دارد، در حساسیت شدید دارویی ممنوع است.

عوارض جانبی مهم: تحریک زودگذر پوست، حساسیت دارویی

توجهات پزشکی - پرستاری: با کمترین میزان دارو شروع شود.

آموزش بیمار - خانواده: به بیمار تذکر دهید که دارو باعث تغییر رنگ پوست و مو می شود.

شرایط نگهداری: در جای خنک (۸ تا ۱۵ درجه) نگهداری شود.




## دوبوتامین (DOBUTAMINE)

نام تجاری: Dobutrex

گروه دارویی: آدرنرژیک‌ها

گروه درمانی: محرک قلب

شکل دارویی: تزریقی (انفوزیون وریدی) 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان نارسایی حاد قلب و در شوک قلبی یا عفونی یا جراحی قلب و افزایش مدت ضربان قلب

میزان مصرف: ۲ تا ۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه (انفوزیون

وریدی) تا به ۱۰ تا ۱۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه برسد

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و بیماری تنگی

هیپرتروفیک تحت آئورتی (IHSS)

عوارض جانبی مهم: حملات آسم، کاهش فشار خون، حساسیت شدید،

تهوع، سردرد، تپش قلب، تنگی نفس

توجهات پزشکی - پرستاری: مایعات کافی باید برای بیمار تأمین شود. 

نوار قلب و فشار خون بیمار کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت تشدید علائم به پزشک اطلاع داده

شود. ممکن است در محل تزریق درد ایجاد شود به پرستار اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: محلول تهیه شده در جای خنک نگهداری شود (۲ تا

۱۵ درجه).

## دوستکسل (DOCETAXEL)

نام تجاری: Taxotere

گروه دارویی: تاکسوئیدها

گروه درمانی: ضد سرطان

📌 شکل دارویی: تزریقی (برای انفوزیون وریدی)

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان سرطان‌های پستان، در مراحل پیشرفتهٔ تومور بدخیم سرطان پستان و ریه و تخمدان

📏 میزان مصرف: بنابر بیماری متفاوت است، میزان معمول ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر متر مربع طی یک ساعت در هر ۳ هفته می باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و کاهش تعداد نوتروفیل (کمتر از ۱۵۰۰ عدد)

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، ریزش مو، زخم دهان، مشکلات خونی، گیجی و کاهش فشار خون، دل درد

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی می بایست کنترل شود.

مصرف دارو در حاملگی و شیردهی ممنوع است.

در صورت بروز تنگی نفس، پرستار می بایست به پزشک اطلاع دهد.

مصرف همزمان هرگونه شیاف ممنوع است.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه کبودی و خونریزی در زیر پوست باید جدی تلقی شود.

ریزش مو قابل برگشت می باشد.

بیمار مستعد خونریزی است نباید در معرض ضربه قرار گیرد (به ویژه ناحیه سر).  
شرایط نگهداری: دارو در یخچال نگهداری شود.



## دوپامین (DOPAMIN)

نام تجاری: Dopastat

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: تنگ کننده عروق

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: محرک قلبی است و در درمان کاهش یا افت فشار خون و شوک قلبی و نارسایی قلبی و نارسایی کلیه مفید است.

میزان مصرف: ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلی گرم دوپامین در ۲۵۰ سی سی محلول و با غلظت ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ میکروگرم در هر میلی لیتر انفوزیون شروع می شود.

موارد منع مصرف: در بیماری های فنوکروموسیتوما یا آریتمی فیبریلاسیون بطنی یا تاکی آریتمی ممنوعیت مصرف دارد.

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، درد قفسه سینه، تشدید حمله آسمی

توجهات پزشکی - پرستاری: از مخلوط کردن دوپامین با محلول سرم بی کربنات سدیم یا فنی توئین سدیم خودداری شود.

کنترل علائم حیاتی و مونیتورینگ نوار قلبی ضروری است. برای تزریق از وریدهای بزرگ استفاده کنید.

آموزش بیمار - خانواده: در محل تزریق ممکن است درد ایجاد شود در صورت بروز این عارضه به پرستار اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## دورزولامید (DORZOLAMIDE)

نام تجاری: Trusopt

گروه دارویی: سولفونامید، مهار کننده کربنیک آنهیدراز

گروه درمانی: ضد گلوکوم

شکل دارویی: قطره چشمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: برای کاهش فشار داخل چشمی و درمان گلوکوم زاویه باز

میزان مصرف: یک قطره ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: التهاب موضعی، تهوع، استفراغ، اشکریزی،

سر درد، ضایعات جلدی

توجهات پزشکی - پرستاری: تست های کبدی و خونی بیمار می بایست

کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز هرگونه علائم چشمی شدید به

پزشک اطلاع دهید

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## داکسی پین (DOXEPINE)

نام تجاری: Adopin

گروه دارویی: دی بنزو کسازینی

گروه درمانی: ضد افسردگی، ضد درد

شکل دارویی: کپسول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: افسردگی مزمن، درد مزمن، اضطراب

میزان مصرف: یک تا ۳ کپسول روزانه حداکثر ۳۰۰ میلی گرم روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سرگیجه، آتاکسی، ضعف، سردرد، حساسیت به نور،

تهوع، استفراغ، احتباس ادرار، بی‌اشتهایی

توجهات پزشکی - پرستاری: مصرف این دارو بدون تجویز پزشک

ممنوع است.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را می‌توان با غذا صرف کرد.

پس از مصرف دارو از رانندگی اجتناب شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.

## دوکسو رویسین (DOXORUBICIN)

نام تجاری: Adriblastina

گروه دارویی: گلیکوزید آنتراسیکلینی  
گروه درمانی: آنتی بیوتیک ضد سرطان

📦 شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان‌های خونی AML، ALL، نوروبلاستوم، سارکوم استخوان، سرطان‌های پستان، تخمدان، مثانه، تیروئید و سرطان معده  
⚠️ میزان مصرف: ۶۰ تا ۷۵ میلی‌گرم به ازای هر متر مربع یک بار تزریق وریدی به فاصله ۳ هفته است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، یرقان، نارسایی شدید قلبی  
⚠️ عوارض جانبی مهم: نارسایی قلبی، تورم محل عمل، تهوع، ریزش مو، کم خونی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: مصرف دارو به شکل عضلانی یا زیر جلدی ممنوع است این دارو می‌تواند باعث عوارض شدید قلبی شود.  
آموزش بیمار - خانواده: بیمار در انجام تست‌های خونی باید با پزشک همکاری کند.

ریزش مو در این بیماران برگشت‌پذیر است.  
تهوع و استفراغ باید تحمل شود.

بهتر است بیمار مایعات کافی در روز بنوشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## داکسی سایکلین (DOXY CYCLINE)

نام تجاری: Vibramy cine

گروه دارویی: اکسی تتراسایکلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونت‌های حاد گونوکوکی، سیفلیس، عفونت لوله‌های رحمی، عفونت دستگاه تناسلی

میزان مصرف: ابتدا یک کپسول هر ۱۲ ساعت در روز و سپس هر روز یک کپسول

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، تشنج، زخم معده و روده  
عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، تغییر رنگ دندان در بچه‌ها، ضایعات پوستی، علائم آسم، زخم معده، زخم دهان، زبان سیاه رنگ، دل درد

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: - بهتر است قبل از شروع درمان، از محل عفونت کشت تهیه شود.

عملکرد کلیوی بیمار کنترل شود.

اسهال را باید جدی تلقی کرد.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف ۲ لیوان کامل آب و وضعیت ایستاده یا نشسته بعد از خوردن دارو توصیه می‌شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## دروپریدول (DROPRIDOL)

نام تجاری: Inapsine

گروه دارویی: بوتیروفنون‌ها

گروه درمانی: ضدسایکوز

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضد سایکوز، ضدبیهوشی، ضد تهوع، در راستای اقدامات

تشخیص به منظور آماده سازی بیمار، آرام بخش، بی‌قراری شدید

⚠️ میزان مصرف: ۲/۵ تا ۱۰ میلی‌گرم قبل از بیهوشی عضلانی، در

پیشگیری از تهوع پس از عمل ۲/۵ تا ۵ میلی‌گرم به کار می‌رود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: اختلال تنفسی، فشار خون بالا، خواب آلودگی

شدید بعد از عمل

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت استفاده از داروهای مهار کننده

اعصاب مرکزی، میزان مصرف این دارو کاهش یابد.

آموزش بیمار - خانواده: تا چند ساعت بعد خواب آلودگی وجود دارد در

این مورد به همراه یا پرستار بیمار تذکر دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## یدید اکوتیوفات (ECHOTHIOPHATE IODIDE)

نام تجاری: Hospholine Iodide

گروه دارویی: مهار کننده های کولین استراز

گروه درمانی: ضد گلوکوم (آب سیاه چشم)

📌 شکل دارویی: قطره استریل چشمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: گلوکوم زاویه باز مزمن یا گلوکوم ناشی از عمل جراحی،

کاتاراکت (آب مروارید)، اقدامات تشخیصی چشم پزشکی (تشخیص

ازوتروپی تطابقی)

⚠️ میزان مصرف: روزانه یک قطره

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، اووئیت حاد، پارکینسون،

آسم، زخم معده

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، اختلال قلبی، تاری دید، تکرار ادرار، تهوع،

استفراغ، اسهال

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: - مصرف این دارو باید ۲ تا ۳ هفته قبل از

عمل قطع شود. حداکثر میزان استعمال دارو در چشم دو قطره روزانه در

بالغین است.

آموزش بیمار - خانواده: - در صورت استفاده طولانی مدت آن، بعد از

یک ماه دارو را برای چند روز قطع و سپس شروع کنید.

شرایط نگهداری: دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه مطلوب است.

## ادتیت کلسیم دی سدیم (EDETATE CALCIUM)

نام تجاری: Ledclair

گروه دارویی: شلات کننده‌ها

گروه درمانی: ضد مسمومیت با فلزات

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: مسمومیت با فلزات سنگین مثل سرب، کادمیم،

کرومیک، کبالت، مس، روی، منیزیوم، نیکل، تنگستن

میزان مصرف: ۷۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز وریدی یا

عضلانی در ۲ تا ۳ مرحله به مدت ۱ تا ۲ هفته

موارد منع مصرف: در نارسایی کلیه و حساسیت شدید دارو ممنوع

است.

عوارض جانبی مهم: نارسایی کلیه، نقرس، اختلال خونی، عوارض

پوستی، علائم درد عضلانی، تهوع، استفراغ

توجهات پزشکی - پرستاری: در محل تزریق عضلانی درد ایجاد

می‌شود.

ارجح است پرستار هنگام تزریق از مقداری پروکائین برای کاهش درد

استفاده کند.

تزریق سریع دارو خطرناک و فوق‌العاده کشنده است.

پزشک می‌بایست از قادر بودن بیمار به ادرار کردن مطمئن شود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار می‌بایست پیگیر آزمایش‌ها و کنترل

مرتب آنها باشد.

شرایط نگهداری: دمای معمولی مطلوب است.

## ادتیت دی کبالت (EDETATE DICOBALT)

نام تجاری: Kelocyanor

گروه دارویی: دفع کننده سیانید (شلات ها)

گروه درمانی: ضد مسمومیت با سیانید

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: مسمومیت با ترکیبات سیانیدی

⚠ میزان مصرف: ۳۰۰ میلی گرم وریدی طی یک دقیقه و تکرار آن در ۵ دقیقه بعد

موارد منع مصرف: فقط در موارد مسمومیت قطعی و شدید بهتر است به کار رود.

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، کاهش فشار خون، ضایعات پوستی، درد سینه، افزایش ضربان قلب

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در موارد خفیف بهتر است این دارو تجویز نشود.

آموزش بیمار - خانواده: مورد خاصی مطرح نیست.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## ادروفونیوم (EDROPHONIUM)

نام تجاری: Tensilon

گروه دارویی: مهار کننده کولین استراز

گروه درمانی: ضد مسمومیت (داروهای بلوک عصبی غیر دیپلاریزان)

📦 شکل دارویی: تزریقی (آمپول ۱۰ میلی گرمی)

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: برای تشخیص بیماری میاستنی گراویس و بررسی نتایج درمانی در میاستنی کاربرد دارد.

⚠️ میزان مصرف: ۲ میلی گرم در ابتدا تجویز وریدی سپس ۸ میلی گرم بقیه در صورت عدم پاسخ، تزریق می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، انسداد روده و حالب  
⚠️ عوارض جانبی مهم: ضعف عمومی، تهوع، استفراغ، درد و گرفتگی عضلانی، تشنج، اسهال، تنگی نفس

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: به علت خطر مسمومیت با آن، آتروپین سولفات باید آماده باشد.

این دارو سریع الاثر می باشد.

کودکان و سالمندان به این دارو حساسترند.

آموزش بیمار - خانواده: عوارض جانبی دارو گذرا است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## انالاپریل (ENALAPRIL)

نام تجاری: Vasotec

گروه دارویی: مهار کننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین

گروه درمانی: ضد فشار خون

📌 شکل دارویی: قرص ۵ و ۲۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان فشار خون خفیف تا شدید، نارسایی احتقانی قلب

و اختلال عملکرد کلیوی

⚠️ میزان مصرف: در شروع ۵ میلی گرم یک بار در روز و سپس قابل تنظیم است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، ضایعات جلدی، تهوع، اسهال، خستگی

عمومی، سرفه، مشکلات خونی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تست های خونی باید به صورت منظم تکرار شود.

آزمایش های اسیداوریک یا گلوکز خون و سلول های خونی تغییر می یابد.

علائم حیاتی بیمار کنترل شود.

سرفه خشک از جمله عوارض دارویی است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت علائم آزار دهنده، گلو درد و تب یا

تورم لب ها به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## انفلوران (ENFLURANE)

نام تجاری: Ethrane

گروه دارویی: گاز هالوژنه

گروه درمانی: گازها

⑤ شکل دارویی: گاز برای بیهوشی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در هنگام بیهوشی در اتاق عمل و بی‌حسی سرپایی

⚠ میزان مصرف: با غلظت ۰/۴٪ طی ۷ تا ۱۰ دقیقه بیهوشی القاء می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: عوارض جانبی هالوتان (صفحه ۳۴۶)، بی‌نظمی ریتم قلبی و تشنج

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: آسیب کبدی محتمل است.

تشنج ممکن است بروز کند.

آموزش بیمار - خانواده: آموزش‌های عوارض هالوتان کافی است.

شرایط نگهداری: تحت شرایط خاص در گازهای سنترال نگهداری شود.

## انوکساپرین (ENOXAPRIN)

نام تجاری: Lovenox

گروه دارویی: ضد انعقادی

گروه درمانی: آنتی ترومبوز

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: پیشگیری از ترومبوز (لخته) در وریدها و آمبولی ریه،

درمان ترومبوز ورید عمقی، آنژین قلبی ناپایدار

⚠️ میزان مصرف: ۳۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت زیر جلدی یا در جراحی های

دیگر ۴۰ میلی گرم یک بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: خونریزی، درد و قرمزی محل تزریق، تهوع،

خونمردگی، تب

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: ارجح است آزمایش های خونی و شمارش

تعداد پلاکت انجام شود. تزریق بهتر است به صورت زیر جلدی (SC)

باشد و در جدار شکم مناسب تر است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت کبودی، خونریزی، خارش و تب به

پزشک اطلاع دهید.

درد و قرمزی محل تزریق با کیسه یخ بهبود می یابد.

در مراجعات به دندانپزشکان به آنها اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.




## افدرین (EPHEDRINE)

نام تجاری: Efedvon

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: ضد آسم

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: باز کردن مجاری هوایی، درمان احتقان بینی، درمان علامتی آسم

⚠ میزان مصرف: یک قرص ۳ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، پورفیری، آریتمی قلبی، آب سیاه چشم، دردهای حاد قلبی

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، بی‌خوابی، تپش قلب، بی‌نظمی قلبی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مهمترین نشانه مسمومیت با افدرین بروز علائم تشنج است.

آموزش بیمار - خانواده: مایعات کافی بنوشید.

از مصرف خودسرانه میزان بالای دارو خودداری کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## اپی نفرین (EPINEPHRINE)

نام تجاری: Adernalin

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: بازکننده ریه، بالا برنده فشار خون

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ایست قلبی - در احیای قلب و ریه داروی بسیار حیاتی است و در موارد شوک ناشی از حساسیت دارویی (آنافیلاکسی) یا آسم و حملات ریوی در کودکان و جوانان بسیار مفید است.

میزان مصرف: میزان آن با غلظت  $\frac{1}{1000/000}$  یا  $\frac{1}{10/000}$  قابل استفاده و در آسم به صورت زیر جلدی با غلظت  $\frac{1}{1000}$  به میزان ۰/۱ تا ۰/۵ میلی گرم تزریق شود.

موارد منع مصرف: آسیب مغزی، بی نظمی قلب، نارسایی عروق و حساسیت‌های دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، تپش قلب، تهوع، افزایش فشار خون، سنکوپ

توجهات پزشکی - پرستاری: در تهیه غلظت آن طبق دستور عمل شود.

گاهی برای بی حسی موضعی از ترکیب اپی نفرین و لیدوکائین استفاده می‌شود. این کار را در انتهای اندام‌ها (دست و پا) نباید انجام داد. قلب و فشار خون بیمار را کنترل کنید.

آموزش بیمار-خانواده: افزایش تعداد ضربان قلب جزء عوارض دارویی است.

از مصرف خودسرانه به ویژه در سالمندی پرهیز کنید.

- در صورت احتمال حساسیت دارویی به ویژه آنتی بیوتیک، آن را آماده داشته باشید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

# ارگوتامین تارترات (ERGOTAMINE TARTRATE)

نام تجاری: Ergomar

گروه دارویی: آکالوئید مشتق ارگوت

گروه درمانی: ضد میگرن، ضد سردرد عروقی

📌 شکل دارویی: قرص زیر زبانی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان سردردهای عروقی (میگرن)

⚠️ میزان مصرف: یک قرص به صورت زیرزبانی و در صورت لزوم تکرار

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بیماری و نارسایی کبدی و

کلیوی، فشار خون بالا، سابقهٔ سکتهٔ قلبی، کم خونی شدید

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، خواب آلودگی، ضعف عمومی، ضعف

شدید، درد شکم، پارستری، تشنج

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت تهوع شدید از متوکلوپرامید

خوراکی یا تزریقی استفاده کنید.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف خودسرانه یا میزان بالای دارو ممنوع

است

نباید دارو جویده یا بلعیده شود.

در صورت ضعف عمومی و سردی انگشتان به پزشک اطلاع دهید.

استعمال همزمان سیگار خطرناک است.

هرگونه عفونت احتمالی را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## ارگوتامین سی (ERGOTAMINE-C)

نام تجاری: Ergo.caff

گروه دارویی: ترکیب آکالوئید + کافئین

گروه درمانی: ضد میگرن

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: حملات سردرد میگرنی یا سردردهای عروقی

میزان مصرف: یک قرص در آغاز حمله و تکرار آن هر نیم ساعت تا دفع علائم

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به ارگوت یا کافئین، نارسایی کبد و کلیه

عوارض جانبی مهم: بی‌خوابی، ضعف عمومی، لنگش اندام تحتانی، درد

قفسه سینه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکمی، ورم اندامها

توجهات پزشکی - پرستاری: تداخلات دارویی با پروپرانولول و قرص 

ضد حاملگی را در نظر داشته باشید. در صورت تهوع شدید به همراه دارو، آمپول ضد استفراغ تجویز کنید.

آموزش بیمار - خانواده: - این دارو باعث وابستگی فرد به دارو می‌شود فقط هفته‌ای ۲ بار در حملات سر درد استفاده شود.

قرص را در ابتدای حمله استفاده کنید.

از فعالیت یا قدم زدن در هوای سرد پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## اریترومایسین (ERYTHROMYCIN)

نام تجاری: Erythrocin

گروه دارویی: ماکرولیدها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

📌 شکل دارویی: قرص، آمپول، شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت دستگاه تنفس، گلو، گوش، عفونت ریوی، سیاه

سرفه، عفونت های لگنی، اورتریت غیر گونوکوکی، تب روماتیسمی

⚠️ میزان مصرف: یک قرص هر ۶ ساعت یا ۲ قرص هر ۱۲ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبدی

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، مشکلات شنوایی، کهیر،

مشکلات قلبی و کبدی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در حساسیت به گروه پنی سیلین ها،

اریترومایسین جانشین بسیار خوبی است.

آموزش بیمار - خانواده: به منظور کاهش عوارض گوارشی، دارو با غذا میل شود.

عوارض کبدی دارو طی چند هفته ظاهر می شود.

به همراه آن نباید آب میوه استفاده شود.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مناسب است.

## اریتروپوئیتین (ERYTHROPOIETIN)

نام تجاری: Epogen


گروه دارویی: هورمون‌های صنعتی

گروه درمانی: درمان کم خونی

شکل دارویی: تزریقی 


مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کم خونی ناشی از نارسایی مزمن کلیه، کم خونی در بیماری‌های HIV (ایدز) که تحت درمان با زیدوودین قرار گرفته‌اند یا بیماران دچار تومورهای بدخیم

 میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم سه بار در هفته به صورت وریدی یا زیر جلدی تجویز می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت مفرط نسبت به آلبومین انسانی

✖ عوارض جانبی مهم: خستگی، ضعف عمومی، اسهال، تهوع، استفراغ، عارضه پوستی، فشار خون، تشنج و علائم شبیه آنفلوآنزا

 توجهات پزشکی - پرستاری: مراقب باشید میزان هماتوکریت بیمار از ۳۶٪ بالاتر نرود.

احتمال بروز تشنج را به بیمار متذکر شوید.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز علائم تنگی نفس و سر درد یا فشار خون بالا به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای داخل یخچال (۲ تا ۸ درجه) نگهداری شود.

## اسمولول (ESMOLOL)

نام تجاری: Brevibloc

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده بتا ( $\beta$ )

گروه درمانی: ضد آریتمی قلبی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان آریتمی بطنی در تکیکاردی‌های بالای بطن  
میزان مصرف: میزان اولیه ۵۰۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم طی  
یک دقیقه وریدی و میزان نگهدارنده ۵۰۰ میکروگرم به ازای هر  
کیلوگرم به مدت ۴ دقیقه

موارد منع مصرف: در صورت بلوک قلبی درجه ۲ و ۳ و کمکاری تعداد  
ضربان قلب و نارسایی احتقانی قلب ممنوع است.

عوارض جانبی مهم: کاهش فشار خون، خستگی، عصبانیت، تعریق،  
گیجی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: قبل از تزریق رقیق شود.

قبل از تزریق داروی دیگری با آن مخلوط نشود.

آموزش بیمار - خانواده: - در صورت وجود برادیکاردی و سرگیجه  
شدید یا خواب آلودگی به پزشک مراجعه شود زیرا علامتی برای  
مسمومیت محسوب می‌شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## استرادیول والرات (ESRADIOL VALERATE)

نام تجاری: Delestrogen

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: استروژن (جایگزین)

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان علائم و نشانه‌های متوسط تا شدید عروقی و هورمونی ناشی از یائسگی یا کمبود استروژن ناشی از برداشتن تخمدان یا هیپوگنادیسم، سرطان پروستات

میزان مصرف: ۵/۰ تا ۲ میلی‌گرم یک بار در روز تا ۱ تا ۲ میلی‌گرم سه بار در روز (در بیماری‌های مختلف، متفاوت است)

موارد منع مصرف: در بیماران دچار سرطان‌های سینه، ترومبو فلیت، حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، سرگیجه، افسردگی، تغییر رنگ پوست، ریزش مو و درد شکمی، سرگیجه، کولیت، التهاب روده، التهاب واژن، مشکل ادراری و..

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو غلظت چربی خون را بالا می‌برد.

این دارو باعث احتباس مایعات در بدن می‌شود.

در افراد آسمی و بیماری عروق کرونر با احتیاط تجویز شود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار می‌بایست در پیگیری آزمایش‌ها با پزشک همکاری کند. دیابت بیمار می‌بایست کنترل شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## استراموستین (ESTRAMUSTINE)

نام تجاری: Estracyt

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: استرادیول و نیتروژن موستارد

شکل دارویی: کپسول

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: ضد سرطان پروستات و سرطان‌های متاستاتیک که به جاهای مختلف پخش شده‌اند.

حالت میزان مصرف: ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلی گرم به طور خوراکی که در ۲ تا ۳ بار در روز تقسیم می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید نسبت به استرادیول یا نیتروژن موستارد، ترومبوفلیت

عوارض جانبی مهم: بی‌خوابی، اضطراب، تهوع، زردی، تنگی نفس، بزرگی پستان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تست کبدی باید بررسی شود.

آموزش بیمار - خانواده: استفاده از دارو در مبتلایان به آبله مرغان و هرپس ممنوع است

شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود.

## اتاکرینیک اسید (ETHACRYNIC ACID)

نام تجاری: Ederin

گروه دارویی: دیورتیک‌های لوپ کلیه

گروه درمانی: ضد فشار خون، ضد هیپرکلسمی

شکل دارویی: قرص ۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: اِدم ناشی از نارسایی قلبی، اختلال کبدی و بیماری کلیوی

میزان مصرف: ۱ تا ۴ قرص در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و کسانی که قادر به ادرار کردن نیستند (آنورل)

عوارض جانبی مهم: خونریزی از معده - روده، کاهش پتاسیم و کلر در بدن، خستگی و ضعف، سردرد، مشکلات بینایی و شنوایی

توجهات پزشکی - پرستاری: میزان مایعات دریافتی و بدون برون ده ادراری را اندازه بگیرید. در صورت اسهال شدید، دارو را قطع کنید.

آموزش بیمار - خانواده: قندخون بیمار باید کنترل شود.

وزن بیمار باید اندازه گیری شود.

شرایط نگهداری: دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه مطلوب است.

## اتامبوتول (ETHAMBUTOL)

نام تجاری: Myambutol

گروه دارویی: داروهای ضد میکروبی

گروه درمانی: ضد سیل

شکل دارویی: قرص ۴۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: ضد بیماری سیل، بیماری ایدز و عفونت‌های جدی و شدید

میزان مصرف: ۱۵ تا ۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم یک بار در روز تا ۲ بار در هفته

موارد منع مصرف: حساسیت شدید و بیماران با ضایعه چشمی  
عوارض جانبی مهم: مشکلات عصب بینایی، تحریک اعصاب محیطی،  
زردی و احساس کرختی، راش، خارش، تب، کاهش گلبول سفید  
توجهات پزشکی - پرستاری: قبل از شروع دارو معاینات چشم پزشکی انجام شود.

عوارض چشمی طی ۱ تا ۷ ماه بعد از مصرف بروز می‌کند  
در افراد مبتلا به آب مروارید با احتیاط مصرف شود.  
آموزش بیمار - خانواده: بیمار به صورت دوره‌ای برای معاینات معرفی شود.

در افراد با نارسایی کلیه با احتیاط مصرف شود.  
شرایط نگهداری: دارو در محیط خشک و خنک نگهداری شود.

## اتر (ETHER)

گروه دارویی: اتر

گروه درمانی: بیهوش کننده‌ها

⑤ شکل دارویی: گاز استنشاقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در بیهوشی به عنوان داروی کمکی استفاده می‌شود.

⚠ میزان مصرف: بسته به وضعیت بیمار

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: به علت عوارض شدید مثل استفراغ و تشنج، بالا

رفتن قند خون و تحریک مجاری تنفسی امروزه کمتر استفاده می‌شود.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: امروزه گازهای هالوژن جایگزین اتر

شده‌اند.

آموزش بیمار - خانواده: - به گازهای بیهوشی مثل هالوتان (صفحه

۳۶۴) مراجعه شود.

این دارو باعث کاهش فشار خون و کاهش حجم ادرار می‌شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک، در دمای ۸ تا ۱۵ درجه

نگهداری شود.

## اتوسوکسیماید (ETHOSUXIMID)

نام تجاری: Zarontin

گروه دارویی: سوکسی نیمایدها

گروه درمانی: ضد صرع (ضد تشنج)

شکل دارویی: کپسول و شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: انواع صرع (پتیمال، آسانس و صرع میوکلونیک)

میزان مصرف: با یک کپسول ۲۵۰ میلی گرم دوبار در روز شروع و سپس به تدریج طی یک هفته به میزان آن اضافه می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، درد شکمی، یبوست، اختلالات

خونی، آنمی (کم خونی)

توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش های کبدی - کلیوی ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بی قراری، اختلال هشیاری، تهوع و استفراغ شدید به پزشک مراجعه شود زیرا این موارد نشانگر مسمومیت دارویی می باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## اتیدرونات (ETIDRONATE)

نام تجاری: Drionel

گروه دارویی: بیفسفونات‌ها

گروه درمانی: ضد هیپرکلسمی، ضد استئوپورز (پوکی استخوان)

شکل دارویی: قرص ۲۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: استئوپورز (پوکی استخوان) در یائسگی و پوکی استخوان

ناشی از استروئید (کورتون) و در درمان پوکی استخوان یائسگی

غلظت میزان مصرف: ۲ عدد قرص به مدت ۱۴ روز به دنبال آن کلسیم ۷۶

روز یک عدد روزانه، بیمار ۲/۵ ماه پس از خاتمه اتیدرونات دارو را قطع می‌کند و درمان مجدداً آغاز می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و استئومالاسی آشکار

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، تشنج، لوکوپنی، در

عضلات، سردرد، ضایعات پوستی، التهاب و تورم زبان، تومور و اختلال

عملکرد کبدی کلیه

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: - آزمایش‌های کبدی و کلیوی باید کنترل

شود.

در بیماری پاز، آلکالین فسفاتاز و هیدروکسی پرولین باید اندازه‌گیری

شود.

دارو را با آنتی اسید مصرف نکنید.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار را تشویق به استفاده از مواد غذایی  
کلسیم‌دار کنید.

در بیماری پاژه، ممکن است آثار درمانی طی چند ماه پس از شروع  
درمان ظاهر شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## اتومیدیت (ETOMIDATE)

نام تجاری: Amidate

گروه دارویی: خواب آورها

گروه درمانی: بیهوش کننده عمومی

📌 شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در بیهوشی عمومی

⚠️ میزان مصرف: ۰/۰۶ تا ۰/۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از راه وریدی طی یک دقیقه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، در خلال زایمان

⚠️ عوارض جانبی مهم: بالا یا پایین رفتن فشار خون، آریتمی قلبی، درد

محل تزریق، سکسکه، تهوع، استفراغ، خارش

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تداخلات دارویی آن با وراپامیل و آرام بخش‌های دیگر باید مدنظر باشد.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت سابقه حساسیت دارویی به پزشک اطلاع دهید.

استراحت بیمار پس از بیهوشی ضروری است.

شرایط نگهداری: در دمای ۳ تا ۱۵ درجه نگهداری شود.

## اتوپوساید (ETOPOSIDE)

نام تجاری: Etopophos

گروه دارویی: پودوفیلو توکسین

گروه درمانی: ضد سرطان

📌 شکل دارویی: کپسول و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان‌های بیضه و ریه

⚠️ میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن در

روز در سرطان بیضه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و نارسایی کلسیم یا کبد و

عفونت فعال ویروسی و باکتریایی

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، ریزش مو، اختلالات خونی، نوروپاتی

محیطی، احتمال درد محل تزریق، تندی ضربان قلب، درد شکم و تعریق

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: بسیاری از عوارض دارویی قابل برگشت است.

در صورت کاهش فشار خون، بیمار قبل از تزریق، مایعات دریافت کند.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت تهوع و استفراغ شدید به پزشک اطلاع دهید.

از تماس بیمار با افراد دچار بیماری ویروسی جلوگیری شود.

به علت زخم دهان، بهداشت دهان بیشتر رعایت شود.

شرایط نگهداری: نوع تزریقی در دمای معمولی اتاق نگهداری شود ولی

کپسول‌های آن در یخچال نگهداری شود (۲ تا ۸ درجه).

## اتریتینت (ETRETINATE)

نام تجاری: Tegison

گروه دارویی: رتینوئیدها

گروه درمانی: ضد پسوریازیس

📦 شکل دارویی: کپسول ۱۰ و ۲۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: پسوریازیس مقاوم

⚠️ میزان مصرف: ۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز و در انواع شدید میزان دارو افزایش یابد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، زنان حامله و کودکان

⚠️ عوارض جانبی مهم: درد شکم، تهوع، خارش، خشکی بینی، پوسته ریزی، افزایش حساسیت به نور، هپاتیت، اختلالات چشمی، سرگیجه، اضطراب، عفونت گوش، تب، خشکی دهان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: نباید همزمان داروی حاوی الکل یا ترکیبات ضد عرق را تجویز نمود. اثر پلاسمایی افزایش تری گلیسیرید در این دارو افزایش می یابد.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه مشکلات بینایی در حین درمان پزشک اطلاع داده شود.

به بیمار آموزش دهید دارو را با غذا و شیر (چرب) مصرف کند.

بیمار نباید در طول درمان و چند سال پس از آن خون اهداء کند.

به علت اختلال در چشم، از رانندگی اجتناب شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## اکسپکتورانت (EXPECTORANT)

گروه دارویی: اکسپکتورانت

گروه درمانی: خلط آورها

📌 شکل دارویی: شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان سرفه و تسهیل تخلیه خلط از ریه و دفع ترشحات مجاری تنفسی سرماخوردگی

⚠️ میزان مصرف: ۵ تا ۱۰ سی سی ۳-۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، تهوع، استفراغ

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: بهتر است دارو ۴ بار در روز استفاده شود.

نوع کدئینه دارو خاصیت خواب آلودگی بیشتری دارد.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار بهتر است برای تخلیه خلط، سرفه کند.

دارو را با یک لیوان آب مصرف کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## فاکتور نه (FACTOR IX)

نام تجاری: Alphanine SD

گروه دارویی: فاکتورهای انعقاد خون

گروه درمانی: ضد هموفیلی (B)

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضد خونریزی، جلوگیری از خونریزی ناشی از هموفیلی

B یا بیماری کریسمس، قبل از اعمال جراحی یا کنترل خونریزی در حین

و بعد از عمل، پیشگیری از کنترل خونریزی در هموفیلی (A)

میزان مصرف: سرعت و میزان بر اساس نوع بیماری و شدت خونریزی

و سطح فاکتور متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، گرگرفتگی، تغییر تعداد ضربان قلب، کپیر،

تب و لرز و ترومبوز وریدی

توجهات پزشکی - پرستاری: سرعت تجویز متفاوت است ولی ۳ میلی 

لیتر در هر دقیقه معمول است. تاحل شدن کامل پودر به آرامی محفظه

را تکان دهید.

احتمال لخته شدن خون و ترومبوز در عروق وجود دارد.

آموزش بیمار - خانواده: - در صورت بروز کاهش فشار خون یا درد

قفسه سینه به پزشک اطلاع دهید

از مصرف آسپرین به طور همزمان خودداری شود.

از آسیب به مفاصل جلوگیری شود.  
 شرایط نگهداری: در یخچال نگهداری شود.  
 ☑ نکته: هموفیلی B بیماری ارثی است که باعث کمبود فاکتور IX (نه) و باعث خونریزی می‌شود.



## فاکتور هفت (FACTOR VII)

گروه دارویی: فاکتورهای انعقاد خون

گروه درمانی: ضد خونریزی

📌 شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: درمان خونریزی در هموفیلی A و B (این فاکتور وابسته به ویتامین K است)

🕒 میزان مصرف: ۹۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم هر ۲ ساعت تا زمان بندآمدن خونریزی

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: خونریزی، تب، واکنش حساسیت شدید، سردرد،

فشار خون بالا، درد محل تزریق، ضایعات پوستی و نارسایی کلیه

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های انعقادی را ارزیابی کنید.

دارو را با یک سر سوزن استریل جدید پس از پونکسیون به صورت وریدی و طی ۲ تا ۵ دقیقه به آهستگی تزریق کنید.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه علائم دال بر حساسیت مثل کهیر و تغییر فشار خون را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در یخچال نگهداری شود.

## فاموتیدین (FAMOTIDINE)

نام تجاری: Pesid

گروه دارویی: مهار کننده و گیرنده  $H_2$

گروه درمانی: ضد زخم معده

📦 شکل دارویی: قرص ۲۰ و ۴۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: زخم معده و روده، جلوگیری از عود زخم و جلوگیری از برگشت مواد غذایی یا اسید از معده به مری

⚖️ میزان مصرف: در زخم معده، شبانه یک عدد قرص ۴۰ میلی گرمی به مدت ۱ تا ۲ ماه استفاده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: اسهال، سرگیجه، ضایعات پوستی، بزرگ شدن پستان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: کارکرد کلیه باید کنترل شود.

دارو را بهتر است به همراه غذا یا مایع تجویز کنید.

آموزش بیمار - خانواده: برای ظهور آثار درمانی چند روز وقت لازم دارید.

بهتر است همراه آنتی اسید مصرف نشود. در هنگام مصرف از رانندگی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## فیبا (FEIBA)

نام تجاری: Autoplex

گروه دارویی: کنسانتره فاکتور (فاکتور فشرده و خالص)

گروه درمانی: فاکتور ضد خونریزی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضد خونریزی

میزان مصرف: ۷۵ واحد به ازای هر کیلو گرم از راه وریدی و تکرار آن

طی ۶ تا ۱۲ ساعت

موارد منع مصرف: در صورت بیماری انعقاد منتشر داخل عروقی DIC و

سابقه ترومبوا مبولی

عوارض جانبی مهم: کاهش فشار خون، له شدگی، بافت‌ها و عضلات و

سر درد

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو در بالغین و اطفال کاربرد دارد.

در صورت کاهش فشار خون ادامه تجویز دارو باید متوقف شود.

آموزش بیمار - خانواده: احتمال راه یافتن دارو به داخل شیر کم است.

احتمال گرگرفتگی وجود دارد.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## فن فلورامین (FENFLURAMINE)

نام تجاری: Pondimin

گروه دارویی: مشتقات آمفتامین‌ها

گروه درمانی: ضد اشتها

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: به عنوان ضد اشتها و مبارزه با چاقی

میزان مصرف: ۲۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز قبل از غذا

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: گر گرفتگی، سردرد، مشکل گوارشی، اسهال، تعریق،

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: احتمال افسردگی وجود دارد.

امکان بروز اختلالات بینایی وجود دارد.

آموزش بیمار - خانواده: میزان دارو را خودسرانه افزایش ندهید و در

حین مصرف رانندگی نکنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## فلبامات (FELBAMATE)

نام تجاری: Taloxa

گروه دارویی: دی کاربامات

گروه درمانی: ضد تشنج

📦 شکل دارویی: قرص ۴۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: این دارو به دلیل عوارض جدی فقط در موارد خاص تشنج‌های مقاوم کاربرد دارد.

⚠️ میزان مصرف: اگر کنترل تشنج بیمار، تک دارویی باشد یک قرص تا ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، اختلالات خونی، نارسایی کبدی  
⚠️ عوارض جانبی مهم: عوارض شایع آن سردرد، بی‌خوابی، استفراغ و عوارض نادر آن کم‌خونی و نارسایی حاد کبدی، رفتار تهاجمی و عوارض شدید گوارشی و چشمی می‌باشد.

⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: انجام آزمایش‌های خونی ضروری است.

از مصرف همزمان داروهای اعصاب مرکزی جلوگیری کنید.

الکترولیت‌های خون را اندازه‌گیری کنید.

آموزش بیمار-خانواده: علائم مسمومیت‌ها را به بیمار گوشزد کنید

(ناراحتی گوارشی و زیادی تعداد ضربان قلب)

وزن بیمار کنترل شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## فنتانیل (FENTANYL)

نام تجاری: Sublimaze

گروه دارویی: مشتقات فنیل پیریدین

گروه درمانی: ضد درد و کمک بیهوشی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: قبل از بیهوشی

⚠ میزان مصرف: متفاوت است ولی ۵۰ تا ۱۰۰ میکروگرم عضلانی نیم

ساعت قبل از بیهوشی، در بیهوشی موضعی و عمومی نیز کاربرد دارد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و بیماری میاستنی گراویس

⚠ عوارض جانبی مهم: توقف تنفسی، سفتی عضلانی و کاهش ضربان قلب

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مراقبت از تنفس در پایان عمل باید

صورت گیرد.

آموزش بیمار - خانواده: مورد خاصی وجود ندارد ولی پس از ۳ تا ۵ روز

مصرف دارو احتمال وابستگی دارویی وجود دارد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## فروس سولفات (FERROUS SULFAT)

نام تجاری: Fer-in-sol

گروه دارویی: ترکیب آهن

گروه درمانی: ضد کم خونی

شکل دارویی: قرص و شربت و قطره

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: به عنوان مکمل غذایی، خونساز و کم خونی فقر آهن  
میزان مصرف: در درمان کم خونی فقر آهن یک قرص ۲ تا ۴ بار در روز و برای پیشگیری یک قرص روزانه استفاده شود.

موارد منع مصرف: هموکروماتوزیس و هموسیدروز، زخم حاد معده، بیماری کرون

عوارض جانبی مهم: دل درد، بی‌اشتهایی، اسهال

توجهات پزشکی - پرستاری: ویتامین C جذب آهن را افزایش می‌دهد.

این دارو در کم خونی طی حاملگی کاربرد وسیع دارد.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است قرص را با آب میوه یا شربت معده میل کنید.

مصرف همزمان آهن با تخم‌مرغ، قهوه یا چای جذب آن را کاهش می‌دهد.

برای جلوگیری از تغییر رنگ دندانها، شربت را با نی مصرف کنید.

میزان اندک دارو (چند تا قرص) هم می‌تواند باعث مسمومیت در کودکان شود.

برای جلوگیری از یبوست، با غذا بیشتر سبزی مصرف کنید.  
شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## فیبرینوژن (FIBRINOGEN)

نام تجاری: Fibrinogen human

گروه دارویی: مشتقات خونی

گروه درمانی: عامل انعقاد خون

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: برای کنترل خونریزی، در خونریزی ناشی از DIC یا جدا شدن زودرس جفت در حاملگی و پس از جراحی قلب و ریه به کار می‌رود.

میزان مصرف: ۳ تا ۸ گرم فیبرینوژن با سرعت ۵ تا ۱۰ میلی‌لیتر در دقیقه انفوزیون شود.

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

عوارض جانبی مهم: گزارش نشده است.

توجهات پزشکی - پرستاری: اغلب در خونریزی‌ها استفاده پلاسما ارجح است.

آموزش بیمار - خانواده: آموزش خاصی ندارد.

شرایط نگهداری: در یخچال نگهداری شود.

## فیبرینولیزین (موضعی) (FIBRINOLYSIN)

نام تجاری: Plasmin

گروه دارویی: آنزیم‌ها

گروه درمانی: تمیز کننده موضعی زخم‌ها

⊗ شکل دارویی: پماد موضعی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در سوختگی و در درمان زخم‌ها

⚠️ مقدار مصرف: روزی ۲ تا ۳ بار روی موضع مالیده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: مشکلات موضعی و التهاب یا واکنش بافتی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این پماد باعث تمیز شدن زخم و

پاکسازی بافت‌های مرده زخم‌ها و سوختگی‌ها می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: مورد خاصی وجود ندارد.

شرایط نگهداری: در محل خشک و خنک نگهداری شود.




## فیناستراید (FINASTERIDE)

نام تجاری: Proscar

گروه دارویی: آزاستروئید

گروه درمانی: مهار کننده‌های آندروژنی

شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH)، آلوپسی

(طاسی مردانه)، درمان هیرسوتیسم زنان

نکته میزان مصرف: یک قرص روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: کاهش میل جنسی، ضایعات جلدی، تورم پستان

و...

⚠ توجهات پزشکی-پرستاری: برای درمان رشد خوش خیم پروستات

یک سال وقت لازم است.

برای بیمار دارای BPH، تست‌های پروستات از نظر بدخیمی انجام شود.

وضعیت کلیه از نظر وجود سنگ یا انسداد مطالعه شود.

آموزش بیمار-خانواده: اگر بیمار دارو را قطع کند ریزش مو (مردانه)

دوباره طی یک سال آغاز می‌شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## فلوکونازول (FLUCONAZOLE)

نام تجاری: Diflucan

گروه دارویی: تری آزول

گروه درمانی: ضد قارچ

شکل دارویی: کپسول، قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: علیه قارچ دهانی - حلقی مثل کاندیدیاز، در مری و

مننژیت کریبتوکوکی و سایر عفونت‌های عمومی و عفونت واژن

میزان مصرف: ۲۰۰ میلی گرم در ابتدا و ۱۰۰ میلی گرم روزانه، تا ۴۰۰

میلی گرم روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و حاملگی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، عوارض کبدی و حساسیت

جلدی - مخاطی نسبت به دارو، سوزش و درد معده

توجهات پزشکی - پرستاری: انجام تست‌های کبدی ضروری است.

تست قند خون در کسانی که همراه این دارو سولفونیل اوره‌آ مصرف

می‌کنند مهم است.

این دارو با ترفنادین و سیساپراید تداخل اثر دارد.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز زردی یا ضعف شدید به

پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مطلوب است.

## فلوسیتوزین (FLUCYTOSINE)

نام تجاری: Alcobon

گروه دارویی: پیریمیدین

گروه درمانی: ضد قارچ

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان عفونت‌های قارچی (کاندیدا، اسپورتریکوز، کریبتوکوکوزیس)

⚠ میزان مصرف: به میزان ۵۰ تا ۱۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن هر ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیه

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، دل درد، اسهال و اثر بسیار مهم روی مغز استخوان و روده‌ها

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: برای شروع درمان از نوع عفونت مطمئن شوید.

تست‌های کبدی را به صورت منظم تکرار کنید.

در صورت تب، قرمزی پوست، خارش و کاهش فشار به پزشک اطلاع دهید.

آموزش بیمار - خانواده: طول مدت درمان حداقل یک ماه می‌باشد.

اگر بیمار یک وعده دارو را فراموش کرد در هر زمان که یادش بیاید آن را تکرار کند مگر آن‌که فاصله زیادی با وعده بعدی نداشته باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق و دور از نور نگهداری شود.

## فلودارابین (FLUDARABINE)

نام تجاری: Beneflur

گروه دارویی: ویدارابین‌ها

گروه درمانی: ضد سرطان

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان‌های CLL، لنفوم غیر هوچکینی و لوسمی

Hairy cell و هوچکین

⚠ میزان مصرف: ۲۵ میلی‌گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن طی ۳۰

دقیقه از راه وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، حاملگی، شیردهی

⚠ عوارض جانبی مهم: کم خونی، خونریزی، نارسایی کلیه، درد قفسه سینه

و ضایعات پوستی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کلیوی انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت استفراغ شدید به پزشک اطلاع

دهید.

بیماری که واکسن و ویروس زنده دریافت کرده است نباید با این بیمار در

تماس باشد.


شرایط نگهداری: در یخچال و دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود.

## فلودروکورتیزون (FLUDROCORTISONE)

نام تجاری: Florinef

گروه دارویی: کورتیکو استروئید

گروه درمانی: جایگزین منیرا لوکورتیکوئید

شکل دارویی: قرص ۰/۱ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: نارسایی مزمن غده فوق کلیه و بیماری آدرنوژیتال و

کاهش فشار خون وابسته به وضعیت

میزان مصرف: یک قرص در شبانه روز 

موارد منع مصرف: در افراد مبتلا به عفونت‌های میکروبی قارچی و

حساسیت شدید دارویی ممنوع است.

عوارض جانبی مهم: نارسایی قلبی، افزایش تورم در اندام‌ها (ادم)

محیطی)، فشار خون

توجهات پزشکی - پرستاری: آب و الکترولیت بیمار کنترل شود. 

فشار خون بیمار کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه تورم شدید اندام‌ها را به پزشک اطلاع

دهید.

این دارو باعث دفع پتاسیم می‌شود.

وزن بیمار در مصرف طولانی مدت این دارو افزایش می‌یابد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## فلومازنیل (FLUMAZENIL)

نام تجاری: Anexate

گروه دارویی: گروه بنزودیازپین‌های (ایمیدازو)

گروه درمانی: ضد بنزودیازپین‌ها

📌 شکل دارویی: تزریقی ۰/۵ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان مسمومیت با بنزودیازپین‌ها (ضد دیازپام) و در آنسفالوپاتی کبدی مفید است.

📏 میزان مصرف: ۰/۲ میلی گرم وریدی و تکرار در طول یک دقیقه بعد (میزان معمول ۰/۶ تا ۱ میلی گرم).

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، مسمومیت با داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، تشنج، بی‌نظمی ریتم قلب، لرزش دست و پا، خواب‌آلودگی، اختلال بینایی، خستگی، ضایعات پوستی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: بیمار می‌بایست از نظر عملکرد کبدی بررسی شود.

محل تزریق ممکن است دردناک باشد.

در زمان مصرف ممکن است تشنج رخ دهد، امکانات لازم را آماده نمایید.

آموزش بیمار - خانواده: بعد از دریافت دارو، از رانندگی اجتناب کنید.  
از مصرف داروهای اعصاب و روان یا الکل بعد از فلومازنیل خودداری  
شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## فلوئوسینولون (FLUOCINOLONE)

نام تجاری: Fluonex

گروه دارویی: گلوکوکورتیکوئید

گروه درمانی: کورتون (ضد التهاب موضعی)

📌 شکل دارویی: کرم و پماد موضعی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب خفیف پوستی، ضایعات خارش دار پوست

🕒 میزان مصرف: ۲ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: عفونت‌های قارچی و میکروبی پوست

⚠️ عوارض جانبی مهم: عارضه خاصی ندارد.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: به بتامتازون (صفحه ۱۰۰) مراجعه شود.

آموزش بیمار - خانواده: به بتامتازون مراجعه شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## فلورسئین (FLUORESCEIN)

نام تجاری: Fluorests

گروه دارویی: گزانتین اسید دی‌بازیک

گروه درمانی: داروهای تشخیص چشم پزشکی

📦 شکل دارویی: نواری شکل

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تشخیص آب سطحی در قرنیه، اجسام خارجی در قرنیه

و ملتحمه و عوارض ناشی از آلودگی ویروس تب‌خال، اندازه‌گیری تخلیه

و وضعیت اشکی چشم، برای جاگذاری لنزهای سخت تماس

⚠️ میزان مصرف: مقدار کمی از نوار

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: تغییر رنگ ظاهری چشم

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این نوار با سرم فیزیولوژی مرطوب

می‌شود و پس از بی‌حسی اولیه در چشم توسط یک قطره چشمی در

محل قرار می‌گیرد و ارزیابی می‌گردد.

آموزش بیمار - خانواده: مورد خاصی ندارد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.

## فلوراید (FLUORIDE)

نام تجاری: Duraphat

گروه دارویی: مواد معدنی

گروه درمانی: پیشگیری از پوسیدگی دندان

شکل دارویی: قرص، محلول دهانه شویه، قطره و ژل

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: پیشگیری از پوسیدگی دندان به ویژه در آب آشامیدنی، مناطقی که فلوراید آن کمتر از  $(0.7 \text{ ppm})$  باشد. در درمان پوکی استخوان هم کاربرد دارد.

میزان مصرف: در سنین مختلف متفاوت است و به میزان غلظت فلوراید در آب آشامیدنی بستگی دارد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، ناراحتی گوارشی، ضایعات جلدی و تغییر رنگ دندان در زمان استفاده از دهان شویه

توجهات پزشکی - پرستاری: توصیه نمایید بیمار به صورت همزمان از مصرف لبنیات خودداری کند.

آموزش بیمار - خانواده: - در بالغین میزان ۵ تا ۱۰ میلی گرم باعث مسمومیت می شود که با تشنج یا آریتمی قلبی همراه است، اسهال شدید، مدفوع قیری رنگ، خواب آلودگی شدید و درد شدید شکمی از علائم مسمومیت است.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود. این دارو حتماً در ظروف در بسته نگهداری شود.

## فلوکستین (FLUOXETINE)

نام تجاری: Prozac

گروه دارویی: مهار کننده جذب سروتونین

گروه درمانی: ضد افسردگی، ضد وسواس

شکل دارویی: کپسول، شربت، قرص ۲۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در افسردگی، پرخوری عصبی، اختلالات خلقی قبل از قاعدگی و حملات ترس

میزان مصرف: با یک کپسول ۲۰ میلی گرمی شروع و بعد از ۳ هفته می توان میزان آن را زیاد کرد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیه و کبد و در بیماران با تشنج با احتیاط استفاده شود.

عوارض جانبی مهم: اضطراب، بی خوابی، اسهال، تهوع، تمایل به خودکشی، اختلال عملکرد کلیوی، تحریک پذیری، راش پوستی، اختلال جنسی، درد عضله و مفصل

توجهات پزشکی - پرستاری: تست های کلیوی در حین درمان انجام شود.

بیمار را به صورت هفتگی وزن کنید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را صبح ها استفاده کنید.

احتمال کاهش قند خون وجود دارد، آزمایش قند بدهید.

به بیماران تشنجی تذکر دهید که ممکن است عارضه تکرار شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## فلوپنتیکسول (FLUPENTIXOL)

نام تجاری: Fluanxol

گروه دارویی: تیوگزانتین

گروه درمانی: ضد سایکوز (حالات شدید روانی)

⑤ شکل دارویی: تزریقی، قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان سایکوز، درمان کم خونی مگالوبلاستیک، ضد  
صرع (تشنج)

⚖️ میزان مصرف: یک میلی گرم خوراکی ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بیماران بی قرار، کانفوزیون  
(خواب آلودگی)

⚠️ عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، هیپوتانسیون، مرگ ناگهانی، فشار  
خون بالا، اسپاسم حنجره، اختلالات خونی، یرقان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تاریخچه ابتلا به بیماری ها را بررسی  
کنید.

در صورت امکان تست های کلیوی را انجام دهید.

علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.

آموزش بیمار - خانواده: با توجه به خواب آلودگی از رانندگی پرهیز  
شود.

احتمال بروز کاهش فشار خون وضعیتی وجود دارد به بیمار تذکر بدهید  
که به طور ناگهانی از حالت خوابیده نایستد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## فلوفنازین (FLUPHENAZIN)

نام تجاری: Modecate

گروه دارویی: فنوتیازین

گروه درمانی: ضد سایکوز (اختلالات شدید روانی)

⑤ شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اختلالات روانی، اضطراب شدید

⑥ میزان مصرف: یک تا ۴ قرص در روز یا در اضطراب ۱ میلی گرم دو بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و افسردگی شدید

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، کاهش فشار خون، ضعف عمومی، خواب آلودگی، عوارض کبدی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: پس از کنترل علائم، از فرم تزریقی می توان استفاده کرد.

احتمال خطر تشنج وجود دارد.

در صورت تب و علائم عفونی به پزشک اطلاع دهید.

آزمایش های خونی ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرید. مایعات کافی استفاده کنید.

بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید.

گاهی رنگ ادرار یا پوست بدن زرد قهوه ای می شود.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## فلوراز پام (FLURAZEPAM)

نام تجاری: Dalmane

گروه دارویی: بنزودیازپین

گروه درمانی: آرام بخش

شکل دارویی: کپسول 

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: بی خوابی، اضطراب

میزان مصرف: یک تا ۲ کپسول در زمان خواب

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، در پورفیری حاد، توقف

تنفسی در خواب

عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی شدید، سردرد، سرگیجه، افسردگی،

تورم، اختلال بینایی، تهوع و استفراغ

توجهات پزشکی - پرستاری: - این دارو وابستگی و عادت را به همراه

دارد.

کنترل شمارش سلول های خونی باید انجام گیرد.

عملکرد کلیه و کبد باید تست شوند.

آموزش بیمار - خانواده: در زمان مصرف از انجام کارهای دقیق

خودداری شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک و دمای معمولی نگهداری شود.

## فلوتامید (FLUTAMIDE)

نام تجاری: Eluexin

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: ضد نئوپلاسم - ضد هیرسوتیسم (پرمویی)

شکل دارویی: قرص ۲۵۰ میلی‌گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: کارسینوم پروستات، پرمویی غیر طبیعی (هیرسوتیسم)

میزان مصرف: هر ۸ ساعت یک قرص یعنی ۷۵۰ میلی‌گرم در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اختلال جنسی، همولیز، سردرد،

بی‌قراری، ترشح شیر از پستان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: احتمال خونریزی همیشه وجود دارد.

غلظت اسید اوریک خون باید سنجیده شود.

از تماس بیمار با بیماران دچار ویروس آبله مرغان و هرپس جلوگیری شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت کبودی اندام‌ها به پزشک اطلاع دهید.

مایعات بیشتری نوشیده شود.

شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۴ درجه نگهداری شود.

## فلوواستاتین (FLUVASTATIN)

نام تجاری: Lescol

گروه دارویی: مهار کننده آنزیم

گروه درمانی: ضد چربی

Ⓢ شکل دارویی: کپسول ۲۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: بالا بودن چربی خون (هیپرکلسترولمی)

Ⓢ میزان مصرف: یک تا ۲ قرص یک بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: سردرد، ضایعات پوستی، اسهال، تهوع، دل درد،

سرفه، سینوزیت، ضعف عمومی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی به طور دوره‌ای انجام

شود. بهتر است دارو را شب قبل از خواب مصرف کنید.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو را می‌توان با غذا مصرف کرد. در حین

حاملگی دارو را مصرف نکنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## اسید فولیک (FOLIC ACID)

نام تجاری: Folvite

گروه دارویی: ویتامین ها

گروه درمانی: اسید فولیک (VB6)

📦 شکل دارویی: قرص ۱ میلی گرمی و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: کمبود اسید فولیک، درمان کم خونی

⚠️ میزان مصرف: در درمان یک قرص روزانه و در پیشگیری ۰/۲

میلی گرم در روز مفید است

موارد منع مصرف: به جز حساسیت شدید مورد خاصی ندارد.

☠️ عوارض جانبی مهم: ضایعات تنفسی و پوستی بروز می کند ولی نادرند.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو در آنمی مگالوبلاستیک باید

همیشه همراه با ویتامین ب ۱۲ باشد.

این دارو در زنان حامله و سالمندان بسیار مفید است.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را خودسرانه استفاده نکنید.

در صورت احتمال حساسیت به پزشک اطلاع دهید.


شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## فسفسترول (FOSFESTROL)

نام تجاری: Honvan

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: ضد سرطان

شکل دارویی: تزریقی و قرص ۱۰۰ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان سرطان پستان، جانشین استروژن

میزان مصرف: ۲۴۰ میلی گرم سه بار در روز به مدت یک هفته و طی ۲

هفته با میزان ۱۲۰ تا ۳۶۰ میلی گرم در روز

موارد منع مصرف: سرطان پستان، بیماری عروق کرونر قلبی،

سرطان‌های تخمدان

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اشکالات گوارشی، بی‌اشتهایی،

ضعف عمومی

توجهات پزشکی - پرستاری: بیمار را تحت کنترل نوار قلبی قرار دهید. 

احتمال بروز ژنیکوماستی را به بیمار تذکر دهید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را با غذا مصرف کنید.

حساسیت به نور در بیمار افزایش می‌یابد.

شرایط نگهداری: دارو در دمای معمولی نگهداری شود.

## فورازولیدون (FURAZOLIDONE)

نام تجاری: Furoxone

گروه دارویی: نیتروفوران

گروه درمانی: ضد باکتری، ضد اسهال

شکل دارویی: قرص، شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اسهال ناشی از عوامل باکتریال و پروتوزوئری، اسهال ناشی از ژiardیا، اسهال مسافرتی، سالمونلوز (آلودگی با میکروب سالمونلا)

میزان مصرف: ۱۰۰ میلی گرم ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی و مصرف همزمان با غذاهای حاوی تیرامین و آمین‌های سمپاتومیمیتیک

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، دل درد، اسهال، خارش و ضایعات پوستی

توجهات پزشکی - پرستاری: جلوی دهیدراتاسیون بیمار را باید گرفت. تغییرات فشار خون در این افراد شایع است.

آموزش بیمار - خانواده: افت قند خون به صورت ضعف عمومی و غش بروز می‌کند.

مصرف همزمان شکلات با دارو می‌تواند با تشدید عوارض همراه باشد. شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق

تذکر: مصرف غذاهای حاوی تیرامین (باقلا، پنیر غیر پاستوریزه، آبجو، جگر مرغ و محصولات تخمیر شده) همزمان با داروی فوق ممنوع است.

## فورسماید (FUROSEMIDE)

نام تجاری: Lasix

گروه دارویی: دیورتیک

گروه درمانی: ضد فشار خون

⑤ شکل دارویی: قرص، تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کنترل فشار خون، نارسایی مزمن کلیوی، سیروز کبدی، نارسایی احتقانی قلب

Ⓐ میزان مصرف:  $\frac{1}{4}$  تا یک قرص روزانه استفاده می‌شود.

در ادم ریوی شدید به صورت وریدی با یک آمپول شروع و اثر آن بررسی می‌شود. در فشار خون حداکثر میزان مصرف ۶۰۰ میلی‌گرم در روز است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و افرادی که امکان ادرار کردن ندارند (آنوری دارند).

Ⓜ عوارض جانبی مهم: سردرد، سرگیجه، تاری دید، دل درد، اسهال، بی‌اشتهایی، اختلال الکترولیت‌ها، زردی، ضایعات پوستی، مشکلات خونی و نارسایی کبد

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو ادرار آورقوی سریع الاثر است.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار باید توزین شود.

در صورت تهوع یا استفراغ شدید به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: به دور از نور و در دمای اتاق نگهداری شود.

## اسید فوسیدیک (FUSIDIC ACID)

گروه دارویی: استروئید - ضد باکتری

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کرم موضعی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان عفونت‌ها و التهاب پوستی

میزان مصرف: روزانه ۲ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: زیر جلدی و در ناحیه‌ای که پوست ندارد و عضلات در معرض است ممنوع است.

عوارض جانبی مهم: در تجویز خوراکی تهوع و استفراغ بروز می‌کند.

تجویز وریدی این ترکیب در محل تزریق و اسپاسم وریدی دیده می‌شود.

توجهات پزشکی - پرستاری: در نوع خوراکی ضایعات کبدی بروز می‌کند.

آموزش بیمار - خانواده: مسئله خاصی وجود ندارد.

شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود.

## گاباپنتین (GABAPENTIN)

نام تجاری: Neurontin

گروه دارویی: آنالوگ گابا GABA

گروه درمانی: ضد تشنج (صرع)

شکل دارویی: کپسول ۱۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در صرع پارشیل یا تشنج جنرالیزه (عمومی)

میزان مصرف: ۱/۵ قرص هنگام خواب، و به تدریج ۳۰۰ میلی گرم

دو بار در روز و ۳۰۰ میلی گرم سه بار در روز، در روز سوم تجویز می شود.

ولی میزان متوسط ۳ تا ۶ قرص در طول روز استفاده می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، خواب آلودگی، تهوع، استفراغ، گیجی، درد

عضلانی، مشکلات چشمی، اختلال خلقی، سرفه و تپش قلب

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: - عملکرد کلیه باید تست شود.

دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود.

پزشک می بایست نتیجه درمان را بررسی کند.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو با آنتی اسیدها نباید مصرف شود.

فاصله نوبت این دارو نباید بیش از ۱۲ ساعت باشد.

شرایط نگهداری: نگهداری در دمای معمولی مناسب است.

## گانسیکلوویر (GANCICLOVIR)

نام تجاری: Gytoven

گروه دارویی: مشابه آسیکلوویر (صفحه ۲۹)

گروه درمانی: ضد ویروس

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت چشمی با سیتومگال ویروس (CMV) - در ایدز و پنومونی، اسنفالیت نوع خاص با ضعف ایمنی کاربرد دارد.

میزان مصرف: ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن، به صورت وریدی استفاده می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی به ویژه به آسیکلوویر یا گانسیکلوویر

عوارض جانبی مهم: عوارض خونی، کاهش تعداد پلاکت خون، تمایل خونریزی

مشکلات کلیوی، تنگی نفس، کهیر، تهوع و ضایعات جلدی

درد عضلات، بی حالی، ضعف، افت فشار خون

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو عوارض مهمی دارد از جمله آنها

کاهش گلبولهای سفید خون و پلاکت

تست های کلیوی به صورت منظم انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار مایعات کافی استفاده کند.

امکان حاملگی را باید از بین برد (روش مطمئن برای جلوگیری از

بارداری استفاده شود).

عوارض شدید بی‌قراری، توهم و اختلالات بینایی را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.




## جیم فیبروزیل (GEMFIBROZIL)

نام تجاری: Lopid

گروه دارویی: فیبرات‌ها

گروه درمانی: ضد چربی خون

شکل دارویی: کپسول و قرص 


مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان افزایش چربی خون، کلسترول خون و پیشگیری از بیماری ایسکمیک قلبی

میزان مصرف: تا ۱/۲ گرم یعنی ۶ کپسول روزانه یا ۳ قرص روزانه توصیه شده است.

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی، اختلال کارکرد کبد و کلیه و نارسایی کبدی

عوارض جانبی مهم: درد شکم، اسهال، سردرد، تشنج، خارش، ریزش مو، یرقان، تورم گلو، حنجره، درد و ضعف عضلانی

توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش‌های کبدی و خونی هر چند ماه یک بار انجام شود. 

آموزش بیمار - خانواده: در صورت اسهال شدید به پزشک اطلاع دهید. از عوارض این دارو اختلال چشایی نیز می‌باشد. شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.

## جنتامایسین (GENTAMICIN)

نام تجاری: Garamycin

گروه دارویی: آمینو گلیکوزید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

📌 شکل دارویی: تزریقی ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت‌های گرم منفی و برخی از گونه‌های استاف زخم جراحی، عفونت اداری، عفونت ناحیه لگن

📏 میزان مصرف: ۳ تا ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: عوارض کلیوی که بسیار خطرناک است، مشکلات شنوایی، ضعف عمومی تشنج، عوارض پوستی، خارش، زخم دهان، راش، کهیر

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در اختلال عملکرد کلیه میزان آن کاهش یابد یا تنظیم شود.

اسهال و خارش جلدی را جدی بگیرید

آموزش بیمار - خانواده: - داروها را طبق دستور استفاده کنید و عوارض جدی را اطلاع دهید

در نوع موضعی جنتامایسین، بیمار نباید در معرض نور باشد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

تذکر: نوع موضعی و چشمی را در عفونت‌های پوست، زخم و سوختگی می‌توان به کار برد.

## ژستونورون (GESTONORONE)

نام تجاری: Depostate

گروه دارویی: پروژستین

گروه درمانی: ضد سرطان

📦 شکل دارویی: تزریقی ۲۰۰ میلی گرم در هر میلی لیتر

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: سرطان‌های رحم (اندومتر) و هیپرپلازی خوش خیم پروستات

🕒 میزان مصرف: ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم هر ۵ تا ۷ روز عضلانی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، آمبولی ریه، زردی، ضایعات جلدی، میگرن،

سردرد، ترشح شیر، پرمویی، طاسی و تب دارویی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو می‌تواند عوارض کبدی ایجاد کند.

اختلال عملکرد کلیوی نیز باید مدنظر باشد.

آموزش بیمار - خانواده: طبق دستور عمل شود.

تا سه ماه بعد از قطع دارو حاملگی صورت نگیرد.

شرایط نگهداری: در دمای طبیعی اتاق نگهداری شود.

## گلابین کلامید (GLIBENCLAMID)

نام تجاری: Daonil

گروه دارویی: مشتقات سولفونیل اوره آ

گروه درمانی: ضد دیابت

Ⓢ شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان دیابت قندی تیپ B یا بزرگسالی

⚖️ میزان مصرف: ۱ تا ۶ قرص یک بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، حاملگی و وضعیت کتو

اسیدوز دیابتی از موارد ممنوعیت است.

⚠️ عوارض جانبی مهم: سرگیجه، سردرد، بی خوابی، اضطراب، افسردگی،

عوارض خونی، کاهش قند خون، ضایعات پوستی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: قند خون بیمار دقیقاً کنترل شود.

رژیم های خاص به بیمار داده شود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار همواره کارت یا نسخه پزشک مبنی بر

اینکه دچار بیماری قند است را در جیب یا کیف خود داشته باشد.

بیمار در صورت بروز ضعف شدید یا تعریق یا کرخ شدن دست و پا به

پزشک اطلاع دهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## گلوکاگون (GLUCAGON)

نام تجاری: Glucagon

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: ضد هیپوگلیسمی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: کاهش شدید قند خون به ویژه ناشی از مصرف انسولین و موارد تشخیصی

میزان مصرف: ۰/۵ تا ۱ میلی گرم از راه زیر جلدی، عضلانی یا وریدی، یک ساعت بعد از کوما

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سرگیجه، تهوع، استفراغ، ضایعات جلدی، برونکواسپاسم

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با داروهای ضد انعقاد خوراکی تداخل دارویی دارد.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز هرگونه عوارض جدی به ویژه اسپاسم راه‌هوایی به پزشک اطلاع دهید.

در صورت اسهال و استفراغ، مسمومیت مطرح می‌شود. شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## گلو تار آل دئید (GLUTARAL DEHYDE)

نام تجاری: Cidex

گروه دارویی: ضد میکروب و قارچ

گروه درمانی: ضد عفونی کننده

📌 شکل دارویی: محلول

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: برای ضد عفونی کردن وسایل دندانپزشکی، تجهیزات

لاستیکی اتاق عمل و وسایل آرتروسکوپی

⚠️ میزان مصرف: به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه اجسام در آن بمانند ولی برای

استریل کامل اشیا و ابزار ۱۰ ساعت وقت لازم است.

موارد منع مصرف: با مخاط چشم تماس نداشته باشد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: آسم و عوارض پوستی و زخم و التهاب پوست به

ویژه در غلظت‌های بالا ایجاد می‌شود.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت آلودگی شدید پوست با آن،

پوست را با آب فراوان و صابون بشوید.

- وسایل، قبل از استفاده به خوبی با سرم شسته شوند.

آموزش بیمار - خانواده: بخارات آن باعث تحریک دستگاه تنفس

می‌گردد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## گونادورلین (GONADORELIN)

نام تجاری: Factrel

گروه دارویی: هورمون‌های (ساختگی)

گروه درمانی: هورمون‌ها

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان عقیمی و کم کاری هیپوفیز، عدم قاعدگی

(آمنوره)، تشخیص کم کاری غدد جنسی

⚠️ میزان مصرف: برای تست تشخیصی تاخیر در بلوغ، ۵ میکروگرم هر ۹۰ دقیقه تست انجام می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید به دارو، افراد دچار کیست تخمدان و آدنوم هیپوفیز

⚠️ عوارض جانبی مهم: حاملگی‌های چندقلو، تهوع، استفراغ، دل درد،

تغییرات پوستی، تپش قلب، حساسیت شدید دارویی (یا آنافیلاکسی)

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با آندروژن، استروژن، پروژستین و ضدبارداری خوراکی و دیگوکسین نباید همزمان مصرف شوند.

آموزش بیمار - خانواده: حاملگی چندقلویی محتمل است.

محل تزریق آمپول را مرتباً تعویض کنید.

دوره درمان را کامل کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## گرانی استرون (GRANISETRON)

نام تجاری: Kytril

گروه دارویی: داروهای هورمونی

گروه درمانی: ضد تهوع و ضد استفراغ

شکل دارویی: تزریقی، قرص

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در استفراغ‌های شدید ناشی از شیمی درمانی سرطان‌ها

میزان مصرف: ۱۰ تا ۲۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم نیم تا یک

ساعت قبل از شیمی درمانی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، دل درد، ضعف عمومی، بی‌خوابی و

بی‌قراری، عوارض کبدی و کلیوی

توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت استفاده مستقیم بدون رقیق

سازی طی ۳۰ ثانیه تزریق شود.

تست‌های عملکرد کبدی به طور منظم انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده:

سردرد را با مسکن خفیف درمان کنید.

ممکن است در حین مصرف و دوره درمان بیمار تب کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

این دارو آنتاگونیست گیرنده 5HT<sub>3</sub> است.



## گریزوفولوین (GRISEOFULVIN)

نام تجاری: Grisovin

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلیوم

گروه درمانی: ضد قارچ

📌 شکل دارویی: قرص ۱۲۵ میلی‌گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت قارچی، عفونت‌های درماتوفیتی پوست و مو  
⚠️ میزان مصرف: ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت و مدت درمان مختلف است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبدی، بیمار  
لوپوس اریتماتوز، پورفیری

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، عوارض عمومی مثل خستگی، بی‌خوابی،  
تهوع و استفراغ، درد شکم، اسهال، برفک دهان  
⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های خونی - کلیوی - کبدی انجام  
شود.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف غذای چرب، جذب را افزایش می‌دهد  
از مصرف الکل در طی درمان خودداری شود.  
در صورت کهیر و خارش جلدی به پزشک اطلاع دهید.  
شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## گایافنزین (GUAIFENESIN)

نام تجاری: Amonidrin

گروه دارویی: اکسپکتورانت

گروه درمانی: خلط آور

شکل دارویی: شربت ۱۰۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: سرفه های خشک یا درمان کمکی در فازنژیت،

برونشیت، سینوزیت

میزان مصرف: یک قاشق (۵cc) هر ۴ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، ناراحتی معده، گیجی، ضایعات پوستی

توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت تب و لرز و علائم عفونی علت را درمان کنید.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است به همراه شربت یک لیوان آب مصرف کنید.

تهوع و استفراغ شدید علامت مسمومیت است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و جای خشک نگهداری شود.

## گوانیتیدین (GUANETIDINE)

نام تجاری: Ismelin

گروه دارویی: بلوک کننده آدرنرژیک

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص و تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون اولیه بالا و فشار خون ناشی از بیماری کلیوی

و تنگی شریان کلیوی

میزان مصرف: یک قرص (۱۰ میلی گرمی) روزانه

موارد منع مصرف: در حساسیت شدید دارویی، نارسایی احتقانی قلب،

بیماران مبتلا به فتوکرومویستوما منع مصرف دارد.

✖ عوارض جانبی مهم: اسهال، استفراغ، مشکلات چشمی، کاهش فشار

خون، تورم اندام‌ها، علائم آسم، افزایش وزن، ضایعات پوستی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با هالوپریدول، فتوتیازین و ضد

افسردگی‌ها تداخل اثر دارد.

استفاده از دیورتیک برای کاهش ادم عمومی تجویز می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز علائم بالا به پزشک اطلاع

دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## هالوپریدول (HALOPERIDOL)

نام تجاری: Haldol

گروه دارویی: بوتیروفنون ها

گروه درمانی: ضد سایکوز (اختلالات شدید روانی)

📦 شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اختلالات سایکوز در نوع حاد و مزمن، در اضطراب شدید در بیماری اوتیسم اطفال، در استفراغ های شدید و در دیستونی اندام ها

📏 میزان مصرف: ۱ تا ۵ قرص ۰/۵ میلی گرم حداکثر ۱۰۰ میلی گرم روزانه  
موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی ممنوع است ولی در بیماران دو قطبی باعث افسردگی می شود.

⚠️ عوارض جانبی مهم: خشکی دهان، خواب آوری، تشنج، آریتمی قلبی  
⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: تزریق هالوپریدول باید به صورت عمقی و با سوزن شماره ۲۱ انجام شود (فقط به صورت عضلانی تزریق شود).  
آموزش بیمار-خانواده: همانند کلر پرومازین (صفحه ۱۷۹) عمل شود.  
شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.

## هالوتان (HALOTHANE)

نام تجاری: Fluothane

گروه دارویی: بیهوش کننده ها - مشتق اتان

گروه درمانی: بیهوش کننده

📌 شکل دارویی: گاز برای استنشاق

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیهوشی عمومی، القاء و نگهداری بیهوشی عمومی،

کاهش درد زایمان های طبیعی، بی حسی سرپایی

📌 میزان مصرف: معمولاً با غلظت ۲ تا ۴ درصد از هالوتان در اکسیژن یا

N2O - اکسیژن انجام می شود.

موارد منع مصرف: به علت حساسیت دارویی به ویژه در کسانی که

استعداد هیپرترمی بدخیم دارند، ممنوع است.

⚠️ عوارض جانبی مهم: مهمترین مشکل هیپرترمی بدخیم است ولی

اختلالات کلیوی کبدی ممکن است بروز کند، درد عضلانی، کاهش

فشار خون و اختلال تنفسی از جمله عوارض دارو می باشد.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: ضعف عملکرد قلبی از جمله عوارضی

است که باید مراقبت شود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار باید اطلاعات دارویی و پزشکی خود را

برای ثبت در تاریخچه به پزشک ارائه نماید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## هماتینیک (HEMATINIC)

نام تجاری: Autrin

گروه دارویی: داروهای ترکیبی

گروه درمانی: خونساز

شکل دارویی: کپسول

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: پیشگیری و درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن، سوء تغذیه در حاملگی

میزان مصرف: روزانه یک کپسول همراه غذا استفاده شود.

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

عوارض جانبی مهم: دل درد، تهوع، سوزش معده و استفراغ

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو شامل ویتامین B12 و فرپس سولفات و ویتامین C و فولیک اسید می باشد.

میزان آهن آن از قرص فروس سولفات بیشتر است.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است کپسول همراه غذا میل شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک و دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## هپارین سدیم (HEPARIN)

نام تجاری: Liquaemin

گروه دارویی: موکوپلی ساکارید

گروه درمانی: ضد انعقاد

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پروفیلاکسی (پیشگیری) و درمان لخته‌های وریدهای عمقی به ویژه اندام تحتانی، درمان آنژین قلبی ناپایدار و درمان کمکی در انفارکتوس میوکارد، تشخیص و درمان انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC)

میزان مصرف: در پیشگیری با میزان پایین دارو همراه است ۳۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، در حملات مغزی ۳ تا ۵ هزار واحد وریدی و به دنبال آن ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد در هر ساعت

موارد منع مصرف: خونریزی شدید، کاهش تعداد پلاکت، در هموفیلی یا بیماری کبد ممنوع است.

عوارض جانبی مهم: خونریزی، درد خفیف، تب، خارش

توجهات پزشکی - پرستاری: در مسمومیت شدید، خونریزی علامت بارزی است معمولاً با قطع دارو بهبود می‌یابد.

در صورت عدم بهبودی از داروی پروتامین سولفات استفاده کنید.

تزریق وریدی هپارین بر نوع زیر جلدی یا عضلانی ارجح است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت خونریزی یا ضایعات جلدی (پوست) به پزشک اطلاع دهید.

در صورت فراموشی یک وعده دارو، از میزان ۲ برابر آن در وعده بعدی  
پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.





## هیدرالاژین (HYDRALAZINE)

نام تجاری: Apresoline

گروه دارویی: گشاد کننده عروق

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون بالا، نارسایی احتقانی قلب، نارسایی شدید دریچهٔ آئورت قلب

میزان مصرف: هر ۶ ساعت یک قرص ۱۰ میلی گرمی، این میزان قابل افزایش است ولی در نارسایی قلبی از ۴۰ تا ۳۰۰ میلی گرم ۲ تا ۴ بار در دروز قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بیماری کرونر و رماتیسم دریچهٔ میترال قلب

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، سردرد، درد عضلانی، کهیر، خارش، اشکال تنفسی، اختلالات خونی، درد مفاصل

توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت کاهش فشار خون شدید و سردی اندام‌ها به فکر مسمومیت دارویی باشید.

نوع وریدی را به آهستگی تزریق کنید.

آموزش بیمار - خانواده: قرص را با غذا میل کنید.

به علت کاهش فشار خون بیمار نباید از حالت درازکش به طور ناگهانی بایستد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

# هیدروکلروتیازید (HYDRO CHLOROTHIAZID)

نام تجاری: Esidrex

گروه دارویی: دیورتیک

گروه درمانی: ضد فشار خون، ضد سنگ سازی در کلیه‌ها

⑤ شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان فشار خون، اختلالات کبدی، نارسایی کلیه، ادم

عمومی، قبل از قاعدگی

⑥ میزان مصرف: نصف تا یک قرص کامل و در صورت نیاز به میزان ۲

قرص در روز قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، عدم توانایی بیمار در ادرار

کردن (آنوری)

⊗ عوارض جانبی مهم: زردی، از دست رفتن آب بدن، نارسایی کلیه،

ترومبوسیتوپنی، اگرانولوسیتوز، کاهش میل جنسی، ضایعات جلدی، پر

ادراری - شب ادراری

① توجهات پزشکی - پرستاری: وزن و فشار خون بیمار مرتب کنترل

شود.

تهوع، استفراغ شدید و ضعف عمومی و تشنج احتمال مسمومیت را

مطرح می‌کند.

آموزش بیمار - خانواده: دارو باعث کاهش فشار خون می‌شود، تغییر

وضعیت را در نظر بگیرید.

بیمار مستعد آسیب به نور می‌شود.  
دارو با غذا میل شود.  
شرایط نگهداری: دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.



## هیدروکورتیزون (HYDROCORTISONE)

نام تجاری: Cortef

گروه دارویی: استروئید

گروه درمانی: ضدالتهاب، ضد آلرژی

Ⓢ شکل دارویی: قرص، تزریقی، شیاف

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضد التهاب و سرکوب کننده ایمنی، آسم، تزریق داخل مفصلی

⚠️ میزان مصرف: ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت عضلانی یا وریدی در التهاب شدید

موارد منع مصرف: در حساسیت های شدید و عفونت های قارچی  
✖️ عوارض جانبی مهم: زخم گوارشی (معدة و روده)، بی خوابی، تشنج، عوارض قلبی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: نوع استات آن در تزریق داخل مفصلی مفید است.

آموزش بیمار - خانواده: وزن بیمار و میزان الکترولیت ها کنترل شود.  
این دارو نباید به صورت زیر جلدی تزریق شود.  
قطع ناگهانی دارو خطرناک است.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## هیدروکینون (HYDROQUINONE)

نام تجاری: Eldoqin

گروه دارویی: مهار سنتز ملانین

گروه درمانی: ضد کک و مک

شکل دارویی: پودر 

مصرف در حاملگی: مطالعه نشده است.

موارد مصرف: برای درمان کک و مک و لک موضعی و کلواسمای حاملگی، ملاسما و لکه‌های تیره و قهوه‌ای ناشی از نور آفتاب در صورت (تغییر رنگ پوست صورت)

غلظت معمولی آن ۲٪ می‌باشد.

موارد منع مصرف: در اطراف چشم، مناطق سوختگی ناشی از نور آفتاب، تحریکات پوستی و در کودکان کمتر از ۱۲ سال

عوارض جانبی مهم: سوزش و حساسیت موضعی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو در برابر نور یا هوا تیره می‌شود.

بنابراین به بیمار توصیه می‌شود یا از نور آفتاب پرهیز کند یا اینکه در عصر و شب دارو را مورد استفاده قرار دهد.

آموزش بیمار - خانواده: برای استفاده مناسب ابتدا روی پوست ناحیه ساعد به اندازه یک سکه تست شود.

شرایط نگهداری: دارو پودری سفید رنگ است، دور از نور نگهداری شود.


# هیدروکسی کلروکین سولفات

## (HYDROXY CHOLOROQUIN SULFATE)

نام تجاری: Plaquenil

گروه دارویی: کلروکین

گروه درمانی: ضد مالاریا و ضد روماتیسم

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در درمان و پیشگیری انواع مالاریا و روماتیسم مفصلی،  
لوپوس اریتماتو

میزان مصرف: برای پیشگیری ۴۰۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت  
یک هفته و برای درمان ۴ قرص یک بار در روز و پس از ۶ ساعت ۲  
قرص و در روز دوم و سوم ۲ قرص یک بار در روز تجویز می شود. در  
رماتیسم ۲ تا ۳ عدد قرص همراه با آب یا غذا

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، نارسایی کبدی، پورفیری  
✘ عوارض جانبی مهم: ضایعات چشمی و مشکلات گوارشی از اهمیت  
جدی برخوردار است.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: معاینات دوره ای چشم پزشکی ضروری  
است. آزمایش های و تست های کبدی و کلیوی مورد نیاز است.  
آموزش بیمار - خانواده: در صورت اختلال قدرت بینایی (چشمی) و  
شنوایی و ضعف عضلانی به پزشک اطلاع دهید.  
بیمار از نوشیدن الکل خودداری کند.  
بهتر است دارو همراه غذا باشد

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## هیدروکسی اوره آ (HYDROXYUREA)

نام تجاری: Hydrea

گروه دارویی: آنتی متابولیت

گروه درمانی: ضد نئوپلاسم

📦 شکل دارویی: کپسول ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان‌های بدخیم خونی (CLL)، ملانوم بدخیم،

سرطان عود کننده تخمدان، سرطان‌های سر و گردن

⚠️ میزان مصرف: برای تومور جامد ۸۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم

موارد منع مصرف: تعداد گلبول سفید کمتر از ۲۵۰۰ در هر میلی متر

مکعب یا پلاکت کمتر از صد هزار و کم خونی شدید و حاملگی

⚠️ عوارض جانبی مهم: عوارض خونی (شامل کاهش تعداد پلاکت‌های خونی)

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: برای قضاوت از نظر اثربخشی دارو ۶ هفته وقت لازم است.

برای بیمار می‌بایست در حین درمان مایعات کافی تجویز کرد.

قبل از درمان می‌بایست کم خونی بیمار جبران شود.

آموزش بیمار - خانواده: - بیمار لازم است از تماس با بیماران ویروسی اجتناب کند.

در صورت هرگونه کبودی به پزشک اطلاع دهید.

در صورت استفراغ مکرر پزشک را مطلع کنید.

شرایط نگهداری: در دمای طبیعی نگهداری شود.

## هیدروکسی زین (HYDROXYZINE)

نام تجاری: Atarax

گروه دارویی: پی‌پرازین‌ها

گروه درمانی: ضد حساسیت، ضد خارش

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: خارش، حساسیت‌های آلرژیک، کهیر مزمن، آرام بخش

میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم ۴ بار در روز خوراکی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، حملات آسم، در بیماران

افسرده

عوارض جانبی مهم: آرام بخش، خواب آلودگی، خشکی دهان، سرگیجه،

تهوع

توجهات پزشکی - پرستاری: - نواحی مناسب برای تزریق عضلانی، در

کودکان باسن و عضلات خارجی ران می‌باشد.

از شدت خواب آلودگی به تدریج کاسته می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: از رانندگی و کارهای دقیق پرهیز شود.

شرایط نگهداری: در دمای طبیعی اتاق نگهداری شود.



## هیوسین (HYOSCINE)

نام تجاری: Buscopan

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک

گروه درمانی: ضد اسپاسم

شکل دارویی: قرص، شیاف، تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان کمکی در زخم معده، اسهال، درد اسپاسمی، زخم روده بزرگ، در بیماری حرکت، ضد استفراغ، بی اختیاری ادراری و درد قاعدگی

میزان مصرف: ۲ قرص ۴ بار در روز در دردهای ماهانه زنان (قاعدگی) از ۲ روز قبل از قاعدگی شروع و ۳ روز بعد از آن ادامه یابد.

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: خشکی دهان، از جمله عوارض است.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو به کاهش درد شکمی و علامتی بیماران به ویژه اسهال کمک می کند.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف خودسرانه دارو می تواند خطرناک باشد. در دردهای شکمی مداوم بدون مجوز پزشک مصرف نشود.

در اسهال خونی و عفونی نباید استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## ایبوپروفن (IBUPROFEN)

نام تجاری: Advil

گروه دارویی: اسید پروپیونیک

گروه درمانی: ضد التهاب، ضد درد

شکل دارویی: قرص و محلول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: دردهای عمومی، قلب، بیماری‌های رماتیسمی، درد قاعدگی

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص هر ۴ تا ۶ ساعت

موارد منع مصرف: در فشار خون بالا، ناراحتی کلیوی، حساسیت شدید دارویی و زخم فعال معده

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، دل درد، خونریزی دستگاه گوارش

توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت درمان دراز مدت آزمایش‌های کبدی کلیوی لازم است.

گزارش مدفوع قیری رنگ به نفع خونریزی گوارشی است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت سرگیجه، اختلال هشیاری و خواب‌آلودگی شدید به پزشک اطلاع دهید.

بهتر است دارو یک ساعت قبل یا بعد از غذا استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## آیدوکسوریدین (IDOXURIDINE)

نام تجاری: Herplex

گروه دارویی: پیریمیدین هالوزنه

گروه درمانی: ضد ویروس

شکل دارویی: قطره چشمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ابتلا و آلودگی به ویروس چشمی (کراتیت هرپسی)،

ویروس تب خال

میزان مصرف: ۱ قطره هر ساعت طی روز و هر ۲ ساعت یک قطره در

طول شب

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، همزمان با کورتونها

ممنوع است.

عوارض جانبی مهم: خارش و التهاب موضعی، ترس از نور و تاری دید

توجهات پزشکی - پرستاری: دوره درمان بیمار ۳ هفته است آن را

کامل طی کنید.

آموزش بیمار - خانواده: حساسیت به نور در چشم مبتلا افزایش

می یابد.

دست را با رعایت شرایط بهداشتی قبل و بعد از مصرف با آب و صابون

بشوید

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## ایفوزامید (IFOSAMIDE)

نام تجاری: Ifex

گروه دارویی: نیتروژن موستارد

گروه درمانی: ضد سرطان

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: ضد سرطان‌های بیضه، ریه، تخمدان، پستان، معده و ضایعات بدخیم خونی

میزان مصرف: ۱/۲ گرم به ازای هر متر مربع سطح بدن در روز به مدت پنج روز متوالی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، ضایعات کبدی و کلیوی  
عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، کچلی، ناراحتی قلبی، ضایعات کلیوی و کبدی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: انجام تست‌های کبدی کلیوی و خونی در حین درمان ضروری است.

این دارو برای مثانه اثر سمی دارد بنابراین به بیمار دستور دهید زود به زود ادرار کند و در مثانه ادرار باقی نماند.

آموزش بیمار - خانواده: مراجعه به پزشک برای درمان مطلوب و جلوگیری از عوارض احتمالی و دادن تست‌های لازم ضروری است.  
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## ایمی پنم (IMIPENEM)

نام تجاری: Primaxin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک (واجد بتالاکتام)

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: پودر برای تزریق

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان عفونت‌های ریوی، عفونت‌های ادراری، استخوانی، ضایعات پوستی، عفونت زنان و زایمان، آلودگی میکروبی کلیه‌ها یا دریچه‌های قلبی

میزان مصرف: برای تزریق عضلانی حداکثر ۱۵۰۰ میلی‌گرم در ۲۴ ساعت و در نوع وریدی نباید بیش از ۵۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، شوک یا بلوک قلبی  
عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، تشنج، عوارض خونی، کاهش شنوایی، کاهش فشار خون، لرزش دست، سردرد، خارش و کهیر  
⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: احتمال واکنش حساسیت شدید با تشنج را در حین تزریق مدنظر قرار دهید.

تزریق وریدی دارو در اطفال دچار عفونت مغزی (مننژیت) ممنوع است. آموزش بیمار - خانواده: - تاریخچه حساسیت‌های دارویی خود را به اطلاع پزشک برسانید.

مصرف داروی ضد تشنج در بیماران با سابقه تشنج ضروری است. شرایط نگهداری: درجای خشک نگهداری شود.

## ایمی پرامین (IMIPRAMINE HCL)

نام تجاری: Tofranil

گروه دارویی: ضد افسردگی سه حلقه‌ای - دی‌بنزازپین

گروه درمانی: ضد افسردگی

شکل دارویی: قرص، تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D و C

موارد مصرف: افسردگی، شب‌ادراری اطفال، دردهای مزمن، پرخوری

(بولیمای اضطرابی) و آسیب‌های روانی پس از ضربه (PTSD) مثل

حوادث عمومی: جنگ، زلزله، سوگ عزیزان

میزان مصرف: در افسردگی، با یک قرص ۲۵ میلی‌گرمی شروع و

حداکثر میزان مجاز ۲۰۰ میلی‌گرم ادامه می‌یابد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، اطفال، سکته قلبی حاد و

مصرف کنندگان داروی مهار کننده MAO

عوارض جانبی مهم: خشکی دهان، خواب‌آلودگی، یبوست، تاری دید

توجهات پزشکی - پرستاری: پزشک باید به یاد داشته باشد این دارو با

داروهای ضد سایکوز و الکل و داروهای ضد فشار خون تداخل دارویی

دارد.

داروها نباید به طور ناگهانی قطع شوند.

کنترل منظم فشار خون و تست‌های کبدی کلیوی ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: بهتراست دارو با غذا مصرف شود.

از رانندگی و کارهای دقیق در طول روز اجتناب شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.

## ایندومتاسین (INDOMETHACIN)

نام تجاری: Indocid

گروه دارویی: اسید استیک (ضد درد غیر استروئید).

گروه درمانی: ضد درد، ضد التهاب

شکل دارویی: قرص، کپسول، شیاف

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در درمان دردهای خفیف تا متوسط، تب، ضد التهاب در

بیماری‌های التهابی و رماتیسمی، در آتروز، تورم مفاصل

میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۵۰ میلی‌گرم روزانه که در چند وعده تجویز می‌شود.

موارد منع مصرف: خونریزی حاد گوارشی، آسم و حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، سرگیجه، سبکی سر، خونریزی معده، عوارض کلیوی، زردی، مشکلات خونی

توجهات پزشکی - پرستاری: بیماران ممکن است دچار زردی شوند و ادرار آنها سبز شود که می‌بایست دارو را قطع کرد و تست‌های کبدی انجام داد.

آموزش بیمار - خانواده: - آزمایش‌های کنترل عملکرد کبدی و کلیوی انجام شود.

دارو با غذا یا با شیر یا شربت آلومینیوم میل شود. قرص را نباید جوید.

این دارو در زمان دردهای قاعدگی استفاده می‌شود. شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## انسولین (INSULIN)

نام تجاری: Iletin

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: ضد دیابت (قندی)

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: کنترل دیابت قندی، کتواسیدوز دیابتی، دیابت ناشی از حاملگی

میزان مصرف: طبق دستور متخصص عمل می‌شود. البته ۵/۰ تا ۱ واحد به ازای هر کیلوگرم در روز معمول است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و پایین بودن قند از موارد ممنوعیت محسوب می‌شود.

عوارض جانبی مهم: کاهش قند خون، تورم، قرمزی، درد محل تزریق، ضایعات جلدی آتروفی (لاغری) در محل تزریق، شوک و حساسیت شدید

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تنها انسولین رگولار یک ساعت قبل از غذا است

هرگاه دو انسولین رگولار و NPH را با هم دیگر می‌خواهید تزریق کنید. همیشه ابتدا انسولین رگولار را به داخل سرنگ بکشید.

آموزش بیمار - خانواده: بهترین زمان تزریق انسولین رگولار یک ساعت قبل از غذا است.

سطح قند خون را با دستگاه‌های خانگی اندازه‌گیری کنید.



بیمار می‌بایست برای کنترل قندخون رژیم را نیز رعایت کند.  
شرایط نگهداری: انسولین را در درجه حرارت اتاق می‌توان تا یک ماه  
نگهداری کرد. دارو نباید در معرض نور خورشید یا حرارت قرار گیرد.  
دمای مناسب ۵ تا ۳۸ درجه است.

## اینترفرون‌ها (INTERFERONES)

نام تجاری: Intron A

گروه دارویی: پروتئین‌های نوترکیب

گروه درمانی: ضد سرطان و ضد هپاتیت

شکل دارویی: تزریقی ۳ میلیون واحد در هر میلی‌لیتر - ۴/۵ میلیون واحد در هر میلی‌لیتر

مصرف در حاملگی: گروه D و C

موارد مصرف: سرطان‌های خون (لوسمی، سارکوم کاپوسی، هپاتیت مزمن)

میزان مصرف: انواع مختلف دارد که نوع بتا، آلفا ۲، آ، بتا ۱ و... دارد. در بیماری‌ها و سنین مختلف، متفاوت است.

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: بیماری شبیه آنفلوآنزا از جمله عوارض آن است، بی‌حسی، گیجی، بی‌قراری، افسردگی، پر خوابی، فلج اندام‌ها، اختلالات ادراری

توجهات پزشکی - پرستاری: تجویز آن فقط با پزشک با تجربه می‌باشد.

تب، عارضه‌ای شایع برای دارو نمی‌باشد.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه کبودی باید به اطلاع پزشک برسد.

این دارو باعث عوارض تراتوژنیک در جنین می‌شود.

شرایط نگهداری: دارو و حلال آن در یخچال نگهداری شود.

## یدوکینول (IDOQUINOL)

نام تجاری: Yodoxin

گروه دارویی: کینولین

گروه درمانی: ضد آمیب روده‌ای

شکل دارویی: قرص ۲۱۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آلودگی به آمیب‌های روده‌ای

میزان مصرف: ۳ قرص، ۳ بار در روز به مدت ۳ هفته

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، ضعف عمومی، خارش مقعد، کهیر،

بی‌اشتهایی، سرگیجه و عوارض عصبی

توجهات پزشکی - پرستاری: در بیماران کبدی و کلیوی با احتیاط

مصرف شود.

تاری دید و کاهش بینایی را به پزشک اطلاع دهید.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو بعد از غذا مصرف شود.

در صورت هرگونه تغییر ادراری به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## ایپکاک (IPECAC)

نام تجاری: Ipeca

گروه دارویی: الکالوئید

گروه درمانی: استفراغ آور

شکل دارویی: شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ایجاد استفراغ در مسمومیت حاد و گاهی به عنوان داروی خلط آور استفاده می شود.

میزان مصرف: ۱۵ تا ۳۰ سی سی خوراکی

موارد منع مصرف: در موارد فقدان هوشیاری مثل کوما و شوک و تشنج و مسمومیت با الکل ممنوع است.

در درمان مسمومیت با نفت نیز ممنوع است.

⚠ عوارض جانبی مهم: استفراغ های خونی، انفارکتوس قلبی (سکته)، بی نظمی ریتم قلبی، پنومونی، اسهال و...

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: از تجویز دارو در افراد غیر هشیار خودداری شود.

- طی ۱۵ تا ۳۰ دقیقه اثر استفراغ آور دارو بروز می کند.

آموزش بیمار - خانواده: دارو باید به دستور پزشک مصرف شود. زمان موثر بودن بعد از مسمومیت حداکثر ۶ ساعت پس از مسمومیت است

- در صورتی که استفراغ شدید شود و تداوم داشته باشد، به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۲۵ درجه نگهداری شود.

## ایزو کربوکسازید (ISOCARBOXAZID)

نام تجاری: Marplan

گروه دارویی: مهار کننده منوآمین اکسیداز

گروه درمانی: ضد افسردگی

شکل دارویی: قرص ۱۰ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: افسردگی و در کودکان بیش فعال بی توجه (ADHD) و

بیماری وسواس و اختلالات پانیک، دردهای مزمن و میگرن

غلظت میزان مصرف: در افسردگی یک قرص در روز و در طول یک هفته به

۳ قرص روزانه افزایش می یابد.

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی شدید، نارسایی قلبی، کودکان و

سالمندان و در نارسایی کلیه و کبد

⚠ عوارض جانبی مهم: عوارض متضاد را می تواند ایجاد نماید مثل

بی خوابی یا خواب آلودگی، تغییرات فشار خون، یبوست، خشکی دهان،

ضعف، زردی، افزایش اشتها، اسهال، عرق شدید، ضایعات پوستی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: پس از بهبودی اولیه میزان مصرف را

کاهش دهید.

- برای ارزیابی مفید بودن دارو یک ماه وقت لازم است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز هرگونه علائم آزار دهنده به

پزشک اطلاع دهید.

بیمار به طور همزمان نباید از الکل یا کافئین استفاده کند.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## ایزو فلوران (ISOFLURANE)

نام تجاری: Florane

گروه دارویی: هالوژنها

گروه درمانی: داروهای بیهوشی

شکل دارویی: گاز

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیهوشی عمومی یا سرپایی و در تشنج‌هایی که به هیچ درمانی دارویی پاسخ نمی‌دهد، کاربرد دارد.

میزان مصرف: با غلظت ۵/۰٪ در اکسیژن یا  $N_2O$

موارد منع مصرف: عوارض قلبی و کبدی که در هالوتان (صفحه ۳۶۴) توضیح داده شده است.

عوارض جانبی مهم: به هالوتان مراجعه شود.

توجهات پزشکی - پرستاری: به هالوتان مراجعه شود.

آموزش بیمار - خانواده: به هالوتان مراجعه شود.

شرایط نگهداری: در دمای زیر ۳۰ درجه نگهداری شود.

## ایزونیاژید (ISONIAZID)

نام تجاری: Laniazid

گروه دارویی: اسید هیدرازید (INH)

گروه درمانی: ضد بیل

شکل دارویی: قرص و تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان بیل ریوی (T.B)

میزان مصرف: در بیل ۵ تا ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن تا حداکثر ۳۰۰ میلی گرم یک بار در روز استفاده شود.

موارد منع مصرف: سابقه حساسیت دارویی، ضایعه عصب بینایی  
⚠ عوارض جانبی مهم: ضایعات عصب محیطی، گزگز در دست و پا، تب، ضایعات پوستی، اختلالات خونی، تهوع و استفراغ، خشکی دهان، بزرگی پستان مردان

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مصرف همزمان هیدروکسید آلومینیوم با ایزونیاژید اثر آن را کاهش می دهد.

در صورت تهوع و سرگیجه یا تاری دید به فکر مسمومیت با دارو باشید. آموزش بیمار - خانواده - مصرف دارو در بیماران کبدی ممنوع است. معاینه دوره ای چشم ضروری است.

کنترل فشار خون بیمار ضروری است.

بهتر است دارو یک ساعت قبل از غذا یا ۲ ساعت بعد از غذا میل شود.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.

## ایزوپروترنول (ISOPROTERENOL)

نام تجاری: Serventrine

گروه دارویی: بتاآدرنرژیک

گروه درمانی: ضد آریتمی قلبی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: این داروی مهم قلبی روی گیرنده‌های  $\beta_1$  و  $\beta_2$  اثر تحریکی دارد. باز کننده ریه نیز می‌باشد. برای انقباض عروق در شوک و نارسایی قلبی و اسپاسم ریه کاربرد دارد. بلوک قلبی نیز از دیگر موارد استفاده آن می‌باشد.

⚠️ میزان مصرف: ۲ میلی گرم از ویال ایزوپروترنول را در ۵۰۰ cc دکستروز، ۰/۵ یا ۱ میلی گرم ایزوپروترنول را در ۲۵۰ cc دکستروز ۰/۵٪ حل شده و با غلظت ۴ میکروگرم در هر میلی لیتر به دست آمده و با سرعت ۰/۵ تا ۵ میکروگرم در دقیقه انفوزیون می‌شود.

موارد منع مصرف: در بیماران با آنژین قلبی و مسمومیت با دیگوکسین و بیماران کبدی کلیوی

⚠️ عوارض جانبی مهم: سرگیجه، سردرد، بی‌نظمی قلبی، کاهش فشار خون، تشنج، تپش قلب.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: فشار خون و ضربان قلب بیمار کنترل شود.



در صورت افزایش ضربانات قلبی سرعت و میزان مصرفی دارو را کم کنید.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز سرگیجه، یا تپش قلب بیشتر به پزشک اطلاع دهید.

از مصرف بیش از حد چای و قهوه خودداری شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## ایزوسورباید دی نیترات (ISO SORBID DINITRATE)

نام تجاری: Isordil

گروه دارویی: نیترات‌های (قلبی)

گروه درمانی: ضد درد قلبی

📌 شکل دارویی: قرص خوراکی و زیرزبانی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان آنژین قلبی، پیشگیری از دردهای قلبی و مهار حملات دردهای قلب. درد قلبی، نارسایی قلبی، بیماری‌های عروق محیطی و اسپاسم مری

⚠️ میزان مصرف: ۲/۵ تا ۱۰ میلی‌گرم به صورت زیرزبانی استفاده می‌شود و در حملات قلبی می‌توان آن را تکرار کرد.

موارد منع مصرف: در کاهش فشار خون، حساسیت شدید دارویی، کم خونی شدید، بالا بودن فشار داخل مغزی و سکت‌های قلبی اخیر  
⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، کاهش فشار خون، تپش قلب، تاکیکاردی (افزایش تعداد ضربان قلب)، بی‌نظمی قلبی، احساس گرما و داغ شدن بدن، خستگی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: علائم حیاتی بیمار باید کنترل شود.

با الکل و آسپیرین تداخل دارویی دارد.

آموزش بیمار - خانواده: دارو قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا میل شود. دارو طبق دستور مصرف شود.

عارضه سردرد در این دارو شایع می باشد.  
این دارو به محض احساس درد قفسه سینه، باید زیر زبان گذاشته شود.  
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## ایزوسورباید منو نیترات (ISOSORBID MONONITRATE)

نام تجاری: Imdur

گروه دارویی: نیترات‌ها

گروه درمانی: ضد آنژین قلبی

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان طولانی مدت آنژین قلبی، نارسایی احتقانی قلب

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص در روز حداکثر ۲۴۰ میلی‌گرم در روز

موارد منع مصرف: مثل ایزوسورباید دی نیترات

⚠ عوارض جانبی مهم: مشابه دی‌نیترات

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مشابه دی‌نیترات

آموزش بیمار - خانواده: مشابه دی‌نیترات

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق

## ایزوترتینوئین (ISOTRETINOIN)

نام تجاری: Accutant

گروه دارویی: رتینول (ویتامین A)

گروه درمانی: ضد آکنه

Ⓢ شکل دارویی: کپسول ۲۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: آکنه شدید و مقاوم به درمان، التهاب فولیکول های مو، عفونت غدد چربی پوست

⚖ میزان مصرف: ۱ تا ۲ کپسول ۲ تا ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، کم خونی، بیماری های خونی، حاملگی، دیابت قندی

⚠ عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، استفراغ، عوارض پوستی، خارش، درد عضلات، اختلالات خونی، بالا بودن آنزیم های کبدی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مدت درمان ۵ تا ۶ ماه می باشد.

احتمال افزایش فشار داخل مغزی می رود.

تست های اسید اوریک و کبد و چربی خون مختل می شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت هر گونه سردرد شدید و تهوع به پزشک اطلاع دهید.

در ابتدای درمان آکنه بدتر می شود.

به علت عوارض دارو در حاملگی تا یک ماه بعد از قطع مصرف دارو حامله نشوید و در طول این مدت نیز خون اهدا نکنید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مطلوب است.

## ایزوکسوپرین (ISOXSUPRINE)

نام تجاری: Vasodilan

گروه دارویی: بتا آدرنرژیک

گروه درمانی: گشاد کننده عروق

⑤ شکل دارویی: قرص ۱۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: نارسایی عروق محیطی مثل (سندرم رینود)، مشکلات عروق مغزی و بیماری برگر و عوارض همراه قاعدگی

⑥ میزان مصرف: در درمان عوارض عروقی ۱۰ میلی گرم ۳ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: در صورت خونریزی شریانی و بلافاصله بعد از زایمان منع مصرف دارد.

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، عصبانیت، ضعف، گیجی، تپش قلب، لرزش، تندکاری ضربان قلب، ضایعات پوستی، دل پیچه

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: موجب تحریک قلب و افزایش تعداد ضربان قلب می شود.

آموزش بیمار - خانواده: هر گونه ضایعات پوستی را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.


☑ نکته: بیماری برگر: یک نوع عارضه کلیوی (نفروپاتی) می باشد که همراه با آن بیمار وابستگی شدید به سیگار دارد و عروقی محیطی به ویژه ساق فاقد عملکرد می شود و باعث می شود که زخم و قطع پا سرانجام آن باشد.

## ایتراکونازول (ITRACONAZOLE)

نام تجاری: Sporanox

گروه دارویی: آزول

گروه درمانی: ضد قارچ‌ها

شکل دارویی: کپسول ۱۰۰ میلی گرم 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت قارچی اسپرژیلوس، بلاستومایکوزیس، هیستوپلاسموزیس و عفونت‌های کاندیدا، مننژیت کریپتوکوکی، کراتیت قارچی

⚠ میزان مصرف: ۲ تا ۴ عدد کپسول روزانه توصیه می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، در حاملگی و شیردهی توصیه نمی‌شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: دل درد، اسهال، سر درد، بالا رفتن فشار خون، بزرگی پستان، کچلی موضعی، تورم اندام‌ها

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی باید ارزیابی شوند.

از کشت قارچ یا اسمیر آن مطمئن شوید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو با یک لیوان کامل آب میل شود.

در صورت حساسیت، دارو قطع و به پزشک اطلاع داده شود.

در صورت مصرف داروهای قلبی مثل دیگوکسین به پزشک اطلاع

دهید. تغییر رنگ ادرار یا مدفوع را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مطلوب است.

## کتامین (KETAMINE)

نام تجاری: Ketalar

گروه دارویی: فن سیکلیدین

گروه درمانی: بیهوشی

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: دارو در بیهوشی بدون شلی عضلات (با یا بدون داروهای دیگر) به کار می‌رود.

⚠ میزان مصرف: بر حسب مورد برای بیهوشی یا آرام کردن یا ایجاد آثار ضد درد فرق می‌کند.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، افراد دارای حملات مغزی یا فشار خون بالا

⚠ عوارض جانبی مهم: توهم، تغییر رفتار، افزایش تون عضلات، افزایش فشار خون و تعداد ضربان قلب، تهوع، استفراغ، سردرد پس از بیهوشی از آن جمله‌اند.

⚠ توجهات پزشکی-پرستاری: با اتر و هالوتان و داروهای مهارکننده مغز و اعصاب تداخل دارویی دارد.

کاهش عملکرد تنفسی و افزایش ترشحات حلق از جمله علائم مسمومیت دارویی محسوب می‌شوند.

آموزش بیمار-خانواده: به علت عوارض بعد از عمل تا مدت کوتاهی از رانندگی و کارهای دقیق و نیازمند توجه خودداری شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## کتوکونازول (KETO CONAZOLE)

نام تجاری: Niloral

گروه دارویی: ایمیدازول ها

گروه درمانی: ضد قارچ

شکل دارویی: قرص ۲۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های قارچی، برفک دهان، هیستوپلاسماز، قارچ ناخن

میزان مصرف: یک قرص روزانه و قابل افزایش تا ۲ قرص روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، مننژیت قارچی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، خواب آلودگی، بی قراری، احساس

وزوز گوش، سردرد، لرز، تب، تنگی نفس، راش و کهیر

توجهات پزشکی - پرستاری: احتمال اختلالات کبدی وجود دارد.

آزمایش های خونی باید انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: هر گونه تشدید عارضه به پزشک اطلاع داده شود.

الکل باعث تشدید عوارض دارو می شود.

این دارو اثر قرص های ضد بارداری را کاهش می دهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

تذکر: شکل موضعی دارو به صورت کرم و شامپو در ضایعات پوستی و

عفونت کاندیدیایی کاربرد دارد.

## کتوتیفن (KETOTIFEN)

نام تجاری: Laditen

گروه دارویی: آنتی هیستامین

گروه درمانی: درمان آسم

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عوارض آلرژی مفصلی، آسم، حساسیت‌های چشمی

میزان مصرف: یک قرص دو بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و حملات حاد آسمی

عوارض جانبی مهم: سردرد، خواب‌آلودگی، ضایعات جلدی، خشکی

دهان

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو در ترشحات حساسیتی بینی،

چشمی و آبریزش ناشی از رینیت آلرژیک کارایی دارد و در حملات حاد

به کار نمی‌رود.

آموزش بیمار - خانواده: احتمال کاهش پلاکت خون می‌رود و ممکن

است باعث ایجاد خونمردگی و عوارض جلدی یا درد گلو شود.


شرایط نگهداری: دمای ۵-۳۰ درجه معمولی کافی است.

## لاکتولوز (LACTULOSE)

نام تجاری: Cephalac

گروه دارویی: دی ساکارید

گروه درمانی: اسهال آور

شکل دارویی: شربت 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضد یبوست - در عوارض کبدی ناشی از کومای کبدی و پیشگیری از عوارض مغزی آن، آنسفالوپاتی کبدی مفید است.

غلظت میزان مصرف: ۳۰ تا ۵۰ سی سی ۳ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: در انسداد روده، در حامله ها و شیردهی

⚠ عوارض جانبی مهم: اسهال و اختلالات الکترولیتی، درد شکمی، تهوع، آروغ، استفراغ

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: الکترولیت های بیمار کنترل شود.

نئومایسین اثر بخشی آن را افزایش می دهد.

آموزش بیمار - خانواده: چون طعم آن خوشایند نیست همواره با آب یا آب میوه مصرف شود.

دارو طی ۱ تا ۲ روز اثر می کند و اسهال ایجاد می کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## لامی وودین (LAMIVUDINE)

نام تجاری: Epivir

گروه دارویی: نوکلئوزید

گروه درمانی: ضد ویروس

📦 شکل دارویی: قرص و محلول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در درمان عفونت ویروسی علیه هیپاتیت B و HIV

⚖️ میزان مصرف: ۱۵۰ میلی گرم دوبار در روز به همراه زیدوودین

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و نارسایی پانکراس

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، خستگی، سرفه، تب و لرز، بی‌اشتهایی،

راش پوستی، کچلی موضعی، دردهای مفصلی و عضلانی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش‌های کبدی و آمیلاز سرم باید

انجام شود.

آزمایش‌های خونی به علت بروز کم خونی احتمالی ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: زمان مصرف دارو مهم نیست (قبل یا بعد از

غذا)

دارو بدون نظر پزشک نباید قطع شود.

شرایط نگهداری: در جای خنک نگهداری شود.

## لاموتری ژین (LAMOTRIGINE)

نام تجاری: Lamictal

گروه دارویی: فنیل تری آزین

گروه درمانی: ضد تشنج

شکل دارویی: قرص و محلول خوراکی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تشنج

⚠️ میزان مصرف: ۰/۱ تا ۰/۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم که در هفته‌های بعد افزایش می‌یابد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بیماران با نارسایی کبدی  
⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، راش، سرگیجه، دوبینی، تاری دید، تهوع و استفراغ، اضطراب، ضایعات جلدی، تاکیکاردی، خونریزی، اختلال شخصیت، فلج، فکر خودکشی، ورم عمومی، درد عضلات  
⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش‌های کبدی و کلیوی باید انجام شود.

قطع ناگهانی دارو خطرناک است.

آموزش بیمار - خانواده: پزشک می‌بایست میزان مصرف دارو را بر اساس پاسخ درمانی تنظیم کند.

عوارض جانبی دارو را می‌بایست به بیمار اطلاع داد.

بیمار نباید در معرض نور قرار گیرد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## لاتانوپروست (LATANOPROST)

نام تجاری: Xalatan

گروه دارویی: پروستاگلاندین

گروه درمانی: ضد آب سیاه چشم (گلوکوم)

📌 شکل دارویی: قطره چشمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: برای درمان فشار بالای داخل چشم

⚠️ میزان مصرف: یک قطره روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبد و کلیه

⚠️ عوارض جانبی مهم: تاری دید، دو بینی، اشک ریزش، سرماخوردگی،

ضایعات جلدی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: ممکن است در عنبیه چشم تغییر رنگ

قهوه‌ای ایجاد شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را قبل از خواب مصرف کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## لوکوورین (LEUCOVORIN)

نام تجاری: Wellcovorin

گروه دارویی: اسید فولیک

گروه درمانی: درمان کم خونی‌ها

⑤ شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کمبود اسید فولیک، درمان کمکی در سرطان (که با متوترکسات درمان می‌شود)، در کم خونی‌ها

⚠️ میزان مصرف: در کم خونی‌ها ۱ میلی‌گرم خوراکی یا عضلانی روزانه تجویز شود.

موارد منع مصرف: در کم خونی تشخیص داده نشده کاربرد ندارد و در کم خونی ناشی از B12 نیز مفید نیست.

⚠️ عوارض جانبی مهم: راش، کهیر، تنگی نفس

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: نوع تزریقی را چونکه دارای کلسیم است با سرعت بالا تزریق نکنید. محلول آن می‌بایست طی ۱۵ تا ۶۰ دقیقه از راه وریدی، انفوزیون شود. آموزش بیمار - خانواده: بیمار نباید میزان مصرف داروی خود را تغییر دهد.

بیمار باید از مواد غذایی حاوی اسید فولیک مثل پروتئین گوشت، باقلای خشک و سبزی و میوه تازه استفاده کند. شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## لوپرورلین (LEUPRORELIN)

نام تجاری: Enantone

گروه دارویی: گنادوتروپین

گروه درمانی: هورمون‌های جنسی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان سرطان‌های پروستات

میزان مصرف: ۷/۵ میلی گرم یک بار در ماه تزریق عضلانی

موارد منع مصرف: حاملگی، شیردهی و حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، آریتمی قلبی، انفارکتوس (سکته)

قلبی، تنگی نفس، عوارض کبدی، درد استخوان و عوارض پوستی، یبوست.

توجهات پزشکی - پرستاری: بررسی اندازه سطح سرمی: پروژسترون،

LH، پرولاکتین، تستوسترون، استرادیون، و HcG، FSH ضروری است.

ارزیابی پاسخ به درمان با پیلوگرام یا سی تی اسکن در ضایعات پروستات مهم است.

آموزش بیمار - خانواده: گر گرفتگی جزء عوارض شایع است.

در صورت فراموشی یک مرحله مصرف آن، در زنان خونریزی رحمی رخ می‌دهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## لوامیزول (LEVAMIZOLE)


نام تجاری: Ketrax


گروه دارویی: ایمیدازول


گروه درمانی: ضد کرم

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کرم‌های روده‌ای (نماتود)، در سرطان روده بزرگ به عنوان داروی کمکی مصرف می‌شود (مورد اصلی درمان کرم آسکاریس است). در بیماری رماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید) کاربرد دارد.  میزان مصرف: در درمان انگل‌های روده یک بار ۱۵۰ میلی گرم مصرف شود.

موارد منع مصرف: کم خونی شدید، تشنج، عفونت، نارسایی کبدی  عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، سردرد، عوارض جانبی، تب، درد مفاصل و درد شکم.

 توجهات پزشکی - پرستاری: در بیماری‌های رماتیسمی احتمال بروز عوارض خونی بیشتر است.

این دارو در افراد با بیماری خونی نباید تجویز شود.

تست‌های کبدی حتماً انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: ضایعات پوستی را به پزشک اطلاع دهید.

خونریزی از لثه و بینی متحمل است.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## لوودوپا (LEVODOPA)

نام تجاری: Larodopa

گروه دارویی: گروه دوپالین

گروه درمانی: ضد پارکینسون

⑤ شکل دارویی: قرص ۵۰۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پارکینسون

⚖️ میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص روزانه توصیه می شود و به تدریج قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، گلوکوم زاویه بسته و مصرف کنندگان داروهای مهار کننده منو آمین اکسیداز (MAOI)

⚠️ عوارض جانبی مهم: راش جلدی، تاری دید، خشکی دهان، مشکلات کبدی، کلیوی، تپش قلب، کم خونی، کاهش فشار خون

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تست های کبدی و کلیوی ضروری است. توصیه کنید دارو با غذا میل شود.

پس از ۳ هفته علائم بهبود ظاهر می شود.

احتمال تغییر رفتار و عصبانیت بر اثر مصرف دارو هست با روانپزشک مشورت شود.

آموزش بیمار - خانواده: احساس سرخوشی، نشانه بهبود و درمان است.

دارو بدون اطلاع پزشک قطع نشود.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

☑ نکته: پارکینسون به علت کاهش دوپامین در ماده سیاه مغزی می باشد که فرد در حرکات عادی خود لرزش مکرر دست دارد و حرکات معمول را آهسته و سخت انجام می دهد و در سالمندان بروز بیشتری دارد.

## لوودوپا - بی (LEVODOPA-B)


گروه دارویی: ترکیب لوودوپا

گروه درمانی: ضد پارکینسون


شکل دارویی: قرص 


مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: این دارو ترکیب لوودوپا و بنسرازید است.

میزان مصرف: مشابه لوودوپا 

موارد منع مصرف: حاملگی

عوارض جانبی مهم: مشابه لوودوپا 

توجهات پزشکی - پرستاری: مشابه لوودوپا 

آموزش بیمار - خانواده: مشابه لوودوپا

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است


نکته: این دارو همراه یا بلافاصله پس از غذا میل شود. 

## لوودوپا - سی (LEVODOPA-C)

نام تجاری: Sinemet

گروه دارویی: ترکیب لوودوپا و کاربی دوپا

گروه درمانی: ضد پارکینسون

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پارکینسون

⚠ میزان مصرف: ۱ قرص ۳ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی

☠ عوارض جانبی مهم: مثل لوودوپا

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مثل لوودوپا

آموزش بیمار - خانواده: مثل لوودوپا


شرایط نگهداری: مثل لوودوپا

## لوونورژسترل (LEVONORGESREL)

نام تجاری: Norplant

گروه دارویی: پروژستین

گروه درمانی: هورمون‌های ضد حاملگی

شکل دارویی: کپسول زیر جلدی 

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: جلوگیری از بارداری

میزان مصرف: ۶ عدد کپسول را به مدت هر ۵ سال زیر پوست وسط بازو جاگذاری می‌شود.

موارد منع مصرف: اختلالات ترومبوز وریدی و فشار خون بالا

⚠ عوارض جانبی مهم: خستگی، افسردگی، ادم، خونریزی، سر درد، زردی، بالا رفتن قند خون، احتمال لخته شدن خون در وریدها (ترومبوز)، آکنه پوستی، درد عضلات

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت بروز زردی، کپسول را خارج کنید.

این دارو باعث احتباس مایع می‌شود.

جاگذاری با روش استریل انجام گردد.

کپسول‌ها بعد از ۵ سال خارج شوند.

آموزش بیمار - خانواده: پس از یک روز پانسمان را بردارید.

۲۴ ساعت اول برای اثربخشی دارو در صورتی که کپسول‌ها در هفته

اول سیکل ماهانه جاگذاری شود لازم است و در غیر این صورت باید

روش پیشگیری از حاملگی دیگری هم استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## لووتیروکسین (LEVOTHYROXIN)

نام تجاری: Eltroxin

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: هورمون تیروئید و ضد سرطان

شکل دارویی: قرص ۰/۱ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: درمان کم کاری تیروئید (هیپوتیروئید)، کومامیکزودم

میزان مصرف: ۵۰ میکروگرم در روز

موارد منع مصرف: پرکاری تیروئید (تیروتوکسیکوز)، سکتۀ قلبی و چاقی

عوارض جانبی مهم: سر درد، درد قلبی، تهوع، اسهال، درد عضلانی،

عوارض پوستی، ایست قلبی، عصبی بودن، لرزش دست و پا، تپش قلب

توجهات پزشکی - پرستاری: سطح سرمی هورمون‌های تیروئید باید

اندازه‌گیری شود.

در بیماران قلبی با احتیاط مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو ممکن است باعث عوارض شدید قلبی

تنفسی بشود در صورت بروز به پزشک اطلاع دهید.

بهتر است دارو صبح‌ها مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## لیدوکائین هیدورکلراید (LIDOCAINE HCL)

نام تجاری: Xyllocaine

گروه دارویی: مشتقات آمیدها

گروه درمانی: بی حس کننده موضعی

② شکل دارویی: تزریقی، پماد

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: بی حسی منطقه‌ای، بلوک اعصاب محیطی و بلوک عصب سمپاتیک در بی حسی‌های نخاعی (اسپینال) و ترکیبات مخدر و آرتیمی قلبی.

⚠️ میزان مصرف: بنا بر ضرورت متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی این دارو با داروهای ایندرال، سایمتدین، فنی توئین، باربیتورات‌ها، دیوریتیک‌ها و مهار کننده‌های مغز و اعصاب تداخل دارویی دارد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، تشنج، انقباض مردمک

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تجویز مقدار زیاد آن باعث تشنج می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: در مصرف دندانپزشکی بلع غذا را مختل می‌کند.

شرایط نگهداری: دمای معمولی مطلوب است.

✓ نکته: این دارو با اپی نفرین، و پریلوکائین مخلوط هم می‌شود.



## لیندان (LINDAN)

نام تجاری: Kwell

گروه دارویی: هیدورکربن کلرینه

گروه درمانی: ضد گال، ضد شپش

شکل دارویی: شامپو و لوسیون

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان گال، شپش

میزان مصرف: یک لایه نازک لوسیون را روی پوست بدن (پایین تر از گردن) بمالید و بعد از ۶ تا ۸ ساعت کل بدن را بشوید، یک هفته بعد تکرار نمایید و در درمان شپش، دارو را به سر بمالید و ۵ دقیقه بعد موها را بشوید.

موارد منع مصرف: در افراد با حساسیت شدید و مبتلایان به تشنج عوارض جانبی مهم: عوارض پوستی، سرگیجه، تشنج، درد عضلانی، عصبانیت، بی‌قراری، استفراغ و عوارض عصبی

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو احتمالاً از طریق پوست سر و بدن جذب می‌شود.

در درمان کامل زوج‌ها، زن و مرد همزمان درمان شوند. آموزش بیمار - خانواده: بهتر است موها در هنگام استفاده از شامپو، خشک باشد.

در شپش بدن، بگذارید شامپو ۱۲ ساعت روی بدن بماند. مالیدن دارو روی پوست ملتهب و آسیب دیده ممنوع است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

☑ نکته: گال یکی از بیماری‌های پوست و مو است که توسط بندپایان ایجاد می‌شود.




## لیوتیرونین سدیم (LIOTHYRONINE)

نام تجاری: Cytomel

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: هورمون تیروئیدی

شکل دارویی: قرص ۲۵ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: کم کاری تیروئید (هیپوتیروئید)، گواتر ساده غیر سمی  
میزان مصرف: با یک قرص شروع و سپس با پاسخ بالینی، آن را طی  
۱ تا ۲ هفته افزایش دهید.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، سکتۀ قلبی اخیر،  
تیروتوکسیکوز درمان نشده

✖ عوارض جانبی مهم: سر درد، لرزش دست و پا، بی خوابی، عصبانیت،

بی نظمی کارکرد قلبی، کاهش وزن، تعریق، عوارض پوستی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.

قطع ناگهانی دارو خطرناک است.

در بیماران قلبی با احتیاط مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو قبل از صبحانه میل شود.

هر گونه درد قفسۀ سینه و تپش قلب را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## لیزینوپریل (LISINOPRIL)

نام تجاری: Zestril

گروه دارویی: مهار کننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین

گروه درمانی: ضد فشار خون، گشاد کننده عروق

شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون بالا، گشاد کننده عروق در نارسایی احتقانی

قلب، انفارکتوس حاد میوکارد (سکته قلبی)

میزان مصرف: ۱۰ میلی گرم یک بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیه و کبد

عوارض جانبی مهم: واکنش شدید حساسیتی، کاهش شدید فشار خون،

عوارض کلیوی، عوارض خونی شدید، درد قلبی، سر درد، سرگیجه،

تهوع، ضایعات جلدی شدید، حساسیت به نور، ضعف عمومی

توجهات پزشکی - پرستاری: مصرف دیورتیک باید قطع شود. ⚠

فشار خون بعد از مصرف دارو شدید خواهد شد.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است میزان مصرف دارو نصف شود و

طی ۲ مرحله استفاده شود.

از رانندگی و کارهای دقیق بعد از مصرف دارو اجتناب شود.

مصرف چای زیاد و نوشابه‌ها همراه دارو ممنوع است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## لیتیوم کربنات (LITHIUM)

نام تجاری: Eskalith

گروه دارویی: کاتیون‌ها (فلز قلیایی)

گروه درمانی: ضد مانیا

شکل دارویی: قرص ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: کنترل و پیشگیری از حملات مانیا، افسردگی در بیماران (دو قطبی)، اختلالات وسواسی، بی‌اشتهایی عصبی، اختلالات روانی بعد از زایمان

میزان مصرف: ابتدا با ۳۰۰ میلی گرم طی ۲ تا ۳ بار در روز شروع و تا پاسخ مناسب درمانی افزایش می‌دهیم.

موارد منع مصرف: بیماران قلبی، کلیوی، بیماری آدیسون و حساسیت دارویی

عوارض جانبی مهم: تهوع، سر درد، اسهال، سرگیجه، خارش، عوارض کلیوی، خواب‌آلودگی، تشنج، فشار خون پایین، درد مچ دست و آرنج، ضعف عمومی

توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت امکان سطح سرمی دارو هر ۲ تا ۳ ماه اندازه‌گیری شود.

نوار قلب بیماران در شروع و حین درمان کنترل شود.  
آموزش بیمار - خانواده: بهتر است دارو را با غذا میل کنید.  
از رانندگی و انجام کارهای ظریف و دقیق اجتناب شود.

در صورت بروز عوارض شدید مثل اسهال، تهوع و خواب آلودگی شدید  
به پزشک اطلاع دهید.  
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## لوموستین (LOMUSTIN)

نام تجاری: Ceenu

گروه دارویی: الکیله کننده‌ها

گروه درمانی: ضد سرطان

📦 شکل دارویی: کپسول ۴۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان‌های مغز، لنفوم هوچکین

⚖️ میزان مصرف: طبق نظر تخصصی از ۱۳۰ میلی گرم در هر متر مربع سطح بدن شروع می‌شود.

موارد منع مصرف: افراد با واکسیناسیون همزمان با ویروس زنده یا مبتلایان به آبله مرغان و حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: عوارض خونی شدید مثل کاهش گلبول سفید خون از آن جمله‌اند، عوارض کلیوی، اختلالات در حرکت، بی‌قراری، عوارض گوارشی مثل تهوع، استفراغ، زخم دهان، کچلی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: به علت سرکوب ایمنی، استعداد فرد به آلودگی میکروبی افزایش می‌یابد.

کنترل آزمایش‌های خونی ضروری است.

فعالیت غدد جنسی در حین مصرف دارو کاهش می‌یابد.

آموزش بیمار - خانواده: اعضای خانواده بیمار نباید تحت واکسیناسیون با ویروس زنده قرار گیرند.

تهوع و استفراغ را می‌توان با مصرف دارو قبل از غذا کاهش داد.

در خانم‌ها این دارو باعث قطع عادت ماهیانه می‌شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## لوپراماید (LOPERAMID)

نام تجاری: Imodium

گروه دارویی: پیرادین

گروه درمانی: ضد اسهال

شکل دارویی: قرص ۲ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان اسهال‌های مسافرتی و اسهال‌های حاد و مزمن

میزان مصرف: ۲ قرص و حداکثر ۸ عدد قرص تا قطع اسهال

موارد منع مصرف: انسداد روده و یبوست شدید، اسهال خونی یا تب‌دار،

زخم روده بزرگ.

عوارض جانبی مهم: یبوست، سردرد، سرگیجه، خشکی دهان، درد

شکم، خواب‌آلودگی، راش پوستی

توجهات پزشکی - پرستاری: در اسهال‌های عفونی دارو تجویز

نمی‌شود.

می‌بایست آب و الکترولیت بیمار تأمین و تنظیم شود.

در بیماران کبدی با احتیاط مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: رانندگی در حین مصرف دارو ممنوع است.

بیمار می‌بایست مایعات کافی مصرف کند.

هر گونه تب یا عدم قطع اسهال را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی مناسب است.



## لوراتادین (LORATADINE)

نام تجاری: Claritin

گروه دارویی: ضد گیرنده هیستامین (H1)

گروه درمانی: ضد آسم

📦 شکل دارویی: قرص ۱۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان علامتی رینیت آلژریک و حساسیت‌های فصلی و  
کهیر

⚖️ میزان مصرف: یک قرص روزانه

موارد منع مصرف: بیماران کبدی کلیوی و حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، بی‌خوابی، سرگیجه، خشکی دهان، ضعف

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی و کلیوی را انجام دهید.

آموزش بیمار - خانواده: به علت خواب‌آلودگی از رانندگی اجتناب شود.

قرص را پس از باز کردن پوشش آن، فوراً میل فرمایید.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.

## لورازپام (LORAZEPAM)

نام تجاری: Ativan

گروه دارویی: بنزودیازپین ها

گروه درمانی: ضد تشنج، خواب آور

شکل دارویی: قرص و آمپول 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اختلالات اضطرابی، بی خوابی، تشنج، تهوع و استفراغ

⚠️ میزان مصرف: ۱ تا ۶ میلی گرم روزانه استفاده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی، حاملگی، سایکوز، افسردگی

⚠️ عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی شدید، ضعف، سرگیجه، کاهش فشار

خون یا بالا رفتن فشار خون، کاهش شنوایی، درد شکمی، استفراغ

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: نوع تزریقی را داخل یخچال نگهداری کنید.

تست های خونی و کبدی به عمل آید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود.

در صورت بروز حاملگی حین مصرف دارو به پزشک اطلاع دهید.

رانندگی و انجام کارهای دقیق پس از مصرف دارو ممنوع است.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## لوساتان (LOSATAN)

نام تجاری: Cozaar

گروه دارویی: ضد آنژیوتانسین II

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص ۲۵ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه C , D

موارد مصرف: فشار خون

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: اسهال، سردرد، سوء هاضمه، درد عضلات، سرفه

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی را انجام دهید.

فشار خون بیمار را کنترل کنید.

مهمترین علامت مسمومیت، سرگیجه و کاهش فشار خون است.

آموزش بیمار - خانواده: دارو نباید به صورت ناگهانی قطع شود.

در صورت بروز حاملگی دارو را قطع کنید.

در صورت مصرف دیورتیک (داروهای ادرار آور) کاهش فشار خون

بیشتر رخ می‌دهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود

## لوواستاتین (LOVASTATIN)

نام تجاری: Merocar

گروه دارویی: مهارکننده (HMG -COA)

گروه درمانی: ضد چربی

📌 شکل دارویی: قرص ۲۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان هیپرلیپیدمی (افزایش چربی خون)

📏 میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص روزانه تا ۸۰ میلی گرم روزانه می توان استفاده کرد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، دوره حاملگی و شیردهی، نارسایی کبدی

☠ عوارض جانبی مهم: سردرد، ضایعات پوستی، تهوع، استفراغ، درد سینه، تاری دید، درد مفاصل و عضلات، سرگیجه

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تست های کبدی باید انجام شود.

بہتر است توصیه کنید شب ها همراه غذا مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو به همراه غذا میل شود.

بیمار می بایست رژیم غذایی مربوطه را در کاهش چربی های خون مراعات کند.


شرایط نگهداری: دمای معمولی مطلوب است.

## لاینسترنول (LYNESTRENOL)

نام تجاری: Miniluyn

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: پروژستین

شکل دارویی: قرص ۰/۵ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: جلوگیری از بارداری و درمان اختلالات عادت ماهانه

میزان مصرف: روزانه ۵ تا ۱۰ میلی گرم به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز از هر سیکل ۲۸ روز ماهانه

موارد منع مصرف: مثل مدروکسی پروژسترون (صفحه ۴۳۳)

⚠ عوارض جانبی مهم: مشابه مدروکسی پروژسترون

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مشابه مدروکسی پروژسترون

آموزش بیمار - خانواده: مشابه مدروکسی پروژسترون


شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## مافناید (MAFENIDE)

نام تجاری: Sulfamylon

گروه دارویی: سولفونامیدها

گروه درمانی: ضد میکروب، ضد قارچ

شکل دارویی: کرم موضعی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت زخم، سوختگی‌ها (پیشگیری و درمان عفونت)

میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۲ بار

موارد منع مصرف: در بیماری‌های خونی و اختلالات انعقادی با احتیاط مصرف شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: به علت جذب سیستمیک باعث واکنش حساسیتی و اسیدوز متابولیک و اختلالات خونریزی دهنده می‌شود.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: قبل از استفاده از قرص بهتر است سطح سوختگی با سرم شسته شود و دبریدیمان بافت‌های مرده انجام شود. حمام روزانه در بهبود زخم مفید است.

آموزش بیمار - خانواده: برای بهبود نسبی و سریع‌تر، شست‌وشوی قبل از پانسمان بعدی باید کامل باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## هیدروکسید منیزیم (MAGNESIUM HYDROXID)

نام تجاری: Milk of magnesia

گروه دارویی: آنتی اسید

گروه درمانی: آنتی اسید و اسهال آور

شکل دارویی: شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: به عنوان آنتی اسید و ملین مورد استفاده قرار می گیرد به ویژه بیماران بستری در بخش های بیمارستانی بعلت کاهش تحرک و راه نرفتن دچار یبوست می شوند که این دارو مفید می باشد.

میزان مصرف: ۵ تا ۱۵ سی سی ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد ولی بهتر است در اسهال، استفراغ و نارسایی کلیه و خونریزی های دستگاه گوارش با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی مهم: اسهال، مشکلات قلبی و اختلالات در نوار قلب (ECG)

توجهات پزشکی - پرستاری: توصیه کنید یک لیوان آب بعد از دارو میل شود. مصرف درازمدت آن وابستگی ایجاد می کند.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است این دارو همراه با مایعات کافی استفاده شود. قبل از مصرف شیشه دارو را به خوبی تکان دهید. شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## سولفات منیزیم (MAGNESIUM SULFATE)

نام تجاری: Sulmags

گروه دارویی: سولفات منیزیم

گروه درمانی: ضد تشنج (به ویژه در حاملگی)

⑤ شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: در مسمومیت حاملگی (اکلامپسی و پره اکلامپسی)، در خانم حامله و کسانی که از راه دهان تغذیه نمی کنند و مجبوریم داروها و مواد ضروری را از راه وریدهای محیطی بزرگ به وی برسانیم.

غلظت میزان مصرف: در کنترل تشنج و پیشگیری آن ۴ گرم محلول ۱۰ یا ۲۰ درصد در عرض ۳ تا ۴ دقیقه در بدن یا در سرم دکستروز طی نیم ساعت انفوزیون وریدی بشود.

موارد منع مصرف: در انفارکتوس قلبی و بلوک قلبی منع مصرف دارد. عوارض جانبی مهم: سردرد، گرگرفتگی، کاهش فشار خون، فلج تنفسی، تعریق، تهوع، خواب آلودگی، احساس تشنگی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: علائم حیاتی بیمار حین تزریق کنترل شود. سطح سرمی منیزیم بررسی شود. حتماً آمپول کلسیم گلوکونات وریدی را در دسترس و آماده داشته باشید.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز تهوع، استفراغ، مشکلات قلبی و تنفسی اطلاع به پزشک ضروری است چون علائم مسمومیت است. شرایط نگهداری: در دمای معمول نگهداری شود.



## مانیتول (MANITOL)

نام تجاری: Austra

گروه دارویی: دیورتیک‌ها (ادرارآورها)

گروه درمانی: ضد گلوکوم (آب سیاه چشم)

📌 شکل دارویی: تزریقی ۱۰ یا ۲۰ درصد

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در ایجاد ادرار بیشتر (دیورزاسموتیک)، در نارسایی حاد کلیه، برای کاهش فشار داخل جمجمه، میوگلوبینوری ناشی از سوختگی (برق‌گرفتگی) در اثر برق‌گرفتگی مواد ناشی از سلولهای خونی، از طریق ادرار دفع می‌شوند.

⚠️ میزان مصرف: بر حسب مورد متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، ادم ریوی، نارسایی قلبی و کمبود مایعات در بدن (دهیدراتاسیون)

⚠️ عوارض جانبی مهم: اسهال، تشنج، سردرد، سرگیجه، نارسایی قلب، درد قفسه سینه، تاری دید، تشنگی، تهوع، کهیر، کاهش یا افزایش فشار خون

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: علائم حیاتی بیمار باید کنترل شود. وزن و عملکرد کلیه بیمار کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت درد سینه یا سردرد شدید به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## مدروکسی پروژسترون (MEDROXYPROGESTRON)

نام تجاری: Depo-provera

گروه دارویی: پروژستین (هورمون‌ها)

گروه درمانی: ضد سرطان، ضد بارداری

⑤ شکل دارویی: قرص و تزریقی (آمپول)

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: جلوگیری از بارداری - پیشگیری از هیپرپلازی اندومتر (رحمی)، درمان موقت سرطان پستان در خانم‌های یائسه، سرطان پروستات مردان

⚠️ میزان مصرف: برای جلوگیری از بارداری ۱۵۰ میلی‌گرم هر سه ماه یک بار به صورت عضلانی

موارد منع مصرف: موارد مشابه پروژسترون (صفحه ۴۸۸)

⚠️ عوارض جانبی مهم: افسردگی، ترومبوز وریدی (لخته شدن خون در پا)، افزایش قند خون، تهوع

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در بیماران دچار تشنج و آسم و اختلال قلبی با احتیاط مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: ممکن است در محل تزریق آبسه ایجاد شود. در صورت هر گونه درد و تورم ساق که نشانه‌ای از لخته شدن خون در وریدها باشد (ترومبوز) به پزشک اطلاع دهید. استعمال دخانیات همزمان ممنوع است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## مفنامیک اسید (MEFNAMIC ACID)

نام تجاری: Ponstan

گروه دارویی: مشتقات اسید آنترانیلیک

گروه درمانی: ضد درد، ضد التهاب

شکل دارویی: قرص و کپسول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: دردهای خفیف، درد دندان، ضد تب

میزان مصرف: یک تا چند کپسول ۱ تا ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: در خونریزی فعال گوارشی و آسم ممنوعیت مصرف دارد.

عوارض جانبی مهم: مثل داروهای دیگر ضد درد غیر استروئیدی مثل آسپرین (صفحه ۷۱)

توجهات پزشکی - پرستاری: سابقه زخم معده را از بیمار بپرسید. در

مصرف درازمدت این دارو آزمایش خون و کلیه لازم است.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است همراه با غذا استفاده شود. ادامه

درمان با این دارو مکن است با مشکلات گوارشی همراه باشد. در

صورت تغییررنگ مدفوع (سیاه قیری) به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

تذکر: درمان مداوم و بیش از ۷ روز آن می تواند پرعارضه باشد.

## منتول سالیسیلات (MENTHOL SALICYLATE)

نام تجاری: Calmycin

گروه دارویی: سالیسیلات

گروه درمانی: ضد درد موضعی

📌 شکل دارویی: پماد موضعی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تسکین دردهای موضعی در عضلات و اسکلت

⚠️ میزان مصرف: صبح و شب به صورت موضعی مالیده شود.

موارد منع مصرف: واکنش‌های حساسیتی

⚠️ عوارض جانبی مهم: ضایعات التهابی و واکنش موضعی بر روی پوست

محل استفاده

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در کودکان زیر ۶ سال استفاده نشود.

آموزش بیمار - خانواده: پس از احساس گرما، احساس بی‌دردی ایجاد

می‌شود. بر روی نقاط زخمی و ملتهب و خراشیده مالیده نشود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## مپروبامات (MEPROBAMATE)

نام تجاری: Miletown

گروه دارویی: مشتق کاربامات

گروه درمانی: ضد اضطراب

📌 شکل دارویی: قرص ۴۰۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اضطراب و علائم بی‌قراری

⚖️ میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص روزانه استفاده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، حاملگی و نارسایی کبد و کلیه

⚠️ عوارض جانبی مهم: خواب‌آلودگی، کم‌خونی، عوارض خونی، تپش قلب، تهوع، استفراغ، تشنج، تب و لرز هم گزارش شده است.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت تصمیم‌گیری برای قطع دارو باید به تدریج طی پانزده روز آن را کاهش دهید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو با غذا یا مایعات کافی میل شود. قطع ناگهانی دارو خطرناک است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## متاپروترونول (METAPROTERENOL)

نام تجاری: Metaprel

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: برونکودیلاتور

شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیماری‌های تنفسی مثل آسم و تنگی نفس مزمن ریوی،

برونشیت، آمفیزم، برونشکتازی و درمان بلوک قلبی

میزان مصرف: ۲۰ میلی گرم هر ۶ تا ۸ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، آریتمی قلبی

⚠ عوارض جانبی مهم: بی‌حالی، بی‌قراری، سرگیجه، سردرد، بالا رفتن

فشار خون، تهوع، استفراغ، خشکی دهان

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: وضعیت قلب و فشار خون بیمار را کنترل

کنید. در افراد مسن دارو با احتیاط مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت عدم بهبود علائم به پزشک اطلاع

دهید. تغییر در میزان مصرف دارو خطرناک می‌باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## متفورمین (METFORMIN)

نام تجاری: Glucophage

گروه دارویی: بی‌گوانیدها

گروه درمانی: ضد دیابت


شکل دارویی: قرص ۵۰۰ میلی‌گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: دیابت قندی (تیپ II)

میزان مصرف: یک قرص ۲ بار در روز

موارد منع مصرف: در افراد حساس، بیماران با نارسایی کلیه

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، کم‌خونی، ضایعات جلدی 

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با استروژن، ایزونیازید و ضدبارداری خوراکی تداخل دارویی دارد. قند خون بیمار باید کنترل شود. آموزش بیمار - خانواده: بهتر است متفورمین با صبحانه یا شام میل شود. بیماران دچار قند باید شناسنامه یا کارتی را که نشانگر بیماری آنهاست همیشه همراه داشته باشند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## متادون (METHADON)

نام تجاری: Dolophine

گروه دارویی: دی فنیل هپتان

گروه درمانی: ضد درد، مخدر صنعتی

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درد شدید، سندرم محرومیت از مخدرها

میزان مصرف: ۲/۵ تا ۱۰ میلی گرم هر ۳ تا ۴ ساعت

موارد منع مصرف: در حساسیت شدید دارویی، مامایی (حین زایمان)

⚠ عوارض جانبی مهم: مهار تنفسی، خواب‌آلودگی، تحریکات موضعی

پوست

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: بهتر است دارو عضلانی (IM) تزریق

شود. کاهش فشار محتمل است.

آموزش بیمار - خانواده: یبوست، خشکی دهان و خواب‌آلودگی محتمل

است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## متی مازول (METHIMAZOLE)

نام تجاری: Tapazole

گروه دارویی: تیوآمید

گروه درمانی: ضد پرکاری تیروئید

شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان پرکاری تیروئید، گواتر سمی

میزان مصرف: برای شروع درمان، ۳ تا ۱۰ قرص روزانه می‌تواند بین ۲ تا ۳ بار در روز تقسیم شود ولی ۱ تا ۳ قرص روزانه برای درمان درازمدت و نگهداری کافی است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: عوارض خونی و کبدی، به همراه کهیر، سردرد،

ضایعات جلدی، تهوع و استفراغ

توجهات پزشکی - پرستاری: کنترل وضعیت خونی ضروری است.

میزان هورمون تیروئید باید اندازه‌گیری شود. احتمال بروز مشکلات خونی وجود دارد.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت تب همراه گلو درد یا ضایعات

پوستی شدید به پزشک اطلاع دهید. دارو با غذا میل شود. درد شکم به

ویژه در ناحیه کبد با اهمیت تلقی می‌شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## متوترکسات (METHOTREXATE)

نام تجاری: Abitrexate

گروه دارویی: آنتی متابولیت

گروه درمانی: ضد سرطان، ضد رماتیسم

📌 شکل دارویی: قرص، داروی تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان‌های خونی (لوسمی) سرطان استخوان

(استئوسارکوم)، لنفوم، پسوریازیس، آرتریت روماتوئید

⚠️ میزان مصرف: طبق نظر متخصص متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بارداری، شیردهی،

نارسایی کبد و کلیه، اختلالات خونی

⚠️ عوارض جانبی مهم: کم‌خونی، زخم دهان، خونریزی گوارشی، دل‌درد،

بی‌اشتهایی، مشکلات کبدی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: - این دارو می‌تواند بسیار خطرناک باشد و

به عنوان داروی خط آخر استفاده شود. ممکن است فعالیت مغز

استخوان کاهش یابد.

آموزش بیمار - خانواده: استفراغ‌های مکرر پس از مصرف دارو را به

پزشک اطلاع دهید. کبودی‌های حین درمان را به پزشک اطلاع دهید.

بیمار نباید با مبتلایان به بیماری ویروسی یا افراد واکسینه شده با

ویروس زنده در تماس باشد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و در دمای معمولی نگهداری شود.

## متیل دوپا (METHYLDOPA)

نام تجاری: Dopamet

گروه دارویی: آنتی آدرنژیک

گروه درمانی: ضد فشارخون

📦 شکل دارویی: قرص ۲۵۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: فشار خون، سندرم رینود

⚖️ میزان مصرف: ۱ تا ۳ قرص روزانه مصرف می شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بیماران کبدی

⚠️ عوارض جانبی مهم: خواب آلودگی، اسهال، درد قلبی، زردی، درد عضله و  
مفصل

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: فشار خون بیمار باید کنترل شود.  
آزمایش های خونی بررسی شود.

آموزش بیمار - خانواده: خشکی دهان با مصرف مایعات یا آدامس  
برطرف می شود. ضعف و سرگیجه، اسهال یا یبوست علائم  
مسمومیت اند به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

تذکر: در بیماری رینود به علت مشکل عروقی در انتهای (دست و پا) در  
تماس با آب سرد یا هوای سرد تغییر رنگ اندام ایجاد می شود.

## متیل پردنیزولون (METHYL PRODNISOLONE)

نام تجاری: Depomedrol

گروه دارویی: گلوکوکورتیکوئید

گروه درمانی: ضدالتهاب

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: به عنوان داروی ضدالتهاب و در رماتیسم، نفريت

لوپوسی و حساسیت‌های شدید

میزان مصرف: ۲۰ تا ۲۰۰ میلی گرم - بسته به درد یا التهاب مفاصل متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، عفونت‌های قارچی و نوزادان نارس

عوارض جانبی مهم: بی‌خوابی، آتروفی (لاغری) موضعی پوست.

توجهات پزشکی - پرستاری: تزریق عضلانی نوع استات باید عمیق باشد. نوع استات برای مشکلات حاد مفید نیست.

آموزش بیمار - خانواده: مثل بقیه کورتون‌ها قطع ناگهانی دارو خطرناک است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## متوکلوپرامید (METOCLOPRAMID)

نام تجاری: plasil

گروه دارویی: پاراسمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: ضد تهوع، ضد استفراغ

شکل دارویی: قرص و آمپول و قطره 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: برگشت اسید معده به مری، درمان یا پیشگیری از استفراغ و استفراغ شیمی درمانی

میزان مصرف: یک قرص هر ۸ ساعت

موارد منع مصرف: خونریزی، انسداد روده، تشنج

عوارض جانبی مهم: علائم پارکینسون، سردرد، بی‌خوابی، تشنج، توهم،

اسهال، تکرر ادرار، علائم چشمی و مغزی

توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت تکرار تزریق باید دارو رقیق 

شود. رنگ دارو قبل از تزریق نباید عوض شود.

آموزش بیمار - خانواده: رانندگی بعد از مصرف دارو خطرناک است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## مترونیدازول (METRONIDAZOLE)

نام تجاری: Flagyl

گروه دارویی: نیترو ایمیدازول  
گروه درمانی: ضد باکتری، ضد آمیب  
شکل دارویی: قرص، شربت، تزریقی  
مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت‌های میکروبی (بی‌هوازی)، اسهال خونی،  
اندوکاردیت، عفونت شکمی

میزان مصرف: ۱۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم طی یک ساعت به  
عنوان میزان اولیه و ۷/۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم طی ۶ ساعت و  
حداکثر مصرف در ۲۴ ساعت ۴ گرم می‌باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، اختلالات خونی یا بیماری مغز  
عوارض جانبی مهم: مشکلات کبدی و کلیوی، تهوع، احساس سوزش  
مجاری ادراری، سرگیجه، سنکوپ، ضایعات پوستی، کهیر

توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش‌های خونی باید انجام شود.  
این دارو با لیتیوم تداخل دارویی دارد. تزریق وریدی دارو باید به  
آهستگی صورت گیرد. محلول قابل تزریق را باید در یخچال نگهداری  
کرد.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است دارو با معده خالی مصرف شود. در  
عفونت زنان با میکروب (تریکوموناس) می‌بایست همسر وی نیز درمان  
شود. تشنج و علائم منگی نشانه مسمومیت بیمار است، به پزشک  
مراجعه شود.

شرایط نگهداری: محلول مترونیدازول به مدت سه شبانه روز قابل  
نگهداری در دمای معمولی است.

## میکونازول (MICONAZOLE)

نام تجاری: Daktarin

گروه دارویی: ایمیدازول

گروه درمانی: ضد قارچ

Ⓢ شکل دارویی: کرم موضعی (جلدی) و داخل واژن

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان عفونت‌های قارچی پوست و ناخن و عفونت زنان

Ⓜ میزان مصرف: ۲ بار در روز استفاده می‌شود.

موارد منع مصرف: مورد خاصی مطرح نشده است.

⚠ عوارض جانبی مهم: در موارد جلدی و استفاده از کرم، ضایعات پوستی و

احساس سوزش و قرمزی بروز می‌کند ولی در موارد تزریق وریدی،

اسهال، استفراغ، تب و خواب‌آلودگی بروز می‌کند.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: نوع کرم واژینال یک‌بار در شب به مدت

یک هفته استفاده شود و دوره درمان می‌تواند تکرار شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو طبق دستور استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## میدازولام (MIDAZOLAM)

نام تجاری: Dormicum

گروه دارویی: بنزودیازپین‌ها

گروه درمانی: آرام‌بخش، داروی کمکی در بیهوشی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: آرام‌بخش، کاهش اضطراب، نگهداری و کمک بیهوشی

عمومی، درمان تشنج، سکسکه مقاوم به درمان

میزان مصرف: ۰/۰۷ تا ۰/۰۸ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم - در تزریق

عضلانی، ۰/۰۳ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، گلوکوم زاویه باریک،

شوک، کوما، مسمومیت حاد با الکل، نارسایی کلیه

عوارض جانبی مهم: توقف تنفسی، مهمترین عارضه می‌باشد. راش،

تحریک‌پذیری، بی‌قراری، لارنگواسپاسم (اسپاسم مجاری هوایی)،

سردرد، تندی نفس، لکنت زبان، تاری دید، اختلال چشمی، اختلال

تعادل

توجهات پزشکی - پرستاری: میزان تجویز دارو در سنین بالا

(سالندان) و در اطفال باید پایین‌تر باشد.

تزریق عضلانی دارو باید عمیق باشد.

آموزش بیمار - خانواده: اختلالات روانی و حرکتی بعد از دارو محتمل

است. تا ۲۴ ساعت بعد از دریافت دارو بیمار نباید به کارهای دقیق

مشغول باشد یا رانندگی کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## مینوکسیدیل (MINOXIDIL)

نام تجاری: Loniten

گروه دارویی: ضد فشار خون

گروه درمانی: گشاده کننده عروق

شکل دارویی: قرص ۱۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون بالا اصلی ترین ضرورت درمان می باشد. هر چند این دارو، داروی اصلی فشار خون های معمولی نیست بلکه در موارد فشارخون مقاوم کارایی دارد و در ترکیب با داروهای دیگر استفاده می شود.

⚠️ میزان مصرف: با ۵ میلی گرم در روز شروع می شود و به تدریج افزایش می یابد.

موارد منع مصرف: مینوکسیدیل برای افرادی که به آن حساسیت شدید دارند یا آنوریسم ائورت دارند برای مبتلایان به بیماری فنوکروموسیتوما منع مصرف دارد.

☠️ عوارض جانبی مهم: افزایش تعداد ضربان قلب، ادم، پرمویی، تهوع، استفراغ، سردرد، خستگی و قاعدگی زود به زود

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید.

مینوکسیدیل اغلب به همراه ایندرال یا متیل دوبا مصرف می شود.

آموزش بیمار - خانواده: قطع ناگهانی دارو خطرناک است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## میترامایسین (MITHRAMAYCIN)

نام تجاری: Mitramyc II

گروه دارویی: ضد سرطان

گروه درمانی: آنتی بیوتیک، ضد هیپرکلسمی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: درمان بالا بودن کلسیم خون، هیپرکلسمیوری شدید، دفع

ادراری کلسیم، سرطان بیضه

میزان مصرف: ۱۵ تا ۲۵ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

موارد منع مصرف: اختلالات انعقادی، اختلال الکترولیتی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، استوماتیت، اختلالات

الکترولیتی اختلال کلیوی

توجهات پزشکی - پرستاری: آزمایش‌های کلیوی انجام شود. ⚠

سلول‌های خونی، پلاکت باید شمارش شوند. مصرف دارو همزمان در

مبتلایان به آبله‌مرغان و زونا ممنوع است.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه کبودی و خونریزی زیر جلدی را به

پزشک اطلاع دهید. - در خانه بیمار نباید کسی واکسن زنده دریافت کند.

تب و گلودرد را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: ویال آن در یخچال نگهداری شود.

## مورفین (MORPHINE)

نام تجاری: Astramorph

گروه دارویی: فنانترن

گروه درمانی: مخدر، ضد درد

شکل دارویی: قرص و تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: دردهای خفیف تا متوسط، القای بیهوشی، اِدم حاد ریه

⚠ میزان مصرف: ۱۰ میلی گرم هر ۴ ساعت

موارد منع مصرف: در نارسایی تنفسی، انسداد راه هوایی، حساسیت شدید دارویی، اختلالات تشنجی، ضربات سر، ضربه مغزی (اختلال هشیاری)، آسم

☠ عوارض جانبی مهم: استفراغ، تهوع، خواب‌آلودگی، خارش، مهار تنفسی،

شوک، کوما، احتباس ادراری، بی‌قراری، کاهش فشار خون

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در افراد سالمند میزان دارو باید کاهش یابد.

آموزش بیمار - خانواده: توقف تنفسی، شلی شدید عضلات و کاهش

فشار خون علائم مسمومیت‌اند به پزشک اطلاع داده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## مولتی ویتامین (MULTIVITAMIN)

گروه دارویی: مولتی ویتامین

گروه درمانی: مکمل غذایی

📦 شکل دارویی: قرص، کپسول، شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: این دارو حاوی ویتامین‌های A، D، E، B<sub>1</sub>، B<sub>2</sub>، B<sub>6</sub>، B<sub>12</sub> و نیکوتینیک اسید، ویتامین C، کلسیم و بیوتین است.

⚖️ میزان مصرف: یک قرص روزانه یا ۵ سی‌سی شربت یا یک کپسول  
موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: مصرف خودسرانه ویتامین‌ها ممنوع است. زیرا  
میزان بالای آنها پرعارضه خواهد بود.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: کودکان با سوءتغذیه، مادران باردار و  
شیرده نیاز به برنامه خاص دارند.

آموزش بیمار - خانواده: طبق دستور پزشک دارو مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

تذکر: دو نوع مولتی ویتامین به همراه آهن یا املاح، ترکیب مشابه است.

## نافیسیلین (NAFICILIN)

نام تجاری: Unipen

گروه دارویی: پنی سیلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های میکروبی (میکروب استاف طلائی)، سلولیت، عفونت استخوانی، پنومونی، آبسه مغزی، اندوکاردیت، عفونت نوزادان

میزان مصرف: در بالغین ۵۰۰ میلی گرم و ۴ تا ۶ ساعت وریدی یا عضلانی

موارد منع مصرف: مثل پنی سیلین ها

عوارض جانبی مهم: ضایعات پوستی، علائم گوارشی و شکایاتی مثل دیگر آنتی بیوتیک های گروه پنی سیلین

توجهات پزشکی - پرستاری: بیمار نباید سابقه حساسیت به گروه 

پنی سیلین ها را داشته باشد. می بایست کشت و آنتی بیوگرام تهیه شود. آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز علائم افزایشی حساسیت موضوع را به پزشک اطلاع دهید. تهوع، استفراغ و اسهال جزء علائم حساسیت شدید دارویی محسوب می شود. دارو در زمان مشخص مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## نالیدیک اسید (NALIDIXIC - ACID)

نام تجاری: Negram

گروه دارویی: کینولون ها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قرص، شربت

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت ادراری

میزان مصرف: ۱ گرم ۴ بار در روز به مدت ۱ الی ۲ هفته

موارد منع مصرف: در حاملگی (به ویژه سه ماه اول)، تشنج،

شیرخواران، نارسایی کلیه و کبد

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، بی خوابی، عدم تعادل، سرگیجه،

سنگوپ، ضعف

توجهات پزشکی - پرستاری: - پس از درمان، آزمایش های خونی

ضروری است. کشت و آنی بیوگرام قبل از شروع درمان ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: - مصرف دارو قبل از غذا یا ۲ ساعت بعد از غذا

باعث جذب بهتر می شود. زمینه بروز حساسیت به نور را افزایش

می دهد.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## نالوکسان (NALOXAN)

نام تجاری: Narcan

گروه دارویی: اکسی مورفون

گروه درمانی: ضد اپیوئیدها - ضد مخدرها

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: تشخیص و درمان مسمومیت‌های با مواد مخدر یا کومای ناشی از آن، درمان مهار تنفسی بعد از جراحی، خارش ناشی از انسداد صفراوی

میزان مصرف: ۰/۴ تا ۲ میلی گرم وریدی یکجا تزریق می‌شود.

موارد منع مصرف: در افرادی که وابستگی شدید به مخدرها دارند، با احتیاط استفاده شود.

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اختلال تمرکز و حواس، بی‌اشتهایی، تغییرات فشار خون

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو اغلب در مراکز اورژانس و بیمارستانی تزریق می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: مورد خاصی مطرح نیست.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## ناندرولون (NANDROLONE)

نام تجاری: Darabolin

گروه دارویی: استروئید

گروه درمانی: آنابولیک

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان کم‌خونی ناشی از بیماری‌های کلیوی، درمان سرطان پستان (به صورت کمکی) و با توجه به خاصیت تستسترونی در ورزشکاران به ویژه رشته بدنسازی برای افزایش حجم عضلات

میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم ۱ تا ۳ هفته در خانم‌ها و ۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم ۱ تا ۴ هفته در آقایان تزریق می‌شود.

موارد منع مصرف: در حساسیت شدید دارویی و مردان دچار سرطان پستان و پروستات و ضایعه التهابی کلیه (نفريت) و زنان دچار سرطان سینه و دچار افزایش سطح کلسیم سرم

عوارض جانبی مهم: پرمویی در صورت، کوچک شدن اندازه سینه‌ها، آکنه، پرمویی بدن، تهوع، استفراغ، افزایش اشتها، طاسی سر، مشکلات قاعدگی، نکروز کبدی، تغییر خلق و خو، افسردگی

توجهات پزشکی - پرستاری: در سنین قبل از بلوغ ممنوع است. سطح کلسیم سرم باید کنترل شود. تست‌های کبدی انجام شود.

آموزش بیمار یا خانواده: به بیمار توصیه کنید آهن کافی مصرف کند. در صورت تهوع یا استفراغ شدید به پزشک اطلاع دهید. شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.



## نفازولین (NAPHAZOLINE - ANTAZOLINE)

نام تجاری: Albalon

گروه دارویی: آنتی هیستامین

گروه درمانی: ضداحتقان و حساسیت

شکل دارویی: قطره چشمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در موارد پرخونی چشم، ترشحات بینی، خارش و قرمزی چشم

میزان مصرف: یک قطره هر ۸ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و افزایش فشار داخل کره چشم

عوارض جانبی مهم: سوزش چشم، حساسیت موضعی

توجهات پزشکی - پرستاری: در موارد خفیف قرمزی و حساسیت شدید چشم استفاده می شود.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف خودسرانه یا بیش از اندازه دارو مضر است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

تذکر: این دارو به شکل چشمی و قطره بینی وجود دارد.

## ناپروکسن (NAPROXEN)

نام تجاری: Naprosyn

گروه دارویی: اسید پروپیونیک

گروه درمانی: ضد درد، ضد التهاب، غیراستروئیدی

📦 شکل دارویی: قرص ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: رماتیسم، آرتروز، دردهای استخوانی، حمله حاد نقرس،

سر دردهای میگرنی

⚠️ میزان مصرف: ۱ تا ۴ عدد روزانه و بنابر شدت درد متفاوت است.

موارد منع مصرف: خونریزی حاد گوارشی، زخم معده فعال، حاملگی

سه ماه سوم، آسم، حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: ناراحتی‌های معده و روده و خونریزی، تهوع،

استفراغ، عوارض کلیوی، اختلالات خونی، تب، سرگیجه، سردرد،

بی‌خوابی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: برای کاهش تحریک معده، به همراه دارو

یک لیوان آب، شیر، داروهای رانتیدین یا آلومینیوم ام. جی استفاده شود.

آموزش بیمار - خانواده: برای کاهش خونریزی بعد از عمل یک هفته

قبل از عمل مصرف آن قطع شود. در صورت بروز مشکلات شنوایی یا

خواب‌آلودگی شدید اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## نئومایسین (NEOMYCIN)

نام تجاری: Mycifradin

گروه دارویی: آمینوگلیکوزید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قرص و محلول خوراکی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: آمادگی قبل از عمل جراحی و کاهش میکروب‌های روده‌ای

میزان مصرف: ۵۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم تقسیم در ۴ مرحله روزانه (هر ۶ ساعت)

موارد منع مصرف: مثل جنتامایسین (صفحه ۳۵۳)، در حساسیت شدید دارویی و نارسایی کلیه

عوارض جانبی مهم: تهوع و مشکلات گوارشی، سوء جذب و عوارض عضلانی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در نارسایی کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود. آزمایش‌های کارکرد کلیه حتماً کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: نوع موضعی آن با عوارض آلرژیک همراه است. در صورت بروز مشکلات گوشی به پزشک اطلاع دهید.  
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## نیکلوزامید (NICLOSAMID)

نام تجاری: Niclicide

گروه دارویی: سالیسیلانیلید

گروه درمانی: ضد انگل (کرم)

📌 شکل دارویی: قرص جویدنی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در درمان کرم‌های نواری مثل تینیا (سازیناتایاسولیوم)

⚠️ میزان مصرف: ۲ گرم یک بار بعد از صبحانه (فقط)

موارد منع مصرف: در حساسیت شدید دارویی و سیستی سرکوزیس  
منع مصرف دارد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، سرگیجه، اسهال، ریزش مو، تورم بازو، کمردرد، کهیر و احساس سردرد شدید

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: برای اثربخشی دارو به فاصله یک ماه و

سه ماه آزمایش مدفوع انجام شود. آزمایش‌های کبدی انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: این قرص باید خوب جویده شود. هر گونه سرگیجه شدید را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

## نیفیدیپین (NIFEDIPINE)

نام تجاری: Adalate

گروه دارویی: بلوک‌کننده کانال کلسیم

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: کپسول، قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان فشار خون، ضد درد قلبی و دردها

میزان مصرف: ۳۰ تا ۹۰ میلی گرم روزانه در فشار خون و در حملات

حاد فشار خون ۱۰ میلی گرم به شکل زیرزبانی یا خوراکی استفاده

می‌شود و تکرار آن هر ۴ تا ۶ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، سکته قلبی اخیر، نارسایی

کبد و کلیه

عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، استفراغ، سرگیجه، کاهش فشار خون،

سنکوپ، بی‌نظمی ریتم قلبی، خواب‌آلودگی، شب‌ادراری، سردرد

توجهات پزشکی - پرستاری: - فشار خون بیمار را کنترل کنید. هنگامی

که در حمله حاد فشار خون از کپسول آن استفاده می‌شود ممکن است

سنکوپ بروز کند. تغییرات قندخون احتمال دارد.

آموزش بیمار - خانواده: سرگیجه، تپش قلب، تهوع و استفراغ شدید و

فشار خون بالا علائم مسمومیت است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## نیترو فورانتوئین (NITROFURANTION)

نام تجاری: Furadantin

گروه دارویی: نیترو فوران

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

⑤ شکل دارویی: شربت، قرص

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های ادراری

⚠ میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم، ۴ بار در روز همراه با غذا

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیه

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، نورپاتی محیطی (بی حسی یا

گرختی در اندام ها)، درد سینه، تب، سرفه، ضایعات پوستی، تغییر رنگ

ادرار

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: قبل از شروع درمان نمونه را کشت دهید

و آنتی بیوگرام را انجام دهید.

آموزش بیمار - خانواده: دو مسئله مهم مثل تغییر رنگ ادرار و دندان

ممکن است بروز کند. بهتر است دارو با مایعات میل شود. ضعف

عضلانی را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## نیتروفورازون (NIROFURAZON)

نام تجاری: Furacin

گروه دارویی: نیتروفوران

گروه درمانی: آنتی بیوتیک موضعی

شکل دارویی: کرم موضعی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت‌های سطحی پوست، سوختگی‌ها

میزان مصرف: کرم ۲ درصد را به طور موضعی مستقیماً بر روی زخم یا محل سوختگی قرار دهید.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی یا فاویسم (کمبود آنزیم (G6PD))

عوارض جانبی مهم: ضایعات جلدی، خارش، تورم موضعی

توجهات پزشکی - پرستاری: عفونت‌های ثانویه محتمل است. در صورت خوردن کرم، به فکر مسمومیت دارویی باشید.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز حساسیت موضعی دارو را قطع کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

نکته: در افرادی که کمبود آنزیم (G6PD) وجود دارد این افراد به بعضی از داروها مثل کوتریمکسازول، نفتالین، باقلای (مازندرانی) حساس‌اند و دچار مشکل خونی می‌شوند.

## نیتروگلیسرین (NITROGLYCERIN)

نام تجاری: Nitrocontin

گروه دارویی: نیترات‌ها

گروه درمانی: ضد درد قلبی، ضد فشار خون

⑨ شکل دارویی: قرص، تزریقی، اسپری، پماد

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان پیشگیری از دردهای قلبی (آنژین قلبی)، در نارسایی مزمن قلب، انفارکتوس حاد میوکارد، اسپاسم منتشر ریه، فشار خون حاملگی

⚠ میزان مصرف: میزان مصرف قرص: یک قرص زیرزبانی و تکرار آن ۵ دقیقه بعد ولی پماد آن ۲ تا ۳ بار در روز بر روی سینه مالیده شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، کاهش فشار خون، کم‌خونی شدید، بالا بودن فشار داخل مغزی

⚠ عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، بی‌قراری، خستگی، رنگ‌پریدگی و در پماد خارش و تاؤل جزء عوارض موضعی است.

⚠ توجهات پزشکی یا پرستاری: علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید. در صورت تهوع، تعریق یا کاهش فشار خون به فکر مسمومیت باشید.

آموزش بیمار - خانواده: قرص نیتروگلیسرین را با معده خالی مصرف کنید. از قطع ناگهانی دارو خودداری نمایید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.



## نیتروپروساید (NITROPRUSSIDE)

نام تجاری: Nipride

گروه دارویی: ضد فشار خون‌ها

گروه درمانی: گشادکننده عروق

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حملات حاد فشار خون، نارسایی قلب، سکتۀ قلبی در حین جراحی

میزان مصرف: حداکثر میزان مصرف ۵۰۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می‌باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، کاهش فشارخون، مشکل عروقی مغز، نارسایی کلیه و کبد

عوارض جانبی مهم: سردرد، تعریق، سرگیجه، تغییرات هوشیاری، گرگرفتگی، تحریک جلدی

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو به نور حساس است و باید دارو با ورق آلومینیوم پوشانده شود. محلول تازه به رنگ قهوه‌ای کم‌رنگ است.

آموزش بیمار - خانواده: مراقبت مسمومیت دارویی باشید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.

## نور تریپتیلین (NORTRIPTYLINE)

نام تجاری: Arentyl

گروه دارویی: ضد افسردگی سه حلقه‌ای

گروه درمانی: ضد افسردگی

شکل دارویی: قرص، کپسول

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: ضد افسردگی، ضد ترس روانی (پانیک)، دردهای

عصبی، شب‌ادراری، سردرد میگرنی

میزان مصرف: با ۲ قرص روزانه شروع و طی ۳ هفته آن را افزایش دهید.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: شبیه آمی‌تریپتیلین (صفحه ۵۲) ولی شدت عوارض بسیار کمتر است.

توجهات پزشکی - پرستاری: به آمی‌تریپتیلین مراجعه شود.

آموزش بیمار - خانواده: به آمی‌تریپتیلین مراجعه شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## نیستاتین (NYSTATIN)

نام تجاری: mycostatin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: ضد قارچ

شکل دارویی: قرص، کپسول، پماد و قرص واژینال

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت‌های قارچی (کاندیدا) ناحیه واژن یا مخاط دهان

یا پوست و مری، عفونت برفکی دهان کودکان

میزان مصرف: قرص واژینال ۱۰۰ هزار واحد یک بار در شب و به

مدت دو هفته - در نوزادان به علت عفونت قارچی دهان هر ۶ ساعت از

سوسپانسیون (شربت) استفاده می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، حاملگی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، اسهال، حساسیت موضعی

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو عوارض شدیدی به همراه ندارد.

برای درمان کاندیدیاز می‌توان از قرص واژینال به صورت خوراکی

استفاده کرد.

آموزش بیمار - خانواده: در عفونت‌های کاندیدای چین‌های بدن مثل

زیر بغل و کشاله ران از کرم استفاده شود. در صورت مرطوب بودن

عفونت لای انگشتان از پودر استفاده کنید.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

## اُفلوکساسین (OFLOXACIN)

نام تجاری: Tarivid

گروه دارویی: فلوروکینولون

گروه درمانی: آنتی بیوتیک‌ها

📦 شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: این دارو شبیه سیپروفلوکساسین است و در درمان عفونت‌های ریوی مثل برونشیت، پنومونی (عفونت ریه)، عفونت پوست، استخوان و پروستات استفاده می‌شود.

💊 میزان مصرف: اغلب ۴۰۰ میلی‌گرم ۲ بار در روز به مدت ۱۰ روز

موارد منع مصرف: حساسیت دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، سردرد، بی‌خوابی، اسهال، حساسیت

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی و کلیوی انجام شود. در نارسایی کلیه میزان دارو تنظیم شود. آنتی‌اسید به همراه آن تجویز نکنید.

آموزش بیمار - خانواده: زمینه بروز حساسیت به نور را افزایش می‌دهد. بهتر است دارو با معده خالی استفاده شود. هرگونه سرگیجه یا اسهال شدید را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی مطلوب است ولی محلول تزریقی تا ۱۴ روز در یخچال قابل نگهداری است.

## امپرازول (OMEPRAZOLE)

نام تجاری: Losec

گروه دارویی: مهارکننده پمپ هیدروژن

گروه درمانی: ضد ترشح اسید معده

📦 شکل دارویی: کپسول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان زخم معده یا افزایش ترشح اسید معده، ترش کردن، زخم روده

⚖️ میزان مصرف: در زخم روده ۱ تا ۲ قرص روزانه به مدت ۴ هفته و در زخم معده ۸ هفته

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبد و نارسایی کلیه

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، سرگیجه، بی‌قراری، افسردگی، تاری دید، مشکل کلیوی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: توصیه کنید دارو قبل از صبحانه میل شود. ممکن است با درد عضلانی یا مفصلی همراه شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو بهتر است قبل از غذا مصرف شود. همزمان با آنتی‌اسید هم می‌توان میل کرد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و دمای معمولی نگهداری شود.

## اکسازپام (OXAZPAM)

نام تجاری: Serax

گروه دارویی: بنرودیازپین ها

گروه درمانی: ضداضطراب

📌 شکل دارویی: قرص ۱۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: آرام بخش، اختلالات اضطرابی، بی خوابی

⚠️ میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص ۳ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، در پورفیری و در

مسمومیت با الکل منع مصرف دارد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، خواب آلودگی، کاهش فشار خون، زردی،

خارش پوست

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: کنترل تست های خونی و کبدی ضروری

است. در دوره حاملگی و شیردهی توصیه نمی شود.

آموزش بیمار - خانواده: دارو را بهتر است با غذا مصرف کنید. اختلال

خواب جزء عوارض نادر است. در هنگام مصرف از رانندگی اجتناب شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## اکسی بوتینین (OXYBUTYNIN)

نام تجاری: Ditropan

گروه دارویی: آمین نسل سوم

گروه درمانی: ضد اسپاسم

📦 شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درد و تحریک مثانه و شبادراری، بی اختیاری ادراری

🕒 میزان مصرف: یک قرص ۲ تا ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، میاستنی گراویس، انسداد

روده، نارسایی کلیه

⚠️ عوارض جانبی مهم: تب، سردرد، تهوع، تاری دید، یبوست، سرگیجه،

افزایش ضربان قلب، میدریاز (باز شدن مردمک چشم)، کاهش میل

جنسی مردان

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تشنج و تحریک پذیری از علائم

مسمومیت است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت علائم خواب آلودگی و اختلال

هشیاری به پزشک اطلاع دهید. خشکی دهان از عوارض شایع است از

آدامس یا آب نبات استفاده شود.

شرایط نگهداری: دمای معمولی مطلوب است.

## اکسی متولون (OXYMETHOLON)

نام تجاری: Anadrol

گروه دارویی: استروئید آنابولیک

گروه درمانی: ضدکم خونی

شکل دارویی: قرص ۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان کم خونی، تقویت عضلات و افزایش آنابولیسم -

در ورزشکاران حرفه‌ای بدنسازی از آن سوءاستفاده می‌شود.

میزان مصرف: ۱ تا ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: شبیه ناندرولون (صفحه ۴۵۵)

توجهات پزشکی - پرستاری: شبیه ناندرولون

آموزش بیمار - خانواده: شبیه ناندرولون

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.



## اکسی توسین (OXYTOCIN)

نام تجاری: Syntocinon

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: ضد شلی رحمی (عامل انقباضات رحمی)

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: جهت تحریک انقباضات رحمی برای پیشگیری از خونریزی بعد از زایمان و تحریک ترشح شیر

میزان مصرف: ۱۰ تا ۲۰ واحد در محلول رینگر لاکتات

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، ممنوعیت زایمان طبیعی  
✳️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، افزایش سرعت ضربان قلب، حساسیت شدید، عوارض قلبی و برای جنین می‌تواند مرگ را به دنبال بیاورد.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: در هنگام تزریق، سرعت انقباضات رحمی را کنترل کنید. میزان مصرف مایعات و سرم و ادرار را اندازه بگیرید. مسمومیت با آب و تشنج جزء عوارض جدی است.  
آموزش بیمار - خانواده: هرگونه حالت غیرعادی را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## پانکراتین (PANCRATIN)

نام تجاری: Dizymes

گروه دارویی: آنزیم

گروه درمانی: هضم‌کننده‌ها


شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کمبود آنزیم پانکراتین، سرطان لوزالمعده، درمان بعد از جراحی برداشت روده

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص همراه با غذا

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، استفراغ 

توجهات پزشکی - پرستاری: کاهش حرکات گوارشی و سفت شدن 

مدفوع جزء علائم جواب به درمان است

آموزش بیمار - خانواده: دارو قبل از غذا مصرف شود. از جویدن قرص پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## پدیا تریک گریپ (PEDIATRIC GRIPE)

نام تجاری: Histopharmin

گروه دارویی: آنتی هیستامین ها

گروه درمانی: ضد سرما خوردگی اطفال

📌 شکل دارویی: شربت

مصرف در حاملگی: گروه نامعلوم

موارد مصرف: سرماخوردگی و ترشحات بینی و سینوزیت اطفال، التهاب گوش

🕒 میزان مصرف: ۸ تا ۱۰ سی سی ۳ تا ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

⚠️ عوارض جانبی مهم: این دارو ترکیبی از کلرفنیرامین مالئات و فنیل افرین و فنیل پروپانولامین کلراید می باشد که خواب آلودگی جزء عوارض این گروه است.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: مشکل خاصی وجود ندارد.

آموزش بیمار - خانواده: مورد خاصی مطرح نیست.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## پنی سیلامین (PENICILLAMINE)

نام تجاری: Cuprimine

گروه دارویی: شلات‌کننده

گروه درمانی: ضد مسمومیت با فلزات سنگین

Ⓢ شکل دارویی: قرص ۲۵۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان مسمومیت با سرب، مس، جیوه

⚠ میزان مصرف: متفاوت است.

موارد منع مصرف: در حساسیت شدید، بیماری لوپوس و سابقه

مشکلات خونی منع مصرف دارد.

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، زخم دهان، حساسیت پوستی،

کم‌خونی، ضایعات کلیوی، اختلال عملکرد کبد، ریزش مو، درد عضلانی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی کلیوی و خونی ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است با معده خالی استفاده شود. در

درمان بیمار رماتیسمی استفاده می‌شود. هرگونه کبودی پوست و زیر

جلد را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی ۱۵ تا ۳۰ نگهداری شود.

## پنی سیلین ها (PENICILLINS)

نام تجاری: Beepen

گروه دارویی: آنتی بیوتیک ها

گروه درمانی: ضد میکروب ها

شکل دارویی: قرص، شربت، تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان عفونت های ریوی، عفونت پرده مغز (مننژیت)،

دیفتری، سیفلیس

میزان مصرف: انواع پنی سیلین V، بنزاتین، پنی سیلین G و 800,000 و

پنی سیلین 6.3.3 در انواع عفونت ها کاربرد دارند از آنژین چرکی تا

عفونت های شکمی یا ریوی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: حساسیت شدید، تهوع، استفراغ، تشنج، کوما،

عوارض خونی، آبسه استریل محل تزریق، واکنش پوستی، تب

توجهات پزشکی - پرستاری: حساسیت به پنی سیلین اغلب به نوع

تزریقی بروز می کند و در نوع خوراکی اندک است. سابقه حساسیت بیمار

به آن را از بیمار پرسید. عملکرد کلیه و کبد بیمار باید کنترل شود.

آموزش بیمار - خانواده: بعد از تزریق به مدت ۳۰ دقیقه تحت نظر

باشید.


شرایط نگهداری: دمای اتاق مناسب است.

## پنتازوسین (PENTOZOCINE)

نام تجاری: Talwin

گروه دارویی: بنزومورفان

گروه درمانی: مخدر

شکل دارویی: تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ضد درد متوسط یا شدید

میزان مصرف: ۳۰ تا ۶۰ میلی گرم هر ۳ تا ۴ ساعت

موارد منع مصرف: در انفارکتوس قلبی، نارسایی قلبی، فشار خون بالا

✳ عوارض جانبی مهم: درد محل تزریق و علائم خواب‌آلودگی و کاهش

هشیاری، عوارض خونی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: با داروهای آمینوفیلین و باربیتورات و

هپارین تداخل اثر دارد. سیگار متابولیسم پنتازوسین را افزایش می دهد.

آموزش بیمار - خانواده: خواب‌آلودگی شدید در پی دارد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## پرفنازین (PERPHENAZINE)

نام تجاری: Trilafon

گروه دارویی: پی پرازین

گروه درمانی: درمان سایکوز

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اختلال روانی شدید مثل بیماری اسکیزوفرنی، اضطراب شدید، تهوع و استفراغ شدید، افسردگی همراه با اضطراب

میزان مصرف: ۴ تا ۸ میلی گرم ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: بنزودیازپین ها

عوارض جانبی مهم: علائم خواب آلودگی و آرام بخشی، خشکی دهان، تهوع

توجهات پزشکی - پرستاری: - برای حصول اثر سریع دارویی، شکل تزریقی آن را استفاده کنید.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت بروز علائم شدید خواب آلودگی یا حساسیت دارویی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: دور از نور و در دمای طبیعی نگهداری شود.

## پتیدین (PETHIDIN)

نام تجاری: Dolantin

گروه دارویی: فنیل پیریدین

گروه درمانی: مخدر

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B و D در حوالی زمان زایمان

موارد مصرف: درد متوسط و شدید و قبل از عمل و کمک بیهوشی

میزان مصرف: ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم عضلانی یا زیر جلد یا آهسته

وریدی هر ۴ ساعت

موارد منع مصرف: در آسم، حساسیت شدید دارویی، تشنج، افراد پیر و

نارسایی کبد و کلیه

⚠ عوارض جانبی مهم: خواب‌آلودگی، یبوست، تشنج، خشکی دهان و...

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: تزریق زیر جلدی به علت درد توصیه

نمی‌شود. علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید. برای تزریق وریدی در سرم

نرمال‌سالین یا سرم دکستروز رقیق کنید.

آموزش بیمار - خانواده: به علت خواب‌آلودگی کار دقیق و رانندگی

ممنوع است. در تزریق سرپایی، بیمار باید با همراه یا ویلچر جابه‌جا

شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



## فنوباربیتال (PHENOBARBITAL)

نام تجاری: Silfoten

گروه دارویی: باربیتورات‌ها

گروه درمانی: ضد تشنج

شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان تشنج (صرع)، تشنج نوزادی یا تشنج به دنبال ضربه، کنترل تشنج زمان حاملگی و به عنوان بی‌حس‌کننده موضعی

میزان مصرف: در کنترل تشنج ۱۵ تا ۲۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم طی ۱۰ تا ۳۰ دقیقه انفوزیون وریدی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیه، کبد، پورفیری

عوارض جانبی مهم: خواب‌آلودگی، اختلال هشیاری، اختلال خونی، ضایعات حساسیتی موضعی، سردرد، بی‌قراری، اضطراب

توجهات پزشکی - پرستاری: کاهش فشار خون و اختلال تنفس و افزایش ضربان قلب جزء علامت مسمومیت است. قرص نباید جویده شود.

آموزش بیمار - خانواده: نوع تزریقی برای افرادی استفاده می‌شود که قادر به استفاده از انواع خوراکی نیستند.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## فنی توئین (PHENYTOIN)

نام تجاری: Dilantin

گروه دارویی: هیدانتوئین‌ها

گروه درمانی: ضد تشنج

📌 شکل دارویی: شربت، کپسول و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: تشنج، بی‌نظمی‌های ریتم قلبی (آریتمی)، تشنج در

حاملگی، سکسکه مقاوم

⚠️ میزان مصرف: در انواع صرع متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، اختلال قلبی (بلوک قلبی)،

نارسایی کبدی

⚠️ عوارض جانبی مهم: تزریق عضلانی آن به علت درد و آسیب محل

تزریق توصیه نمی‌شود. مهار توانایی مغز و کاهش فشار خون، سردرد،

کاهش اشتها

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: بدون تجویز پزشک نباید مصرف شود.

جابه‌جایی داروهای ضد تشنج باید تحت نظر متخصص انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: شربت را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

این دارو باعث خواب‌آلودگی می‌شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق و در جای خشک نگهداری شود.

تذکر: کامپاند آن ترکیب فنی توئین و فنوباریتال می‌باشد. نوع کرم

موضعی آن در زخم بستر، خراش پوستی و آبسه‌های بزرگ مفید است.

## پیپرازین (PIPRAZINE)

نام تجاری: Nootropil

گروه دارویی: پیپرازین

گروه درمانی: ضد کرم

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: کرم‌های گرد یا نماتودها (آسکاریس، کرمک، استرونتیلوس)

میزان مصرف: یک بار  $5/4$  گرم خوراکی و در کرم‌های نخی یا کرمک  $2/6$  گرم در روز تا یک هفته

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبد و کلیه  
⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، تشنج، استفراغ، دل‌درد، ضعف عضلانی، سردرد

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو برای کودکان در درازمدت سمی خواهد بود.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است دارو با غذا میل شود. اختلالات پوستی مثل کهیر و خارش را به پزشک اطلاع دهید. دوره درمان را کاملاً رعایت کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

## پيروکسيکام (PIROXICAM)

نام تجاری: Feldene

گروه دارویی: اکسیکام

گروه درمانی: ضد درد (غیراستروئیدی)

📌 شکل دارویی: کپسول، پماد (ژل)، تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: دردهای اسکلتی - عضلانی، رماتیسم مفصلی، رماتیسم  
جوانان

⚠️ میزان مصرف: ۲ کپسول روزانه و قابل افزایش است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، زخم فعال معده و روده،  
مشکلات خونریزی دهنده

⚠️ عوارض جانبی مهم: فلج عصب سیاتیک، عوارض گوارشی، زخم معده،  
تنوع نوع تزریقی آن باعث عوارض موضعی و فلج عصب سیاتیک شده  
که مصرف آن توسط وزارت بهداشت ممنوع شده است.

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: تست کبدی و کلیوی ضروری است. دارو  
با غذا استفاده شود.

آموزش بیمار - خانواده: خواب آلودگی شدید، خستگی و سرگیجه را به  
پزشک اطلاع دهید. دارو را با یک لیوان آب مصرف کنید.


شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## پلی میکسین (POLYMXIN)

نام تجاری: Aerospooiin

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

گروه درمانی: ضد باسیل گرم منفی

شکل دارویی: محلول چشمی 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان عفونت چشمی و میکروب‌های مقاوم در ملتحمه و قرنیه چشم

میزان مصرف: ۱ تا ۳ قطره چشمی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید و نارسایی کلیه

⚠ عوارض جانبی مهم: تزریق آن دردناک است، سرگیجه، ضایعات پوستی و مشکلات کلیوی از عوارض عمده آن است.

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: الزاماً با نظر متخصص مصرف شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت هرگونه آلرژی به پزشک اطلاع دهید.


شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## پرازوسین (PRAZOSIN)

نام تجاری: Minipess

گروه دارویی: بلوک‌کننده گیرنده آلفا

گروه درمانی: گشادکننده عروق، ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون خفیف تا متوسط

میزان مصرف: ۱ تا ۲ میلی گرم ۲ تا ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: خشکی دهان، اسهال، درد شکم، خونریزی از بینی،

درد عضله و استخوان، تاری دید، ضعف و خواب‌آلودگی

توجهات پزشکی - پرستاری: علائم حیاتی بیمار کنترل شود. احتمال 

سنکوپ در میزان بالای دارو شایع است.

آموزش بیمار - خانواده: بدون اجازه پزشک دارو به طور ناگهانی قطع

نشود. بار اول دارو در شب میل شود. خشکی دهان جزء عوارض شایع

است آدامس یا آب‌نبات استفاده کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## پردنیزولون (PREDNISOLONE)

نام تجاری: Delta- cortef

گروه دارویی: کورتون

گروه درمانی: ضدالتهاب

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: التهاب موضعی و موارد بیماری‌های رماتیسمی

میزان مصرف: ۵۰ تا ۶۰ میلی‌گرم

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و مبتلایان به عفونت قارچی

عوارض جانبی مهم: اختلالات گوارشی، عوارض دیگر شبیه دیگر کورتون هاست.

توجهات پزشکی - پرستاری: وزن بیمار کنترل شود. این دارو احتمالاً باعث بروز افسردگی در فرد می‌شود.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف این دارو با درد معده یا درد شکمی ممکن است همراه شود. بنابراین در زخم‌های گوارشی با احتیاط مصرف شود. در تشنج و نارسایی قلبی نیز توجه کافی لازم است.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

تذکر: پردنیزون نوع وارداتی داروی پردنیزولون است که خاصیت ضد التهابی دارد، مشابه بتامتازون است و به صورت قرص ۵۰ میلی‌گرمی می‌باشد.

## پروکائین آمید (PROCAINAMIDE)

نام تجاری: pronestyl

گروه دارویی: آمید پروکائین

گروه درمانی: ضد آریتمی قلب

⑤ شکل دارویی: کپسول و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در بی‌نظمی‌های ریتم قلب (MI, VT - PVST - PAC - AF) کاربرد دارد.

⚠️ میزان مصرف: طبق دستور متفاوت است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، بلوک قلبی، میاستنی گراویس

⚠️ عوارض جانبی مهم: تب، درد عضلانی، بی‌نظمی قلبی، اختلالات روانی، بلوک قلبی، ضعف، سرگیجه، بی‌اشتهایی، تهوع، درد شکم

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: اختلالات خونی از عوارض شایع است. در صورت خونریزی و تغییر رنگ پوست و خونمردگی آزمایش‌های انعقادی انجام می‌شود. در صورت تزریق وریدی می‌بایست بیمار تحت کنترل باشد.

آموزش بیمار - خانواده: درد عضلانی، اسهال و درد گلو مهم است به پزشک مراجعه شود. در صورت بروز تب و ضایعات پوستی اطلاع دهید. شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.




## پروژسترون (PROGESTERONE)

نام تجاری: Crinone

گروه دارویی: هورمون

گروه درمانی: استروئید

شکل دارویی: تزریقی، پودر 

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: هورمون درمانی در زمان یائسگی، اختلالات هورمونی که باعث قطع یا عدم قاعدگی شوند، خونریزی بدون علت رحمی، درمان نارسایی جسم زرد تخمدانی

میزان مصرف: ۵ تا ۱۰ میلی گرم به مدت ۶ تا ۱۰ روز در اختلال قطع قاعدگی

موارد منع مصرف: برای کسانی که سابقه ترومبوآمبولی (لخته شدن خون در اندام‌ها به ویژه ساق و لگن) دارند، در نارسایی کبد و خونریزی و در سرطان تخمدان ممنوع است.

عوارض جانبی مهم: ایست قلبی مهمترین عارضه است ولی سرگیجه، سردرد میگرنی، فشار خون بالا، تهوع، قاعدگی، تغییر رنگ پوست و کاهش میل جنسی از جمله عوارض است.

توجهات پزشکی - پرستاری: در اختلالات قاعدگی (ماهانه) ابتدا از استروژن استفاده کنید. در صورت تزریق عضلانی، عمیق تزریق شود. قندخون در عده‌ای بالا می‌رود. ممکن است مشکلات چشمی بروز کند. آموزش بیمار - خانواده: - در صورت سرگیجه، درد ساق یا تورم اندام تحتانی به پزشک اطلاع دهید. مشکلات بینایی هرچند کوچک را به

پزشک اطلاع دهید.  
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.



## پرومتازین (PROMETAZINE)

نام تجاری: phenergan

گروه دارویی: فنوتیازین‌ها

گروه درمانی: آرام‌بخشی، ضد حساسیت

📦 شکل دارویی: قرص و شربت و آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حساسیت‌ها و خارش پوستی، بی‌خوابی، تهوع و استفراغ

⚖️ میزان مصرف: بالغین یک قرص و کودکان یک قاشق شربت (۰/۱ میلی‌گرم هر ۶ ساعت)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، صرع، حملات حاد فشار خون

⚠️ عوارض جانبی مهم: عوارض خونی، زردی، تشنج، کوما، سرگیجه، بی‌قراری و بی‌اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، مشکلات تنفسی، استفراغ

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: داروی خوراکی با غذا یا شیر یا آب‌میوه استفاده شود. وضعیت تنفسی بیمار باید کنترل شود. مرگ ناگهانی در نوزادان و شیرخواران گزارش شده است.

آموزش بیمار - خانواده: به علت خواب‌آلودگی از رانندگی اجتناب شود. بدون تجویز پزشک مصرف نشود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## پروپوفول (PROPOFOL)

نام تجاری: Diprivan

گروه دارویی: سدایتوها

گروه درمانی: داروی کمک بیهوشی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: برای القای بیهوشی عمومی (سریع‌الاث‌ر و کوتاه‌اث‌ر)، تهوع و استفراغ

میزان مصرف: بسته به وضعیت بیمار تعیین می‌شود.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، صرع، سالمندان و در فردی که فشار داخل مغزی بالا دارد، منع مصرف دارد.

عوارض جانبی مهم: ایست قلبی، ریوی، کاهش فشار خون، درد و سوزش محل تزریق، ک‌هیر، خشکی دهان، احتباس ادراری، تغییر رنگ پوست، سرفه، سوزش گلو، عطسه، اختلال شنوایی و بینایی، احساس سرما و لرز، تشنج و خواب‌آلودگی

توجهات پزشکی - پرستاری: - در سالمندان با احتیاط تجویز شود. خطر مصرف درازمدت آن افزایش چربی خون می‌باشد. پروپوفول را هم‌زمان با خون و پلاسما از یک راه وریدی تجویز نکنید.

آموزش بیمار - خانواده: مثل دیگر گازهای بیهوشی توجهات ویژه لازم دارد.

شرایط نگهداری: در دمای ۵ تا ۲۲ درجه نگهداری شود. الزاماً در یخچال نگهداری نشود.

## پروپرانولول (PROPRANOLOL)

نام تجاری: Inderal

گروه دارویی: مهارکننده گیرنده بتا ۲

گروه درمانی: ضد فشار خون، ضد میگرن

شکل دارویی: قرص، آمپول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون، بی‌نظمی ریتم قلبی، درمان درد قلبی،

پیشگیری سردرد عروقی

میزان مصرف: در فشار خون ۴۰ میلی گرم ۲ بار در روز و در آریتمی

۰/۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم

موارد منع مصرف: در مورد شوک قلبی، نارسایی احتقانی قلبی، آسم

ریوی ممنوع است

عوارض جانبی مهم: خستگی، کاهش فشار خون، درد قفسه سینه، وزوز

گوش، اشکال در صحبت کردن، تهوع، اسهال، شب‌ادراری، کاهش میل

جنسی، عفونت مجاری ادراری، درد کلیوی، درد مفاصل و کمردرد،

ضایعات پوستی

توجهات پزشکی - پرستاری: - فشار خون و نوار قلب (ECG) بیمار باید

کنترل شود. دارو به همراه غذا تجویز شود.

آموزش بیمار - خانواده: مصرف دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود.

این دارو در سالمندان با احتیاط مصرف شود. در موارد اضطراب و تپش

قلب هم کاربرد عمومی دارد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## پروپیل تیواوراسیل (PROPYL THIOURACIL)

نام تجاری: propyl-thyracil

گروه دارویی: مشتقات تیوآمید

گروه درمانی: ضد پرکاری تیروئید

شکل دارویی: قرص ۵۰ میلی گرم

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان پرکاری تیروئیدی (تیروتوکسیکوز) یا گواترسمی  
میزان مصرف: ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم در روز (تقسیم شده در چند نوبت  
هر ۸ ساعت)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، در شیردهی  
✖ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، عوارض خونی، مشکل بینایی،  
زردی، اسهال، درد مفصل، عوارض پوستی و علائم کاهش کارکرد  
تیروئید مثل احساس سرما، افسردگی، ضعف عمومی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مصرف همزمان داروهای آمینوفیلین و  
تئوفیلین نیاز به بررسی دارد. تست‌های تیروئید باید به طور منظم انجام  
شود.

آموزش بیمار - خانواده: بیمار باید علائم تورم عمومی بدن و عدم  
تحمل به سرما را به پزشک اطلاع دهد. عوارض پوستی یا درد گلو و تب  
را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## پیروینیوم پاموآت (PYRVINIUM PAMOATE)

نام تجاری: Vanquin

گروه دارویی: ترکیبات سیانیدی

گروه درمانی: ضد کرم

📌 شکل دارویی: شربت، قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آلودگی به انگل (کرمک)

⚠️ میزان مصرف: ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم یک بار و تکرار آن ۲ تا ۳ هفته آینده

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: حساسیت، سرگیجه، تهوع، استفراغ، قرمز شدن مدفوع

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: با توجه به، به بازار آمدن مبندازول که نسل جدیدتر دارو می باشد مصرف این دارو کمتر شایع است. برای کودکان زیر ۱۰ سال آن را تجویز نکنید.

آموزش بیمار - خانواده: رنگ قرمز مدفوع مشکل و اهمیت خاصی ندارد. ممکن است استفراغ بیمار هم قرمز شود که اهمیت خاصی ندارد. از جویدن دارو خودداری شود.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## رانیتیدین (RANITIDINE)

نام تجاری: Zantac

گروه دارویی: مهارکننده گیرنده اچ - ۲

گروه درمانی: ضد زخم معده

شکل دارویی: قرص، آمپول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: زخم‌های معده و دوازدهه، برگشت مواد اسید معده به

مری، زخم مری

میزان مصرف: میزان مصرف آن ۲ قرص روزانه می‌باشد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: سردرد، سرگیجه، اسهال، درد عضلانی، مشکلات

خونی

توجهات پزشکی - پرستاری: - بهتر است ۲ ساعت قبل از غذا مصرف

شود. میزان تجویز در نارسایی کلیه کاهش یابد. تجویز B<sub>12</sub> در درمان

درازمدت ضروری است. تست‌های کبدی ضروری است.

آموزش بیمار - خانواده: دارو منظم استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای طبیعی اتاق نگهداری شود.



## ریفامپین (RIFAMPIN)

نام تجاری: Rimacatane

گروه دارویی: ریفامايسين - B

گروه درمانی: ضد سِل، ضد جذام

📦 شکل دارویی: کپسول، تزریقی، قطره خوراکی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت‌های سلی، جذام، عفونت استخوانی، تب مالت (بروسلوزیس)، منتزیت (عفونت پرده مغز)

⚖️ میزان مصرف: ۱۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم یک بار در روز (حداکثر روزانه ۶۰۰ میلی‌گرم)

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبدی و افراد الکلی

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، دل‌درد، اسهال، زردی، علائم شبیه آنفلوآنزا

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: یرقان بیمار خودبه‌خود بهبود می‌یابد ولی انجام تست‌های کبدی ضروری است و باید به پزشک اطلاع داده شود. آموزش بیمار - خانواده: قطع یا ادامه پس از قطع دارو به صورت خودسرانه ممنوع است. این دارو باعث تغییر رنگ ادرار، مدفوع، خلط و حتی اشک می‌شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## سالبوتامول (SALBUTAMOL)

نام تجاری: Ventolin

گروه دارویی: تحریک سپماتیک

گروه درمانی: بازکننده مجاری هوایی ریه

📌 شکل دارویی: قرص، شربت، تزریقی، اسپری

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آسم (به ویژه حملات حاد آسم)، بیماری‌های انسدادی

ریه، برونشیت، پیشگیری از زایمان زودرس

⚠️ میزان مصرف: اسپری آن هر ۶ ساعت یک پاف، در آسم مزمن هر ۴

میلی گرم شربت ۶ تا ۸ ساعت و ۸ میلی گرم تزریقی

موارد منع مصرف: زیر ۱۲ سال و بی نظمی ریتم قلبی

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، لرزش دست، بی قراری، خشکی دهان،

بی خوابی، تپش قلب، افزایش ضربان قلب، استفراغ

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: لرزش دست شایع است به بیمار اطلاع

دهید. بی خوابی گاهی مشکل آفرین است.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت عدم اصلاح مشکل تنفسی بیمار به

پزشک اطلاع دهید. احتمال سرگیجه و منگی را به بیمار متذکر شوید.

شرایط نگهداری: قرص و شربت در دمای معمولی و نوع اسپری آن را


دور از نور نگهداری کنید.

## سلنیوم سولفاید (SELENIUM)

نام تجاری: Selsun

گروه دارویی: ضد سبوره

گروه درمانی: ضد شوره سر

شکل دارویی: شامپو 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حساسیت موضعی سر به همراه شوره و ضایعات شبه

قارچی تنیا و رسیکالر

غلظت میزان مصرف: نوع ۱ و ۲/۵ درصد وجود دارد.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

⚠ عوارض جانبی مهم: تحریک پوستی، خارش و قرمزی چشم

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: - احتمال دارد عوارض شدید در پوست

ایجاد کند. در صورت التهاب شدید استفاده نشود.

آموزش بیمار - خانواده: - برای شستن موی سر ۲ تا ۳ دقیقه موها را با

آن مالش دهید. شامپو وارد چشم نشود.

شرایط نگهداری: دمای معمولی مطلوب است.

## سیلورسولفادیازین (SILVER)

نام تجاری: Silvadene

گروه دارویی: سولفونامید

گروه درمانی: ضدباکتری و عفونت

شکل دارویی: کرم جلدی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: سوختگی و درمان عفونت‌های پوستی

میزان مصرف: روکش نازکی از پماد را روی زخم استفاده کنید.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، حاملگی و نوزادان

عوارض جانبی مهم: حساسیت موضعی، حساسیت شدید دارویی به علت

جذب عمومی

توجهات پزشکی - پرستاری: در صورت درمان طولانی مدت

آزمایش‌های خونی انجام دهید. در هر دوره برای مالیدن کرم، زخم را

پاک کنید.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت عوارض موضعی به پزشک اطلاع

دهید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی مناسب است.

## سوربیتول (SORBITOL)

نام تجاری: Sorbilax

گروه دارویی: ملین هیپراسموتیک

گروه درمانی: ضد یبوست

شکل دارویی: پودر

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان یبوست

⚠ میزان مصرف: محلول ۳۰٪ به عنوان جایگزین گلوکز در تغذیه وریدی

موارد منع مصرف: در افراد دچار عدم تحمل فروکتوز

⚠ عوارض جانبی مهم: دل درد، اسهال

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مورد خاصی ندارد.

آموزش بیمار - خانواده: مورد خاصی ندارد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و جای خشک نگهداری شود.

## استرپتومايسين (STREPTOMYCIN)

نام تجاری: Streptocol

گروه دارویی: آمینوگلیکوزید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

☼ شکل دارویی: آمپول (ویال)

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: در تب مالت (بروسلوز) و در بیماری سیل به عنوان داروی کمکی بروسلوزیس

⚠ میزان مصرف: ۱/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم

موارد منع مصرف: مشابه آمینوگلیکوزیدها مثل جنتامایسین (صفحه ۳۵۳)

⚡ عوارض جانبی مهم: حساسیت پوستی، عوارض کلیوی و شنوایی، تهوع، استفراغ و سرگیجه

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: - قبل از شروع، از کشت و آنتی بیوگرام مطمئن شوید. صدمه به بخش شنوایی یا تعادلی گوش مشکل آفرین است.

آموزش بیمار - خانواده: هرگونه اشکال شنوایی را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

## سولفاستامید (چشمی) (SULFACETAMID)

نام تجاری: Ak-sulf

گروه دارویی: سولفونامید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

⑤ شکل دارویی: قطره چشمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت چشمی، کراتیت چشمی،

⚠ میزان مصرف: ۱ تا ۲ قطره و هر ۱ تا ۳ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی و عفونت‌های ویروسی آبله

مرغان و تب خال، عفونت قارچی چشم

☠ عوارض جانبی مهم: سردرد، تورم، حساسیت موضعی چشم، حساسیت

جلدی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است.

آموزش بیمار - خانواده: طی شیردهی و حاملگی با احتیاط تجویز شود.

شرایط نگهداری: در جای خنک (۸ تا ۱۵ درجه) و دور از نور نگهداری

شود.

## سولفاسالازین (SULFASALAZIN)

نام تجاری: Ucline

گروه دارویی: سولفونامید

گروه درمانی: ضدالتهاب روده، زخم روده بزرگ

⑤ شکل دارویی: قرص و محلول

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: زخم فعال روده بزرگ، رماتیسم مفصلی، سندرم بهجت،

اسکلرودرمی [بیماری‌های عروقی عمومی (واسکولیت)]

⚠️ میزان مصرف: ۲ تا ۴ گرم روزانه خوراکی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، انسداد روده و مجاری

ادراری

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، حساسیت به نور، اختلالات خونی،

تغییر رنگ ادرار، کچلی موضعی برگشت پذیر

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: می‌بایست برای بیمار اسید فولیک کافی

تجویز شود.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است دارو بعد از غذا میل شود. ممکن

است رنگ ادرار زردتر شود یا تغییر رنگ دهد.

شرایط نگهداری: دمای معمولی مناسب است.



## تاموکسیفن (TOMOXIFEN)

نام تجاری: Nolvadex

گروه دارویی: هورمون‌ها

گروه درمانی: ضد استروژن، ضد سرطان

📌 شکل دارویی: قرص ۱۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: سرطان پستان، سرطان تخمدان

⚠️ میزان مصرف: متفاوت است ولی ۱۰ میلی گرم ۲ بار در روز دوره درمان طولانی است.

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، لخته شدن خون در وریدهای عمقی اندام‌ها

⚠️ عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، بی‌نظمی در قاعدگی، سبکی سر،

کاهش اشتها، ریزش مو، کاهش میل جنسی در مردان، خارش

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: - آزمایش‌های دوره‌ای ضروری است.

احتمال دارد خونریزی ماهیانه غیر منظم بروز کند.

در حاملگی مجاز به تجویز آن نیستید.

آموزش بیمار - خانواده: ضعف و خواب‌آلودگی و تنگی نفس را به

پزشک اطلاع دهید. وزن خود را کنترل کنید.

شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.

## ترفنادین (TERFENADINE)

نام تجاری: Seldane

گروه دارویی: بی پریدن ها

گروه درمانی: آنتی هیستامین، ضد حساسیت

⑤ شکل دارویی: قرص ۶۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حساسیت، آلرژی، کهیر، ترشحات از بینی، آبریزش - این دارو آنتی هیستامین غیر آرام بخش است.

⚠ میزان مصرف: یک قرص هر ۱۲ ساعت

موارد منع مصرف: نارسایی کبدی، پورفیری، حساسیت شدید

✳ عوارض جانبی مهم: سردرد، سرگیجه، عصبانیت، بی قراری، بی خوابی،

گزگز دست، لرزش دست، تهوع، استفراغ، درد سینه، فشار خون بالا

⚠ توجهات پزشکی - پرسقاری: تجویز داروهای ادرار آور (دیورتیک) با

آن ممنوع است. در صورت بروز تپش قلب و تشنج دارو را قطع کنید.

آموزش بیمار - خانواده: نباید آب میوه گریپ فروت با آن مصرف شود.

با داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای و کینین تداخل اثر دارد.


شرایط نگهداری: دمای اتاق مناسب است.

## تستوسترون (TESTOSTERONE)

نام تجاری: Andriol

گروه دارویی: هورمون‌ها


گروه درمانی: آندروژن‌ها، ضدناتوانی جنسی


شکل دارویی: کپسول و تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: مشکلات کمبود ناشی از عملکرد غدد جنسی مردان، بلوغ دیررس در پسران، درمان سرطان پیشرفته پستان در خانم‌ها، درمان کم خونی

میزان مصرف: ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۲ تا ۴ هفته

موارد منع مصرف: برای بلوغ دیررس در پسران ماهانه ۱۰۰ میلی‌گرم   
عوارض جانبی مهم: پرمویی در زنان، بم شدن صدا، آکنه صورت، کاهش میل جنسی، طاسی مردانه، شوره سر

توجهات پزشکی - پرستاری: تزریق عضلانی به صورت عمیق باشد.   
سطح کلسیم خون باید اندازه‌گیری شود.

آموزش بیمار - خانواده: به همراه دارو رژیم غذایی پر کالری و پر پروتئین استفاده شود.

شرایط نگهداری: دارو در دمای اتاق نگهداری شود.

## تترا سایکلین (TETRACYCLINE)

نام تجاری: Tetracyn

گروه دارویی: تتراسایکلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ۲۵۰ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونت‌های عمومی خفیف تا متوسط، بیماری عفونی لگن، عفونت گونوکوکی، بیماری‌های مقاربتی، سیفلیس، عفونت مجاری ادراری در زنان

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص ۴ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ و اسهال جزء عوارض گوارشی آن می‌باشد. ناراحتی شدید گوارشی و زخم مری ممکن است بروز کند. اختلالات خونی نیز از عوارض مهم است.

توجهات پزشکی - پرستاری: ابتدا از کشت و آنتی بیوگرام می‌بایست

مطمئن شوید. عوارض گوارشی را با خوردن غذا با دارو کاهش دهید. آموزش بیمار - خانواده: بیمار نباید در معرض نور قرار گیرد. این دارو نباید تاریخ گذشته باشد زیرا باعث عوارض شدید کلیوی می‌شود. اسهال را جدی بگیرید و به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## تتراسایکلین موضعی (TETRACYCLINE)

نام تجاری: Topiccy cline

گروه دارویی: تتراسایکلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک‌ها، ضد آکنه

شکل دارویی: پماد 

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آکنه و عفونت‌های ساده پوستی

میزان مصرف: ۱ یا ۲ بار در روز 

موارد منع مصرف: حساسیت به تتراسایکلین

عوارض جانبی مهم: حساسیت موضعی در پوست 

توجهات پزشکی - پرستاری: مسئله خاصی ندارد. 

آموزش بیمار - خانواده: معمولاً بعد از یک ماه علائم بهبودی آکنه ظاهر می‌شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

## تئوفیلین (THEOPHYLLINE)

نام تجاری: Bronkodyl-phyllin

گروه دارویی: متیل گزانتین

گروه درمانی: ضد آسم، باز کننده ریه

شکل دارویی: قرص، کپسول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حمله حاد آسم، آسم مزمن، برونشیت

میزان مصرف: در حملات حاد ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم هر ۶ تا

۸ ساعت

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، سالمندان، نارسایی کبدی

و کلیوی، فشار خون بالا، سکته قلبی، دیابت

عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، استفراغ، تشنج، تحریک پذیری،

اسهال، ضایعات جلدی و طاسی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: سردرد، اسهال و بی خوابی علایم

مسمومیت است. تئوفیلین خوراکی در درمان حملات حاد آسم کارایی

جدی ندارد.

آموزش بیمار - خانواده: برای پیشگیری از عوارض گوارشی آن را با غذا

میل کنید.


شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## تیوریدازین (THIORIDASINE)

نام تجاری: Mellaril

گروه دارویی: فنوتیازین‌ها

گروه درمانی: ضد اختلالات روانی

شکل دارویی: قرص ۱۰-۲۵-۱۰۰ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اختلالات روانی (سایکوز) و اختلال رفتاری کودکان،

بی‌قراری و رفتار خشونت‌زا و تهاجمی

میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز در اختلالات روانی

شدید

موارد منع مصرف: حساسیت شدید، آریتمی‌های قلبی، پورفیری

عوارض جانبی مهم: علائم قلبی، تشنج، کاهش فشار خون، خشکی

دهان، یبوست

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: شبیه کلر پرومازین (صفحه ۱۷۹)

آموزش بیمار - خانواده: شبیه کلر پرومازین

شرایط نگهداری: دور از نور و در دمای اتاق نگهداری شود.

## تیوتیکسین (THIOTHIXENE)

نام تجاری: Narane

گروه دارویی: تیوگزانتین

گروه درمانی: ضد اختلالات روانی

شکل دارویی: کپسول

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اختلالات روانی، اختلال شخصیتی

میزان مصرف: به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ میلی گرم روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، یبوست، خشکی دهان

توجهات پزشکی - پرستاری: شبیه کلرپرومازین (صفحه ۱۷۹)

آموزش بیمار - خانواده: شبیه کلرپرومازین

شرایط نگهداری: دور از نور و در دمای اتاق نگهداری شود.




## تیمولول چشمی (TIMOLOL)

نام تجاری: Timoptic

گروه دارویی: مهار گیرندهٔ بتا

گروه درمانی: ضد آب سیاه چشم (گلوکوم)

شکل دارویی: قطرهٔ استریل چشمی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: برای کاهش فشار داخل کرهٔ چشم

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قطرهٔ چشمی

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، آسم، بیماری ریوی

⚠ عوارض جانبی مهم: تهوع، سرگیجه، خستگی، کاهش فشار خون،

ضایعات جلدی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: داروی چشمی می‌تواند جذب عمومی

داشته باشد. تنگی نفس در صورت جذب سیستمیک بروز می‌کند.

آموزش بیمار - خانواده: احتمال حساسیت موضعی و سوزش در چشم

بالاست.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## تولمتین (TOLMETIN)

نام تجاری: Tolectin

گروه دارویی: ضد التهاب غیر استروئیدی

گروه درمانی: ضد درد، ضد رماتیسم

شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان آرتريت حاد و مزمن، استئوآرتريت، رماتیسم  
مفصلی

میزان مصرف: ۴۰۰ میلی گرم ۲ تا ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیوی، فشار خون  
بالا

عوارض جانبی مهم: علائم آلرژی و حساسیت عمومی

توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کلیوی را انجام دهید.

آموزش بیمار - خانواده: این دارو با غذا یا شیر یا آنتی اسید میل نشود.  
به همراه آسپرین مصرف نشود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

## تریامسینولون (TRIAMCINOLON)

نام تجاری: Kenlog

گروه دارویی: کورتون

گروه درمانی: ضد التهاب، مهار ایمنی

شکل دارویی: تزریقی، پماد موضعی، کرم

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب مفصلی (تزریق داخل مفصلی)

میزان مصرف: تزریق عضلانی ۴۰ تا ۸۰ میلی گرم و تکرار به فواصل ۴ هفته

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: مشابه دیگر داروهای کورتونی

توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو نباید به صورت تزریق عضلانی به کار رود.

آموزش بیمار - خانواده: محل تزریق ممکن است آتروفی شود یا تغییر رنگ پیدا کند.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

نکته: آتروفی یعنی لاغری و کاهش ضخامت پوست و عضله

## تریامترن - اچ (TRIAMTEREN-H)

نام تجاری: Dyazide

گروه دارویی: دیورتیک

گروه درمانی: دیورتیک - ادرار آور (مدر)

⑤ شکل دارویی: قرص

مصرف در حاملگی: گروه B

موارد مصرف: تورم عمومی بدن (ادم) ناشی از نارسایی قلبی، نارسایی

کبدی، فشار خون، درمان کاهش پتاسیم خون

⚠️ میزان مصرف: ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم روزانه

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبدی - کلیوی و

هیپرکالمی

⚠️ عوارض جانبی مهم: سردرد، تهوع، خشکی دهان، سنگ کلیوی، کم

خونی، حساسیت به نور، ضایعات جلدی، یبوست

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: وزن بیمار را مرتب کنترل کنید. سطح

پتاسیم خون را اندازه بگیرید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو بعد از غذا میل شود.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## تری فلوئوپرازین (TRIFLUOPERAZINE)

نام تجاری: Stelazine

گروه دارویی: فنوتیازین

گروه درمانی: ضد استفراغ، ضد سایکوز

⑤ شکل دارویی: قرص ۱ و ۲ و ۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان اختلالات روانی، اضطراب، بیماری اسکیزوفرنی

⚖ میزان مصرف: ۱ تا ۲ میلی گرم

موارد منع مصرف: مشابه کلرپرومازین (صفحه ۱۷۹)

⚠ عوارض جانبی مهم: کاهش فشار خون، یبوست، خشکی دهان، خواب آلودگی

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: مشابه کلرپرومازین

آموزش بیمار - خانواده: مشابه کلرپرومازین

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و دور از نور نگهداری شود.


✓ نکته: اسکیزوفرنی بیماری روانی است که ارتباط طبیعی فرد با اجتماع به هم می خورد و در عین حال فرد خود را بیمار نمی داند.

## تری میپرامین (TRIMIPRAMIN)

نام تجاری: Surmontil

گروه دارویی: دی بنزازپینی

گروه درمانی: ضد افسردگی

شکل دارویی: قرص و قطره 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان افسردگی و دردهای مزمن و اختلالات خواب

میزان مصرف: یک الی ۴ قرص روزانه استفاده شود.

موارد منع مصرف: به ضد افسردگی سه حلقه‌ای ایمی پرامین (صفحه

۳۸۱) و آمی تریپ تیلین (صفحه ۵۲) مراجعه شود.

⚠ عوارض جانبی مهم: مشابه آمی تریپ تیلین

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: علایم حیاتی بیمار را کنترل کنید.

آموزش بیمار - خانواده: دارو با غذا میل شود. یبوست جزء عوارض دارو

می‌باشد.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## والپروات (VALPROATE)

نام تجاری: Epilim

گروه دارویی: اسید کربوکسیلیک

گروه درمانی: ضد تشنج

شکل دارویی: قرص و شربت

مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: انواع تشنج (موضعی و عمومی)، درمان پیشگیری

میگرن، اختلالات اضطرابی، در درمان اعصاب محیطی

میزان مصرف: ۲۰ تا ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم

موارد منع مصرف: نارسایی کبدی و حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی مهم: تهوع، اسهال، استفراغ، کرامپ و درد شکمی،

نارسایی کبدی، بی‌قراری، ریزش مو، تورم پستان، خونریزی، افسردگی،

کاهش شنوایی، گوش درد و کاهش یا بالا رفتن فشار خون، تپش قلب

توجهات پزشکی - پرستاری: تست‌های کبدی انجام شود. به علت

اختلالات خونی، آزمایش‌های انعقادی انجام شود.

آموزش بیمار - خانواده: بهتر است با غذا میل شود. از رانندگی اجتناب

شود.

شرایط نگهداری: دمای اتاق متناسب است.

## وانکومایسین (VANCOMYCIN)

نام تجاری: Vancocin

گروه دارویی: گلیکوپتید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

⑤ شکل دارویی: تزریقی و محلول خوراکی

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت‌های متوسط، بی‌هوازی، گازگنگرن، عفونت

استخوانی، عفونت‌های پوستی و روده‌ای، عفونت ریوی و پرده مغزی

⑤ میزان مصرف: ۴۵ تا ۶۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، اختلالات شنوایی و

نارسایی کلیوی

⚠ عوارض جانبی مهم: عوارض شنوایی و کلیوی، تهوع، کاهش فشار خون،

اختلالات خونی، درد محل تزریق، تشنج

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: در نارسایی کلیه باید میزان آن کاهش

یابد.

انفوزیون وریدی آن باید به مدت یک ساعت طول بکشد. بهتر است به

شکل عضلانی تزریق نشود.

آموزش بیمار - خانواده: سابقه حساسیت دارویی را به پزشک بگویید.

علائم سرگیجه و وزوز گوش را اطلاع بدهید.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مناسب است.




## وراپامیل (VERAPAMIL)

نام تجاری: Isoptin

گروه دارویی: دی فنیل آلکیل آمین

گروه درمانی: ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص و نوع تزریقی 

مصرف در حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درد قلبی، فشار خون، بی نظمی قلبی (به ویژه آریتمی PAT)

⚠️ میزان مصرف: بستگی به نوع آریتمی قلبی دارد.

موارد منع مصرف: مشکلات هدایتی قلب (بلوک‌های درجه ۲ یا ۳)  
✳️ عوارض جانبی مهم: تپش قلب، سرگیجه، اختلال خواب، اختلال دید،  
درماتیت (ضایعات پوستی)، دل درد، خشکی دهان، درد عضلانی و  
اشکالات تنفسی

⚠️ توجهات پزشکی - پرستاری: کنترل علائم حیاتی ضروری است. نوار قلبی باید گرفته شود.

آموزش بیمار - خانواده: در صورت تنگی نفس به پزشک اطلاع دهید.  
دارو را همراه با غذا میل کنید.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مناسب است.

☑️ نکته: (PAT) یک بی نظمی ریتم قلب است که به علت افزایش تعداد ضربان قلب بروز می‌کند و این دارو در مراکز درمانی بسیار موثر است.

## وارفارین (WARFARIN)

نام تجاری: Coumadin

گروه دارویی: مشتقات کومارین

گروه درمانی: ضد انعقاد

⑤ شکل دارویی: قرص ۲/۵ و ۵ میلی گرمی

مصرف در حاملگی: گروه X

موارد مصرف: پیشگیری از لخته شدن خون در وریدهای عمقی (ترمبوز ورید عمقی DVI) بعد از انفارکتوس میوکارد (سکته قلبی)، حملات گذرای مغزی

⚠️ میزان مصرف: ۵ تا ۱۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۲ تا ۴ روز و تداوم آن با نظر متخصص

موارد منع مصرف: خونریزی حاد، زنان حامله، نارسایی کلیه، کبد، فشار خون بالا، جراحی نخاع و چشم و مغز، در اختلالات خونی و حساسیت شدید دارویی

⚠️ عوارض جانبی مهم: تب، درد شکم، تهوع، استفراغ، مدفوع قیری (سیاه)، زردی، ضایعات جلدی


⚠️ توجهات پزشکی-پرستاری: در طول درمان می بایست PT (تست انعقادی) بیمار به ۱/۵ تا ۲ برابر میزان کنترل برسد.

آموزش بیمار-خانواده: دارو را بدون نظر پزشک قطع نکنید. در صورت اسهال یا مدفوع سیاه رنگ به پزشک اطلاع دهید. شرایط نگهداری: دمای معمولی اتاق مناسب است.

## یوهیمبین (YOHIMBINE)

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده آلفا ۲

گروه درمانی: ضد ناتوانی جنسی مردان


شکل دارویی: قرص ۲ میلی گرمی 

مصرف در حاملگی: مورد بحث نیست.

موارد مصرف: درمان ناتوانی جنسی ناشی از اختلال نعوظ در مردان البته هنوز (FDA) که سازمان مجوز دهنده دارو و غذا در آمریکا است مجوز مصرف آن را نداده است.

میزان مصرف: ۴ تا ۶ و ۵ میلی گرم ۳ بار در روز

موارد منع مصرف: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبد و کلیه و سالمندان و زنان

عوارض جانبی مهم: بی قراری، تحریک پذیری و لرزش دست، عصبانیت   
توجهات پزشکی - پرستاری: این دارو با ضد افسردگی ها تداخل اثر دارد. ممکن است فشار خون فرد را افزایش دهد.


آموزش بیمار - خانواده: بالا رفتن فشار خون و سیخ شدن مو و تپش قلب جزء علائم مسمومیت دارویی است، به پزشک اطلاع دهید.  
شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.

## سولفات روی (ZINC SULFAT)

نام تجاری: Zincate

گروه دارویی: سولفات روی

گروه درمانی: مواد معدنی - مکمل غذایی

شکل دارویی: کپسول 

مصرف در حاملگی: گروه A

موارد مصرف: درمان کمبود روی، درمان کمکی بیماری ویلسون (کمبود مس)

میزان مصرف: برای درمان کمبود روی ۰/۵ تا ۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن در روز

موارد منع مصرف: مورد خاصی ندارد.

عوارض جانبی مهم: تهوع، اسهال، تحریک معده

⚠ توجهات پزشکی - پرستاری: درمان کمکی غذایی همراه مصرف دارو ضروری است

آموزش بیمار - خانواده: اعمال رشد، فعالیت جنسی، بینایی و تولید

مثل وابستگی شدید به میزان روی در بدن دارد.

شرایط نگهداری: دمای اتاق مطلوب است.



## چه هنگام دارو را استفاده کنیم؟

- داروهایی که همراه یا پس از غذا باید مصرف شوند.
- داروهایی که با معده خالی (قبل از غذا) باید مصرف شوند.
- داروهایی که یک ساعت پیش از غذا باید مصرف شوند.
- داروهایی که یک ساعت پیش یا دو ساعت پس از غذا باید مصرف شوند.
- داروهایی که پس از غذا یا همراه با غذا باید مصرف شوند.
- داروهایی که بدون توجه به غذا باید مصرف شوند.
- داروهایی که زبانی یا زیر زبانی باید مصرف شوند.
- داروهایی که همراه با مقادیر کافی مایعات باید مصرف شوند.
- داروهایی که نباید با روغن‌های معدنی مصرف شود.
- داروهایی که نباید با شیر یا لبنیات یا آنتی اسید استفاده شود.
- داروهایی که زیر زبانی باید مصرف شوند.
- داروهایی که قرص یا کپسول را باید جوید و از بلعیدن آن خودداری کرد.
- داروهایی را که باید بلعید و آن از جویدن خودداری کرد.
- داروهایی که مدفوع یا ادرار را رنگین می‌کنند.
- داروهایی که باعث افزایش حساسیت به نور می‌شوند.

## پس از غذا یا همراه غذا

نام دارو	نام تجارتی
کلریدرات بی پریدین	Akineton
اسپیرونولاکتون + هایدروکلروتیازید	Aldactazide
اسپیرونولاکتون	Aldactone
متیل دوپا	Aldomet
متیل دوپا - هایدروکلروتیازید	Aldoril
تئوفیلین اتیلن دی آمین	Aminophylline
سوفلین پیرازون	Anturane
کلروکین فسفات	Aralen HCl
اسید استیل سالیسیلیک	Aspirin
کلوفیرات	Atromid-s
فنیل بوتازون	Azolid
سولفا سالازین	Azulfidine
فنیل بوتازون	Butazolidin
آمودیاکین	Camoquin
تری کلرواستالدئید منوهیدرات	Choral Hydrate
نیتروفورانتوئین	Cyantın
سیکلاندلات	Cyclospasmol
فن فورمین	DBI
پی پریدولات + آنزیم	Dactilase

Dantrium	دانترولن سدیم
Diabinese	کلر پروپامید
Dilantin	دی فنیل هیدانتوئین سدیم
Donnazyme	دوناتال + آنزیم
Dopar	لودوپا
Dymelor	استوهگزامید
Dyrenium	تریامترن
Enzypan	آنزیم
Feosol	سولفات فرو
Fergon	گلوکونات فرو
Festal	آنزیم
Flagyl	مترونیدازول
Fulvicin	گریز و فولوین
Furadantin	نیترو فورانتوئین
Furoxone	فورازولیدین
Grifuluin	گریز و فولوین
Hydrocortisone	هیدروکورتیزون
Hygroton	کلرتالیدون
Iberet	سولفات فرو + ویتامین
IBerol	سولفات فرو
Ilidar	آزایپتن فسفات
Indocin	اندومتاسین



Iron salts and/or Preparations	..... املاح آهن و فرآورده‌های آهن‌دار
Isordil	..... ایزوسورباید دی نیترات
Isoniazid	..... ایزونیاژید
Kaochlor	..... کلرورپتاسیم
Kaon	..... گلوکونات پتاسیم
Kay Ciel	..... کلرورپتاسیم
Kemadrin	..... کلریدرات پروسیلکلیدین
K-Lor	..... کلرورپتاسیم
Larodopa	..... لوودوپا
Macrochantin	..... نیترو فورانتوئین
Marax	..... کلریدرات هیدروکسی زین + تتوفیلین - سولفات افدرین
Midicel	..... سولفات متوکسی پیریدازین
Mintezol	..... تیابندازول
Motrin	..... ایبوپروفن
Muripsin	..... اسید گلو تامیک + پپسین
NegGram	..... اسید نالیدیکسیک
Noctec	..... کلرال هیدراته
Oral hypoglycemics	..... پایین آورنده‌های قند خون (خوراکی)
Orinase	..... تولبوتامید
Oxalid	..... اکسی فن بوتازون
Pagitane	..... کلرایدرات سیکلیرمین
Phenoxene	..... کلرفنوکسامین

Ponstel	اسید مفنامیک
Prednisone/ Prednisolone	پردنیزون و پردنیزولون
Potassium salts and/or preparations	املاح پتاسیم و فرآورده‌های حاوی پتاسیم
Pyridium	کلریدرات فنازوپیریدین
Quadrinal	کلریدرات افدرین + فنوباریتال + تتوفیلین کلسیم
Quibron	سالیسیلات + یدورپتاسیم
Quinamm	تتوفیلین گلیسریل گایاکولات
Quinamm	کینین + آمینوفیلین
Paudixin	پودر رولفیا سرپانتینا
Regroton	کلرتالیدون + رزربین
Rela	کاریزوپرودول
Reserpine	رزربین
Salicylotes	سالیسیلات‌ها
sansert	متی سرژید
Serpasil	رزربین
Sinemet	کاریبی دویا + لوودویا
Sterazolidin	فنیل بوتازون + پردنیزون + کلروآلومینیم
Tandearil	اکسی فن بوتازون
Thorazine	کلرپرومازین
Tofranil	کلریدرات ایمی پرامین
Tolinase	تولازامید

Troph-Iron	ویتامین B <sub>1</sub> + ویتامین B <sub>12</sub> + آهن
Trophite	ویتامین B <sub>1</sub> + ویتامین B <sub>12</sub>
Urecholine	کلروبتانکول
Zyloprim	اگوپورینول

## قرص یا کپسول را بجوید، از بلعیدن آن خودداری کنید.

Chymoral	تریپسین + کیموتریپسین
Gaviscon	هیدروکسید آلومینوم + تری سیلیکلات منیزیوم
Mintezol	تیابندازول
Mylicon	سایمتیکون
Sorbitrate	ایزوسورباید
Vermox	مبندازول

## قرص یا کپسول را ببلعید، آن را نجوید.

Azulfidine	سولفاسالازین
Bisacodyl	بیزاکودیل
Chlormycetin	کلرامفینیکل
E-Mycin	اریترومایسین
Entozyme	پانکراتین
Enzypan	آنزیم

## قبل از غذا یا با معده خالی

Antepar	سیترات بی پرازین
Alcopara	هیدروکسی نفتوات بونیوم
Castor Oil	روغن کرچک
Crystoides	هگزیل رزور سینول
Duotrabe	پنتااریتریتول نیترات
Lincocin	کلریدرات لینکو مایسین
Neoloid	روغن کرچک
Peritate SA	پنتا اریتریتول تترانیترات
Sorbi trabe Oral	ایزوسور باید دی نیترات

## یک ساعت پیش از غذا

Anlicnolinergics	آنتی کلی نرژیک ها
Banthine(PB)	برمور متاتیلن
Cantil(PB)	برمور مینزولات
Combidi	پروکلریزازین + ایزوپروپامید
Co tazym	آنزیم پانکراتیک
Cytellin	سیتوسترول های آلفا و بتا و گاما
Donnatal	فنوباریتال + سولفات هیوسامین + سولفات آنزوپین + هیدروبرموهیوسین
Librax	کلردیازپوکسید + برمور کلرینیوم

Pondimin	کلریدرات فن فلورامین
Preludin	کلریدرات فن فنرامین
Pro-Bathine(PB)	برمور پربانتلین
Robinul (PH)(Forte)	گلیکوپیرولات + فنوباریتال
Serenium	اتوکسازون
Tenuabe	کلریدرات دی اتیل پروپیون
Tepanil	کلریدرات دی اتیل پروپیون
Tral (PB)	متیل سولفات اگزوسیکیلوم
Valpin (PB)	متیل برمور اکتاتروپین

### داروهایی که پس از غذا یا همراه غذا باید مصرف شود.

نام ژنریک دارو	نام تجارتي
بای پیریدین کلریدرات	Akineton
اسپرونولاکتون	Aldacton
اسپرونولاکتون + هیدروکلروتیازید	Aldactazide
متیل دوپا	Aldomet
متیل دوپا + هایدروکلروتیازید	Aldoril
تئوفیلین اتیلین دی آمین	Aminophylline
سولفین پیرازون	Anturane
کلروکین فسفات	Aralen HCl
اسیداستیل سالیسیلیک	Aspirin

Atromid.S	کلوفیبرات
Azulfidine	فینل بوتازون
Butazoldin	سولفاسالازین
Camoquin	فینل بوتازون
Chloral Hydrate	آمودیاکین تری کلرو استالدئید منوهیدرات
Cyantın	نیترو فورانتوئین
Cyclos Pasmol	سیکلاندلات
DBI	فن فورمین
Dactilase	پی پریدولات + آنزیم
Dantrium	دانترولن سدیم
Diabinese	کلر پروپامید
Dibntin	دی فینل هیدانتوئین سدیم
Donnazyme	دوناتال + آنزیم
Dopar	لودوپا
Dymebr	استوهگزامید

## دارو بدون توجه به غذا میل شود.

نام تجارتي	نام ژنریک دارو
Amoxil	آموکسی سیلین
Anspor	سفرادین
Clecoin	کلیندامایسین

Kafocin	سفالوکیسلین
E-Mycin	اریترومایسین
Keflex	سفالکسین
Minocin	ماینوسیکیلین
Vibramycin	داکسی سایکلین

### داروهایی که باید زیر زبانی یا زبانی میل شود.

Papase	پاپائین
Percorten	استات دزوکسی کورتیکوسترون
Oreton	متیل تستوسترون

### همراه با مقادیر کافی مایعات (حداقل یک لیوان کامل)

AZO-Mandelamine	فنازوپیریدین
AZUlifidine	سولفاسالازین
Azotrex	تترا سایکلین
Bactrim	کوتریموکسازول
Benemid	پروبنسید
ColBenemid	کولتیرامین
Eskalitr	کربنات لیتیم
Gantanol	سولفامتوکسازول

سولفونامید..... Sulfonamides

آلوپورینول..... Zylprim

### با روغن‌های معدنی مصرف نشود.

سولفوسوکسینات کلسیم یا سدیم..... Colcium or Sulfosuccinate

ویتامین‌های ..... V,A,DE,K,.....K,E,D,A

### نباید با شیر، لبنیات و آنتی اسیدها مصرف شود.

تتراسایکلین ..... A Chromy Cin-V

بیزاکودیل ..... Bisacodyl

سولفات فرو ..... Feosol

املاح آهن ..... Iran salt

کلرورپتاسیم ..... Kaochlor

گلوکونات کلسیم ..... Kaon

ویتامین B<sub>1</sub> و B<sub>12</sub> و آهن ..... Troph-Iran

ویتامین B<sub>1</sub> و B<sub>2</sub> ..... Trophite

### زیر زبانی

نیتروگلیسیرین..... Nitroglycerine



Sorbitrate	ایزوسورباید
Isvprel	ایزوپروترنول

## داروهایی که باعث تغییر رنگ مدفوع یا ادرار می‌شوند.

آنتی اسیدها و آلومینیوم هیدروکسید	رنگ سفید لکه‌دار
آنتراکولنونس	زرد یا سبز
ضد انعقادی (وارفارین)	صورتی تا قرمز یا سیاه
آنتی بیوتیک‌ها	سبز مایل به خاکستری
بیسموت	سبز مایل به سیاه
چارکول	سیاه
نمک آهن	سیاه
هپادین	صورتی تا قرمز سیاه
ایندومتاسین	صورتی تا قرمز یا سیاه
اکسی فن بوتازون	صورتی تا قرمز یا سیاه
فنازو پیریدین	نارنجی یا قرمز
فنیل بوتازون	صورتی - قرمز سیاه
پیرومینیوم	قرمز
ریفامپین	نارنجی، قرمز
سالیلات	صورتی - قرمز - سیاه
آمی تریپ تیلین	آبی مایل به سبز
کلروکین	زرد - قهوه‌ای
رانترون	صورتی تا قرمز

رانترو لن	..... نارنجی - قرمز
نمک آهن	..... سیاه
فورا زولیدون	..... زرد - قهوه‌ای
لوودوپا	..... سیاه رنگ
متیلین بلو	..... آبی مایل به سبز
مترونی دازول	..... سیاه
نیتروکوآنتین	..... زرد - قهوه‌ای
فنازو پیریدین	..... نارنجی - قرمز
فنو تیازین	..... صورتی - قرمز
کینین	..... قهوه‌ای سیاه رنگ
ریو فلاوین	..... زرد
سولفا سالا زین	..... زرد مایل به قهوه‌ای
تریامترن	..... آبی کمرنگ
وارفارین	..... نارنجی

### داروهایی که باعث افزایش حساسیت به نور می‌شوند.

اسپیرونولاکتون	..... Aldacton
متیل دوپا	..... Aldomet
داروی ضد تشنج	..... Anti Convulsants
آنتی هستی‌تامین	..... Anti Histamines
ضد مالاریا	..... Antimalarias
داروی آرسینکی	..... Aresenic

Aventyl	نورترپ تیلین
Azolid	فنیل بوتازون
Azotrex	تتراسایکلین فسفات
Bactrim	کوتریکمسازول
Barbiturates	باربیتورات ها
Benadryl	دیفن هیدرامین
Bleph	سولفاستامید
Dantrium	دانتروئن سدیم
Dilantin	رزپین
Fulricin	گریزوفولوین
Gold Salts	املاح طلا
Hexachorophen	هگزا کلروفن
imipirquine	ایمی پیرامین
librium	کلرو دیازپوکساید
panmycin	تتراسایکلین
phenergan	پرومتازین
presamine	پیرونیوم پاموات
septra	کوتریمورکسازول
sumycin	تتراسایکلین
Thorazine	کلرپرومازین
Trilafon	پرفنازین
vibramycin	داکسی سایکلین

## «لیست داروهای بدون نسخه»

### «قابل فروش در داروخانه‌ها»

ردیف	نام دارو	شکل دارو	قدرت دارو	ملاحظات
۱	(آ.ث.آ) A.C.A	قرص	-	ترکیبی از استامینوفن + کافئین + ASA
۲	استامینوفن Acetaminophen	قرص	۵۰۰ میلی گرم	
۳	استامینوفن Acetaminophen	شربت	۵۰۰ میلی گرم	
۴	استامینوفن Acetaminophen	شیاف (بچه‌ها)	۱۲۵ میلی گرم	
۵	آدالت کولد Adult Cold	قرص	---	کلرفنیرامین - استامینوفن - فنیل آفرین
۶	آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxid	قرص جویدنی	۳۰۰ میلی گرم	
۷	آلومینیوم هیدروکساید Aluminium Hydroxid	شربت	۳۳۰ میلی گرم	
۸	آلومینیوم ام. جی Aluminium MG	قرص جویدنی		
۹	آلومینیوم ام. جی Aluminium MG	شربت		
۱۰	آنتی هموروئید AntiHemoroid	شیاف		
۱۱	آنتی هموروئید AntiHemoroid	پماد موضعی		
۱۲	اشک مصنوعی Artificial Tears	قطره چشمی	-	
۱۳	آ.اس.آ A.S.A	قرص	۳۲۵ میلی گرم	
۱۴	آ.اس.آ A.S.A	قرص جویدنی	۱۰۰ میلی گرم	
۱۵	بنزوکائین Benzocain	پماد موضعی	۵٪	بی حس کننده موضعی
۱۶	بتا کاروتن Betacarten	کپسول	۱۵ میلی گرم	
۱۷	بیزاکودیل Bisacodyl	قرص و شیاف	۱۰ میلی گرم	

ردیف	نام دارو	شکل دارو	قدرت دارو	ملاحظات
۱۸	بیسموت اکساید Bismuth oxid	قرص	۱۲۰ میلی گرم	
۱۹	برم هگزین کلراید Brom Hexine HCl	شربت و قرص	۴ و ۸ میلی گرم	
۲۰	پماد سوختگی Burn ointment	پماد موضعی	-	
۲۱	کالامین Calamin	لوسیون	۸٪	
۲۲	کلسیم - دی Calcium-D	قرص		
۲۳	کلسیم فورتن Calcium Forte	قرص جوشان		
۲۴	کربامید پراکساید Carbamamide Peroxide	محلول وانی	۱۰٪	
۲۵	سترامید سی Ceterimid-c	محلول		ترکیبی از ستیرمایدو کلر هگزیدین
۲۶	استیل پیریدنیوم	دهان شویه	۵٪	
۲۷	شارکول فعال Charcoal	محلول	۳۰ گرم	
۲۸	شربت سرماخوردگی بچه Children cold	قرص		
۲۹	کلر هگزیرین Cholr Hexi dine	دهان شویه	۲٪	
۳۰	کلر فنیرامین Chlor pheniramin	قرص		
۳۱	کلماستین Clemastin	قرص	۱ میلی گرم	
۳۲	دکسترومتورفان بی (Dextromethorphon)	شربت		
۳۳	دیکلوفناک Diclofenac	ژل موضعی	۱٪	
۳۴	دایجستیو Digertive	قرص		
۳۵	دیمین هیدرانات Dimen hydrinate	قرص	۵۰ میلی گرم	
۳۶	دای متیکون	قرص		
۳۷	دیفن هیدرامین	شربت		
۳۸	اکسپکتورانت	شربت		

ردیف	نام دارو	شکل دارو	قدرت دارو	ملاحظات
۳۹	فروس فومارات	قرص		
۴۰	فروس سولفات	قرص		
۴۱	فلوراید	محلول + قرص		
۴۲	فولیک اسید	قرص		
۴۳	گلسیرین	صابون		
۴۴	هماتینیک	کپسول		
۴۵	گایا فینزین	شربت		
۴۶	ایبوبروفن	قرص، شربت		
۴۷	لیدوکائین کلراید	پماد و زل		
۴۸	لوپر آمید کلراید			
۴۹	منیزیم هیدروکساید	شربت		
۵۰	مبندازول mebendazole	قرص جویندی	۱۰۰ میلی گرم	
۵۱	منتول سالیلات	پماد موضعی		
۵۲	متیل سالیلات	پماد موضعی		
۵۳	مینوکسیدیل	محلول موضعی	۳۰٪	
۵۴	مولتی ویتامین	کپسول، شربت و قرص		
۵۵	مولتی ویتامین منیرال	قرص		
۵۶	محلول چشم شویه	محلول موضعی چشم		
۵۷	او.آر.اس O.R.S	پودر برای محلول خوراکی		
۵۸	پانکراتین فورث	قرص		
۵۹	پدیاتریک گریپ	شربت		

ردیف	نام دارو	شکل دارو	قدرت دارو	ملاحظات
۶۰	فنیل آمین کلراید	قطره		
۶۱	پیروکسیکام	زل موضعی		
۶۲	بتادین	محلول موضعی، پماد موضعی		
۶۳	پسودوافدرین کلراید	قرص		
۶۴	سالیسیلیک اسید	قرص، پماد		
۶۵	سوکرالفات			
۶۶	سولفور Sulfur	صابون	۱۰٪	
۶۷	تتراسایکلین	پماد موضعی	۳٪	
۶۸	ویتامین A			
۶۹	ویتامی A+D			
۷۰	ویتامین B کمپلکس			
۷۱	ویتامین B6			
۷۲	ویتامین C			
۷۳	اکسید زینک Zinc Oxide	پماد موضعی	۲۰٪	

## داروهای گیاهی ایران

نام دارو	منشاء گیاهی	موارد مصرف	منع مصرف	عوارض جانبی
آلیکوم	گیاه سیر	در فشار خون بالا، قند، چربی خون	حساسیت به سیر و زخم معده	سوزش معده، تهوع و اسهال
آلیوم-اس	پودر سیر	فشار خون بالا	حساسیت به سیر و زخم معده	سوزش معده، تهوع و اسهال
آلفا	گیاه حنا	سوختگی و التهاب و اگزمای پوست	همزمان با دیگر داروها	مورد خاص گزارش نشده است
آلتادین	گیاه شیرین بیان	گلو درد بدون تب، تحریک دهان و گلو	عفونت گلو	مورد ندارد
آلتیب	ریشه گیاه سنبل الطیب و گل گاوزبان	بی خوابی، اضطراب، سردرد	در کودکان ممنوع است	خواب آلودگی شدید
آنتوم	گیاه شوید	درمان چربی خون و دردهای کیسه صفرا	بیماری قند	حساسیت پوستی
آنتی دیابتیک	دانه گیاه شنبلیله	کنترل قندخون (دیابت)	مورد خاصی ندارد.	—
آنتی میگرن	راز یانه و بید	سردرد میگرنی	در آسم و زخم معده	خواب آلودگی
آفرودیت	خارخاسک زنجبیل، زعفران	افزایش میل جنسی و درمان ناتوانی جنسی	ناراحتی قلبی	سردرد، برافروختگی
بابونه	بابونه	التهاب دهان و معده و روده	آسم	عوارض آلرژی و حساسیتی



نام دارو	منشاء گیاهی	موارد مصرف	منع مصرف	عوارض جانبی
بروتکتیدی	آویشن شیرازی	ضد سرفه، خلط آور	دیابت (بیماری قند)	تحریک مخاطهای بدن شود
سی - لاکس	برگ سنا، گشنیز	ملین و رفع یبوست	در انسداد روده و دردهای شکمی ناشناخته	تحریک روده، کاهش فشار خون، ضعف
کالندولا	گل همیشه بهار	ضد التهاب و خارش پوست و نواحی ادراری کودکان	—	حساسیت موضعی
کاروای میکسچر	رازیانه	ضد نفخ و سوء هاضمه	نارسایی کبد، دل درد و انسداد مجاری صفراوی	علائم حساسیت
کار مینت	نعناع + گشنیز	ضد نفخ و سوء هاضمه	ناراحتی کبدی	—
کراکاتوس	سرخ و لیک	فشار خون و نارسایی قلب	ناراحتی گوارشی	تهوع، استفراغ، خستگی عوارض پوستی
دینه برون	پوسته گندم	یبوست، تحریک روده	در خونریزیهای روده‌ای انسداد روده اشکال در بلع	نفخ، انسداد روده حساسیت موضعی
کارمیناتیف	رازیانه، نعناع، زیره سیاه، گشنیز	ضد نفخ و سوء هاضمه	زخم معده و خونریزی حاد	حساسیت موضعی جلدی

نام دارو	منشاء گیاهی	موارد مصرف	منع مصرف	عوارض جانبی
انوکسولون	اسید گلیسیرتینیک	سوختگی - اگزما، خارش موضعی، نیش حشرات	در بریدگی و عفونت زخم ممنوع است	عوارض موضعی
گارسین	پودر سیر	فشار خون بالا، بیماری قند	-	-
گارت	پودر سیر	زیادی چربی خون و فشار خون بالا	-	گوارشی
گاریک	عصاره سیر	زیادی چربی خون و فشار خون بالا	-	-
گاری پک	پودر سیر	زیادی چربی خون و فشار خون بالا	-	-
جین جیتون	ریشه زنجبیل	ضد تهوع و استفراغ مسافرتی	اختلالات خونریزی دهنده	آلرژی
گل گریپ	شوید	ضد نفخ	التهاب و نارسایی کلیه	-
گریپ واتر	شوید، رازیانه	ضد سوء هاضمه و نفخ	انسداد مجاری صفراوی	-
هربی لاکس	برگ سنا	ضدییبوست	-	-
هایپیران	علف چاه	ضد سر درد میگرنی سر درد عصبی، افسردگی	تداخل دارویی با قرص ضد بارداری، وارفارین دیگوکسین.	تهوع، خشکی دهان

نام دارو	منشاء گیاهی	موارد مصرف	منع مصرف	عوارض جانبی
کارامین	انسینون، رازیانه	ضد نفخ، کمک به هضم غذا	-	-
لیکوفار	شیرین بیان اکالیپتوس	ضد التهاب، ضد سرفه، خلط آور	بیماری قند	تورم عمومی بدن، فشار خون، آلرژی
ماسومن	نعناع	خارش گلو، سرفه، نفخ معده	دیابت قندی، انسداد صفراوی، نارسایی کبدی	فشار خون
منتول	نعناع	رفع احتقان بینی سرماخوردگی، حساسیت فصلی (آلرژیک)	نوزادان	مهار دستگاه تنفس، حساسیت موضعی
موسیلیوم	اسفرزه	ضد یبوست، بواسیر	آپاندیسیت، زخم معده	تهوع، یبوست شدید
میرتکس	گیاه مورد	آفت دهانی	آفت اطراف چشم	سرگیجه، تهوع
اولناکرات	برگ زیتون و لیک عتاب	فشار خون بالا	این دارو جایگزین داروهای قلب و عروق نمی باشد	تهوع، خستگی، ضایعات جلدی
پاسی پی	گل ساعتی	آرام بخشی شل کننده عضلات	ناراحتی گوارشی	خواب آلودگی، تهوع
پرسیکا	گیاه مسواک، نعناع	دهان شویه، چرک لثه، جرم دندان	بارداری	-

نام دارو	منشاء گیاهی	موارد مصرف	منع مصرف	عوارض جانبی
فیتوکلد	ریشه ختمی سر خارگل	سرماخوردگی	ضعف ایمنی	ناراحتی کبدی
پلاتائول	نمناغ و بارهنگ کبیر	اسهال مزمن	انسداد رودهای	یبوست
پروستاتان	گزنه، تخم کدو، گل بابونه	التهاب حاد پروستات تکرار ادرار	در کودکان و بارداری	اختلالات گوارشی
رازین	شیرین بیان	نفخ معده، سرفه خارش گلو	دیابت قندی	فشار خون بالا
سنکل	رازیانه، برگ بو	سنگ کلیه و درد کلیوی	—	ضعف و کپیر
سنالین	برگ سنا و زیره سبز	یبوست مزمن	—	—
شیرافزا	رازیانه، شنبلیله	برای افزایش شیر مادر	—	آلرژی
شیرینوش	شیرین بیان	زخم معده و التهاب معده	—	—
سوپر مینت	نمناغ	سوء هاضمه	—	—
تانامیگرن	بابونه	سردرد میگرنی	شیرخواران و زخم دهان	خشکی دهان تهوع و درد شکم استفراغ
تیم آرتا	آویشن	سرفه، التهاب مجاری تنفسی (گلو و دهان)	آلرژی و ناراحتی گوارشی شدید	لکه بینی در زنان
تیمکسی	آویشن	سرفه، التهاب گلو	—	—
تیمیان	آویشن، رازیانه	ضد سرفه، خلط آور	بیماران قندی	حالت موضعی
توسیان	آویشن	ضد سرفه، خلط آور	—	—
اورتان	گزنه	برای تحریک ادراری (ملز)	—	ناراحتی گوارشی، تهوع

نام دارو	منشاء گیاهی	موارد مصرف	منع مصرف	عوارض جانبی
والرین	سنبل الطیب	ضد اضطراب، سردرد	کودکان و حاملگی و شیردهی	بی خوابی، تحریک پذیری
ویتاگنوس	گیاه پنج انگشت	مشکلات دوره قاعدگی اختلالات یائسگی	تداخل دارویی بار داروهای ضد بارداری خوراکی	مشکلات گوارشی
زینتوما	زنجبیل	ضد تهوع و استفراغ بیماری مسافرتی	—	—

## فهرست داروهای ایران بر اساس محل اثر و بیماری‌ها

### A-دستگاه گوارش

ضد اسید معده و کاهش حرکات معده

- ۱- بنزیدامین کلراید ..... BENZYDMIN HCL
- ۲- سدیم فلوراید ..... FLUORID SODIUM
- ۳- تریامیسنولون استونید ..... TRIMCINOLON ACETONID
- ۴- فلوراید نمک ..... FLUORID (SALT)
- ۵- آلومینیوم هیدروکساید ..... ALUMINIUM HYDROXID
- ۶- آلومینیوم ام جی ..... ALUMINIUM MGI
- ۷- آلومینیوم ام جی اس ..... ALUMINIUM MGS
- ۸- بیسموت ..... BISMUTH
- ۹- سایمتیدین ..... CIMITIDINE
- ۱۰- فاموتیدین ..... FAMOTIDINE
- ۱۱- منیزوم هیدروکساید ..... MAGNESIUM HYDROXID
- ۱۲- اُمپرازول ..... OMEPRAZOLE
- ۱۳- رانیتیدین ..... RANITIDIN
- ۱۴- سو کرافت ..... SUCRALFAT

## -ضد درد و استغراغ

- ۱- سولفات اتروپین ..... ATROPIN SULFAT
- ۲- بلا دونا پی بی ..... BELADONA P.B
- ۳- سیسا پراید ..... CISAPRID
- ۴- کلیدینوم سی ..... CLINIUM-C
- ۵- دی سیکلومین کلراید ..... DICYCLOMIN HCL
- ۶- ہیوسین ..... HYOSCINE
- ۷- متوکلورامید ..... METOCLORAMID
- ۸- نیستاتین ..... NYSTAFIN
- ۹- پروپانتیلین ..... PROANTHELIE
- ۱۰- گرانیسٹرون ..... GRANISTRON
- ۱۱- تروپیسٹرون ..... TROPISETRON
- ۱۲- اورسودی او کسی کولیک اسید .... UrSo DE oxy ChoLIC ACID
- ۱۳- متیل سلولز ..... METHYL CELLULE
- ۱۴- سوربیتول ..... SORBITOL

## -اسہال آور ملین

- ۱- بیزاکودیل ..... BISACODYL
- ۲- لاکتولوز ..... LACTOLOS

## -ضد اسہال، ضد التهاب و ضد حرکت رودہ

- ۱- دیفنوکسیلات ..... DIPHENOXYLATE

- ۲- هیدروکورتیزون ..... HYDROCORTISONE
- ۳- لوپر آمید کلراید ..... LoPRAMID HCl
- ۴- مزالازین ..... AESALAZIN
- ۵- نیستاتین ..... NYSTATINE
- ۶- ار او - آر - اس ..... O.R.S
- ۷- پاروموایسین ..... PAROMOMY CIN
- ۸- سولفاسالازین ..... SULFASALAZIN
- ۹- وانکومایسین ..... VANCOMYCIN

#### - آدریم های دستگاه گوارش

- ۱- دایجستیو ..... DIGESTIVE
- ۲- پانکراتین ..... PANCRATIN
- ۳- پانکراتین فورث ..... PANCRATIN FORTE

#### B- داروی ضد قند خون (دیابت)

##### - داروهای دیابت

- ۱- آکاربوز ..... ACARBOSE
- ۲- کلرپروپامید ..... CHLOPROPAMID
- ۳- گلازین کالامید ..... GLIBEN CLAMID
- ۴- گلیکلایزید ..... GLICLAZID
- ۵- انسولین ..... INSULIN
- ۶- مت فورمین ..... METFORMIN



## C- ویتامین‌ها

- ۱- بتا کاروتن ..... BETACAROTENE
- ۲- کالسی تریون ..... CALCITRIOL
- ۳- کلسیم دی ..... CALCIUM-D
- ۴- کلسیم پانتوتنات ..... CALCIUM-PANTOTHENATE
- ۵- مولتی ویتامین ..... MULTIVITAMINE
- ۶- مولتی ویتامین + آهن ..... MULTIVITAMINE
- ۷- مولتی ویتامین + منیرال ..... MULTIVITAMINE
- ۸- مولتی ویتامین + تراپیوتیک ..... MULTIVITAMINE
- ۹- نیاسین آمید ..... NIACINAMID
- ۱۰- ویتامین A ..... VA
- ۱۱- ویتامین A+D ..... VA+D
- ۱۲- ویتامین ب کمپکس ..... V.B.complex
- ۱۳- ویتامین ب ۱ ..... V.B<sub>1</sub>
- ۱۴- ویتامین ب ۲ ..... V.B<sub>6</sub>
- ۱۵- ویتامین سی ..... V.C
- ۱۶- ویتامین د ۳ ..... V.D<sub>3</sub>
- ۱۷- ویتامین ای ..... V.E
- ۱۸- کربنات کلسیم ..... CALCIUM CARBONATE
- ۱۹- کلسیم فورث ..... CALCIUM FORTE
- ۲۰- کلسیم گلوکونات ..... CALCIUM GLUCONATE
- ۲۱- فلوراید سدیم ..... SODIUM FLURID

۲۲- سولفات منیزیم ..... MAGNESIUM SULFAT

۲۳- کلراید پتاسیم ..... POTASSIUM CHLORID

۲۴- سولفات روی ..... ZINC SULFATE

### D- تقویت عضلات

۱- ناندرلون ..... NANDROLON

۲- اوکسی متولون ..... OXX METHOLONE

۱- کارنی تین ..... CARNITINE

۲- سیتی آمین بی تارترات ..... CYSTEAMIN

۳- فسفوسیتسی آمین ..... phosphocy STEAMIN

### E- اشتها آور

۱- سیپروهپتادین ..... CYPROHEPTADINE

### F- ضد فشار خون

۱- دیازوکساید ..... DIAZOXIDE

۲- هیدرالازین ..... HYDRALAZINE

۳- متیل دوبا ..... METHYLDOPA

۴- نیتروپروساید ..... NITROPRUSID

۵- پرازوسین ..... PRAZOSIN

\* البته آتنولول، ایندرال، انالاپریل، کاپتوپریل هم جزء داروهای

ضد فشار خون هستند.

G- داروی قلبی (ضد آنژین قلبی، تقویت عملکرد قلب، ضد بی‌نظمی  
(آریتمی قلب)

- ۱- آدنوزین ..... ADENOSINE
- ۲- آمیودارون ..... AMIODARONE
- ۳- برتیلیوم ..... BRETILUM
- ۴- دیگوکسین ..... DIGOXIN
- ۵- دبوتامین ..... DOBUTAMIN
- ۶- دوپامین ..... DOPAMIN
- ۷- این نفرین ..... EPINEPHRIN
- ۸- فلکائینید ..... FLECAINIDE
- ۹- ایزوسورباید ..... ISOSORBID
- ۱۰- لیدوکائین ..... LIDOCAINE
- ۱۱- مکسی لتین ..... MEXILELINE
- ۱۲- مایل رینون ..... MILRINONE
- ۱۳- نیتروگلیسرین ..... NITROGLYCERIN
- ۱۴- نوراپی نفرین ..... NOREPINEPHRINE
- ۱۵- فنیل افرین ..... PHENYLEPHERIN
- ۱۶- پروکائین آمید ..... PROCAINAMID
- ۱۷- پروستا گلاندین ..... PROSTAGLANDIN
- ۱۸- کینیدین ..... QUINIDINE

**H - ضد فشار خون**

- ۱- آمیلوراید ..... AMYLORIDE
- ۲- فورسماید ..... FUROSEMIDE
- ۳- هیدرو کلروتیازید ..... HYDROCHLOROTHIAZIDE
- ۴- اسپرونولاکتون ..... SPIRONOLACTONE
- ۵- تریامترن - اچ ..... TRIAMTEREN-H

**I - داروهای عروقی - گشاد کننده عروق**

- ۱- آنتو سیانوزید ..... ANTOCYANOSIDE
- ۲- ایزو کسوپرین ..... ISOXUPRINE
- ۳- نیکو تینیک اسید ..... NICOTINIC ASID
- ۴- پنتو کسی فیلین ..... PENTOXY PHILIN
- ۵- فنوکسی بنزآمین ..... PHENOXY BENZAMIN

**J - بلوک کننده بتای قلبی**

- ۱- آتنولول ..... ATENOLOL
- ۲- اسمولول ..... ESMOLOL
- ۳- توپرولول ..... TOPROLOL
- ۴- پروپرانولول ..... PROPRANOLOL
- ۵- سوتالول ..... SOTALOL

**K - ضد آریتمی قلبی**

- ۱- آملودیپین ..... AMLODIPINE
- ۲- دیلتیازم ..... DILTIAZEM
- ۳- نیفیدپین ..... NIFIDIPINE
- ۴- نیمورپین ..... NIMORPIN
- ۵- وراپامیل ..... VERAPAMILE

**L - داروهای پوست**

- ۱- کلوتریمازول ..... CLOTRIMAZOL
- ۲- گریزوفولوین ..... GRISEOFULVIN
- ۳- کتوکنازول ..... CETOCENAZOLE
- ۴- میکونازول ..... MICONAZOLE
- ۵- نیستاتین ..... NYSTATIN
- ۶- تربیفینیک ..... TERBIPHINIC
- ۷- تولنفتات ..... TOLENPHETAT
- ۸- کالامین ..... CALAMINE
- ۹- زینک اکسید ..... ZINC OXIDE
- ۱۰- پماد ویتامین A+D ..... VITAMINE A+D
- ۱۱- پماد سوختگی ..... BURN OINMENT
- ۱۲- بنزوکائین ..... BENZOCAINE
- ۱۳- لیدوکائین ..... LIDOCAINE
- ۱۴- آسیکلوویر ..... ACICLOVIR

- ۱۵- پماد سیلور SILVER .....
- ۱۶- بتامتازون BETAMETHAZONE .....
- ۱۷- هیدروکورتیزون HYDROCORTISONE .....
- ۱۸- تریامسینولون TRIAMCINOLON .....
- ۱۹- نیتروفورازون NITROFORAZON .....
- ۲۰- بنزوئیل پراکساید BENZOIL PEROXIDE .....
- ۲۱- اریترومايسين ERYTHROMYCIN .....
- ۲۲- ترتینوئین TERTINOIN .....
- ۲۳- هیدروکینون HYDROQUINONE .....
- ۲۴- مینوکسیدیل MINOXIDIL .....
- ۲۵- سولفور SULFOR .....

**M** - آنتی بیوتیک‌ها که گروه عمده دارویی را تشکیل می‌دهند.

۱- کلیه آنتی بیوتیک‌ها

**N** - ضد سرطان (ضد تومورهای دستگاه‌های مختلف بدن)

- ۱- آسپاراژیناز ASPARAGINASE .....
- ۲- بلئومايسين BLEPMYCIN SULAT .....
- ۳- بوسولفان BUSULFAN .....
- ۴- کاربوپلاتین CARBOPLATIN .....
- ۵- کارموستین CARMUSTIN .....
- ۶- کلرامبوسیل CHOLORAMBUCIL .....

- ۷- سیس پلاتین . . . . . CISPLATIN
- ۸- سیتارابین . . . . . CYTARABIN
- ۹- داکتینومایسین . . . . . DACTINOMYCIN
- ۱۰- دانوروبیسین . . . . . DAUNORUBICIN
- ۱۱- دوستکسل . . . . . DOCETAXEL
- ۱۲- دوکسوروبیسین . . . . . DOXORUBICIN
- ۱۳- اپی رو بی سین . . . . . EPIROBYCYN
- ۱۵- فلوئوراسیس . . . . . FLUORASIS
- ۱۶- هیدروکسی اوره آ . . . . . HYDROXYUREA
- ۱۷- افوزامید . . . . . IFOSAMIDE
- ۱۸- لوموستین . . . . . LOMUSTIN
- ۱۹- ملفالان . . . . . MELFALAN
- ۲۰- مرکاپتوپورین . . . . . MERCAPTOPORIN
- ۲۱- میتومایسین . . . . . MITOMYCIN
- ۲۲- تنی پوساید . . . . . TENYPOSID
- ۲۳- تیوگوانین . . . . . TIOGUANIN
- ۲۴- وین پلاستین . . . . . VINPLASTIN
- ۲۵- وین کرسستین . . . . . VINCRISTIN

### O - داروهای اسکلتی عضلانی

- ۱- سربرکس . . . . . CERBEX
- ۲- دیکلوفناک . . . . . DICLOFENAC

- ۳- ایبوپروفن ..... IBUPROFEN
- ۴- ایندومتاسین ..... INDOMETHACIN
- ۵- مفنمیک اسید ..... MEFNAMIC ACID
- ۶- ناپروکسن ..... NAPROXEN
- ۷- پنی سیلامین ..... PENICILLAMINE
- ۸- پیروکسیکام ..... PIROXICAM
- ۹- تولمتین ..... TOLMETIN

#### - شل کننده عضلانی

- ۱- متوکاربامول ..... METOCARBAMOL
- ۲- بکلوفن ..... BECLOPHEN
- ۳- دانترولن ..... DANTROLEN
- ۴- پانکرونیوم ..... PANCRONIUM
- ۵- سوکسنیل کولین ..... SUXENILCOLIN

#### - ضد نفرس

- ۱- آلو پورنیول ..... ALOPORNOL
- ۲- کلشی سین ..... COLCHICINE

#### P - سیستم عصبی مرکزی

#### - ضد تشنج

- ۱- کاربامازپین ..... CARBAMAZPIN



- ۲- کلونازپام ..... CLONAZPAM
- ۳- اتوسوکسیماید ..... ETHOSUXIMID
- ۴- گاباپنتین ..... GABAPENTIN
- ۵- لاموتریژین ..... LAMOTRIGINE
- ۶- فنوباربیتال ..... PHENOBARBITAL
- ۷- فنی توئین ..... PHENYTOIN
- ۸- پریمیدون ..... PRIMIDON
- ۹- والپروات سدیم ..... VALPROATE

### Q - داروهای اعصاب و روان

- ۱- آمی تریپ تیلین ..... AMITRIPTYLINE
- ۲- سیتالوپرام ..... SETALOPRAM
- ۳- سیتی کولین ..... CITICOLINE
- ۴- کلومی پرامین ..... CLOMIPRAMIN
- ۵- دزی پرامین ..... DESIPRAMIN
- ۶- فلوکسیتین ..... FLUOXETINE
- ۷- ایمی پرامین ..... IMIPRAMINE
- ۸- ماپروتیین ..... MAPROTYIYN
- ۹- متیل فنیلات ..... METYL PHENYLATE
- ۱۰- نروتریپتیلین ..... NORTRIPTYLINE
- ۱۱- موکلوبماید ..... MOCLOBOMID
- ۱۲- پیراستام ..... PIRACETAM

۱۳- تری میپرامین ..... TRIMIPRAMIN

**R** - داروهای ریوی

شامل داروهای آنتی هیستامین و گشاد کننده مجاری هوایی (ریه) و ضد سرفه‌ها، ضد سرماخوردگی را شامل می‌شود.

**K** - داروهای چشمی

شامل داروهای ضد عفونت و التهاب چشم، داروهای ضد فشار خون داخل کره چشم ضد گلوکوم، گشاد کننده و مردمک اشک مصنوعی و آنتی بیوتیک چشمی می‌شود.

**T** - ضد مسمومیت

داروهای زیر ضد مسمومیت تلقی منی شود که بر اساسی نوع دارویی که عامل مسمومیت شده است کاربرد دارند:

۱- استیل سیستئین ..... ACETEL CYSTEINE

۲- آمیل نیتريت ..... AMYL NITRITE

۳- دایمر کاپرول ..... DIMERCAPROL

۴- ادتیت ..... EDETATE

۵- فلومازنیل ..... FLUMAZENIL

۶- اریپکاک ..... IPECAC

۷- نالوکسان ..... NALOXAN

۸- پرالیدوکسیم ..... PERALIDOXIM

۹- پروتامین سولفات ..... PEROTAMIN SULFAT

۱۰- سدیم تیوسولفات ..... SODIUM TIOSULFAT

U - واکسن‌ها

۱- واکسن هپاتیت

۲- واکسن انفلوآنزا

۳- واکسن پنوموکوک

۴- واکسن پولیومیلیت

۵- واکسن تب‌زرد

۶- واکسن ب‌ت‌ژ

۷- واکسن دیفتتری - کزاز - سیاه سرفه (ثلاث)

۸- مننژیت

V - داروهای هورمونی

شامل: هورمون‌های تیروئید، پانکراتین، تنظیم‌کننده کلسیم،

هورمون‌های هیپوفیزی، کورتیکواستروئید، هورمون‌های جنسی،

هورمون رشد و...

W - داروهای موثر بر سیستم خونساز و گردش خون

۱- ضد لخته‌ها ۲- ضد خونریزی

۳- درمان کم‌خونی ۴- جایگزین‌های خونی و فاکتورها

## عوارض دارویی و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

\*\*\*

بحمداله از سال ۱۳۷۷ مسئولان ارشد وزارت بهداشت به منظور کاهش عوارض و شناخت مشکلات بخش دارویی کشور مرکز شناسایی عوارض داروها را در وزارت بهداشت ساماندهی نمودند که به ADR مشهور است.

این مجموعه ارزشمند هم‌اکنون عضو سازمان جهانی بهداشت (WHO) می‌باشد و توانست فعالانه در عرصه درمان کشور نقش ایفا کند. این مرکز با آدرس (FDOIRNetwork) در سایت اینترنتی قابل جست‌وجو می‌باشد.

تا کنون به همت پزشکان، داروسازان و پیرا پزشکان عوارض متعددی از داروها در ایران شناسایی شده است که شاید در کتب مرجع ذکر نشده باشد که به مواردی از آنها اشاره می‌شود.

۱- داروهای ضد درد مثل دیکلوفناک و ولتارین و پیروکسیکام با توجه به عوارض فراوان عصبی و فلج غیرقابل برگشت عصب سیاتیک و

نورروپاتی وزارت بهداشت تجویز آنها را به شکل تزریقی منع نموده است.

۲- داروی "Accutan" که از مشتقات ویتامین A می باشد و در درمان آکنه مورد استفاده دارد به علت عوارض شدید و پوکی استخوان منع مصرف دارد.

۳- داروی "سیزا پراید" به علت مرگ ناگهانی توسط F.D.A آمریکا منع مصرف دارد که ممکن است باعث عوارض شدیدی مثل آریتمی شود.

۴- داروی گیاهی ضد میگرن "هایپیران" که تداخلات دارویی وسیع دارد.

۵- داروی "کوتریمکسازول" علاوه بر درد مفاصل، سرفه و خونریزی نقطه‌ای در پوست باعث عارضه شدید استیون جانسون می شود.

۶- داروی تزریقی "ترامادول" که در کشور ما به عنوان مسکن استفاده می شود بیشترین عارضه تزریقی را داشته است.

۷- عارضه داروی "لاموتریزین" که در درمان بیماران صرعی کاربرد دارد باعث عوارض شدید پوستی و مخاطی شده است.

۸- داروی "فنوباریتال" به علت عوارض در جنین در حاملگی منع مصرف دارد.

۹- گزارشی در مورد عارضه تشنج ناشی از "سیپروفلوکساسین" ارائه شده است. سیپروفلوکساسین از آنتی بیوتیک های مؤثر و از گروه فلودوکینولون ها می باشد.

۱۰- عارضه حساسیتی پس از تزریق سریع وریدی وانکومايسين گزارش شده است.

- ۱۱- گزارش شده است که آب میوه گریپ فروت با بسیاری از داروها تداخل اثر دارد: با میدازولام و تریازولام، نیفیدپین، ترفنادین.
- ۱۲- گزارش در مورد مصرف مکرر داروی "لیندان" در درمان گال (جرب و شپش) که به صورت عوارض عصبی، سرگیجه و مرگ نیز وجود دارد.
- ۱۳- گزارش در مورد استفاده از داروی ضد استفرغ متوکلوپرامید و ایجاد تشنج ارائه شده است.
- ۱۴- خطر بروز هیپاتیت دارویی در مصرف همزمان ایزونیازید و دیفامپین ارائه شده است (به ویژه در مبتلایان به سیل).
- ۱۵- در خبرنامه شماره ۴ وزارت بهداشت در مورد داروی ضد ترومبوز (لخته) "انوکسپیرین" هشدارهایی داده شده است.
- ۱۶- عارضه "انگشت پای ارغوانی" در مصرف کنندگان داروی وارفارین نیز دیده شده است.
- ۱۷- کاهش فشار خون کشنده به علت مصرف همزمان "نیترات ها" و "سیلدنافیل" گزارش شده است.
- ۱۸- در مورد عوارض دارویی تتراسایکلین هشدار داده شده است که اسهال، مشکلات دستگاه عصبی، تغییر رنگ دندان، عوارض کبدی از آن جمله اند.
- ۱۹- در خبرنامه شماره ۶ از تداخلات دارویی بین آنتی بیوتیک "کینولون ها" و اریترومايسين و تتوفیلین خبر داده شده است.
- ۲۰- در خبرنامه شماره ۷ مصرف همزمان کلوزاپین و اولانزپین موجب افزایش قند خون دانسته شده است.



## فهرست داروها

۲۱	..... آ - ث - آ .A.C.A
۲۲	..... آکاربوز ACARBOSE
۲۳	..... استامینوفن ACETAMINOPHEN
۲۴	..... استامینوفن کدئین ACETAMINOPHEN CODEINE
۲۵	..... استازولامید ACETAZOLAMID
۲۷	..... استیل کولین - کلراید ACETYLCHOLIN CHOLORIDE
۲۸	..... استیل سیستئین ACETYL CYSTEINE
۲۹	..... آسیکلوویر ACICLOVIR
۳۱	..... آسیتریتین ACITRETIN
۳۲	..... استیل سالیسیلیک اسید A.S.A
۳۳	..... آدنوزین ADENOSINE
۳۵	..... آدالت کولد = قرص سرماخوردگی بزرگسالان ADULT COLD
۳۶	..... آلبندازول ALBENDAZOL
۳۷	..... آلبومین (انسانی) ALBUMIN HUMAN
۳۸	..... آلندرونات ALENDRONATE
۳۹	..... آلو پورینول ALLO PURINOL
۴۰	..... آلپرازولام ALPRAZOLAM
۴۱	..... آلومینیوم هیدرواکساید ALUMINIUM HYDROXID



- ۴۲ ..... ALUMINIUM Mg آلومینیوم منیزیوم
- ۴۳ ..... ALUMINIUM.Mg.S آلومینیوم ام. جی. اس
- ۴۴ ..... AMANTADINE HCL آمانتادین
- ۴۵ ..... AMIKACIN SULFAT امیکاسین
- ۴۶ ..... AMILORIDE-H آمیلوراید
- ۴۷ ..... AMINOCAPROIC ACID آمینوکاپروئیک اسید
- ۴۸ ..... AMINO ACID آمینو اسید
- ۴۹ ..... AMINO GLUTETHIMIDE آمینو گلویتیماید
- ۵۰ ..... AMINOPHYLINE آمینوفیلین
- ۵۱ ..... AMIODARONE آمیودارون
- ۵۲ ..... AMITRIPTYLINE HCL آمی تریپ تیلین
- ۵۳ ..... AMLODIPINE املودیپین بزیلات
- ۵۵ ..... AMMONIUM CHOLORIDE آمونیوم کلراید
- ۵۶ ..... AMOXICILIN آموکسی سیلین
- ۵۷ ..... AMPHOTERICIN-B بی - امفوتریسین
- ۵۸ ..... AMPICILIN آمپی سیلین
- ۵۹ ..... AMYL NITRITE آمیل نیتريت
- ۶۰ ..... ANTHOCYANOSID A آنتوسیانوزید
- ۶۱ ..... ANTIHEMOPHILIC FACTOR فاکتور ضد هموفیلی
- ۶۲ ..... APOMORPHIN HCL آپو مورفین هیدروکلراید
- ۶۳ ..... APROTININ آپروتینین
- ۶۴ ..... ARTIFICIAL TEARS اشک مصنوعی
- ۶۵ ..... ASPARAGINASE آسپاراژیناز

۶۶	..... ATENOLOL	آتنولول
۶۷	..... ATORVASTATIN	آتور واستاتین
۶۸	..... ATRACURIUM	آتراکوریوم
۶۹	..... ATROPIN SULFAT (چشمی)	آتروپین (چشمی)
۷۰	..... ATROPIN SULFAT	آتروپین سولفات
۷۱	..... A.S.A	آسپیرین
۷۳	..... ASTEMIZOLE	آستمیزول
۷۴	..... AZATHIOPRIN	آزاتیوپرین
۷۶	..... BACITRACIN	باسیتراسین
۷۷	..... BACLOFEN	بکلوفن
۷۸	..... BALANCED SALT	نمک متعادل شده
۷۹	... BALANCED SALT - PLUS - GLUTATIONE	محلول نمکی متعادل شده
۸۰	..... BARIUM SULFAT	باریم (سولفات باریم)
۸۱	..... B.C.G	ب - ث - ژ داخل مثانه
۸۳	..... BCG VACCINE	ب.ث.ژ
۸۴	..... B-COMPLEX	ب - کمپلکس
۸۵	..... BECLOMETHASONE	بکلومتازون
۸۶	..... BELLADONA P.B	بلادونا - پی بی
۸۸	..... BELADONA ERGOTAMINE P.B	بلادونا - ارگوتامین پی بی
۸۹	..... BENZOCAINE	بنزوکائین
۹۰	..... BENZOYL PEROXIDE	بنزوئیل پراکساید
۹۱	..... BENZOTROPIN MESYLATE	بنزوتروپین مسیلات
۹۲	..... BENZOIC ACID	اسید بنزوئیک

- ۹۳ ..... BENZOIN TINCTURE تتوربنزوئین
- ۹۴ ..... BENZOIL PEROXIDE بنزوئیل پراکساید
- ۹۵ ..... BENZTROPIN MESYLATE بنزتروپین
- ۹۶ ..... BENZYL BENZOAT بنزیل بنزوآت
- ۹۷ .... BEPHENIUM HYDROXY NAPHTHOATE بفنیموم هیدروکسی نفتوات
- ۹۸ ..... BETACAROTENE بتاکاروتن
- ۹۹ ..... BETAHISTIN بتاهیستین
- ۱۰۰ ..... BETAMETHAZONE بتامتازون
- ۱۰۱ ..... BETAMETHAZONE (چشمی - گوشی) بتامتازون
- ۱۰۲ ..... BETAMETAZON-N بتامتازون - این
- ۱۰۳ ..... BETAXOLOL بتاکسولول
- ۱۰۴ ..... BETHANECHOL CHOLORIDE بتانکول
- ۱۰۵ ..... BIPERIDEN بای پیریدن
- ۱۰۶ ..... BISACODYL بیزاکودیل
- ۱۰۷ ..... BISMUTH SUBCITRATE بیسموت ساب سیترات
- ۱۰۸ ..... BLEOMYCIN SULPHAT بلئومایسین
- ۱۱۰ ..... BORAX بوراکس
- ۱۱۱ ..... BORIC ACID اسید بوریک
- ۱۱۲ ..... BOTULINUM TOXIN - A بوتولینوم توکسین - آ
- ۱۱۳ ... BOTULISM ANTITOXIN E-MONOVALENT آنتی توکسین بوتولسم
- ۱۱۴ ..... BRETLYUM TOSYLATE برتلیوم توسیلات
- ۱۱۵ ..... BRIMONIDINE TARTRATE بریمونیدین تارترات
- ۱۱۶ ..... BRINZOLAMIDEOPHTALMIC برینزولامید (چشمی)

- ۱۱۷ .....BROMHEXIN HCL بزم هگزین کلراید
- ۱۱۸ .....BROMOCRIPTINE بروموکریپتین
- ۱۱۹ .....BUPIVACAINE بویی واکائین
- ۱۲۱ ..... BUPRENORPHIN بوپرنورفین
- ۱۲۲ ..... BUPROPION بوپروپیون
- ۱۲۳ .....BURN OINMENT پماد سوختگی
- ۱۲۴ ..... BUSERELIN ACETATE بوسرلین
- ۱۲۵ .....BUSPIRON HCL بوسپرون کلراید
- ۱۲۶ .....BUSULFAN بوسولفان
- ۱۲۷ ..... CABERGOLIN کابرگولین
- ۱۲۸ ..... CAFFEINE کافئین
- ۱۲۹ ..... CADE OIL روغن کاد
- ۱۳۰ ..... CALAMINE کالامین
- ۱۳۱ ..... CALCIPOTRIOL کالسی پوتریول
- ۱۳۲ .....CALCITONIN کالسی تونین
- ۱۳۳ .....CALCITRIOL کالسی تریول
- ۱۳۴ ..... CALCIUM CARBONAT کربنات کلسیم
- ۱۳۵ .....CALCIUM CHOLORIDE کلسیم کلراید
- ۱۳۶ ..... CALCIUM-D کلسیم - د
- ۱۳۷ ..... CALCIUM FORTE کلسیم فورت
- ۱۳۸ .....CALCIUM DOBESILATE کلسیم دُبیسات
- ۱۳۹ ..... CALCUM GLUCONATE کلسیم گلوکونات
- ۱۴۰ .....CALCIUM PANTHOTENATE کلسیم پانتوتنات

۱۴۱	CAPREOMYCIN SULFAT	کاپرئومایسین
۱۴۲	CAPSICUM	کاپ سیکوم
۱۴۳	CAPTOPRIL	کاپتوپریل
۱۴۴	CARBACHOL	کارباکول (چشمی)
۱۴۵	CARBAMAZ PIN	کارباماز پین
۱۴۶	CARBAMID PEROXIDE	کاربامید پراکساید
۱۴۷	CAR BENICILLIN	کاربنی سیلین
۱۴۸	CARBOPLATIN	کاربوپلاتین
۱۵۰	CARMUSTIN	کارموستین
۱۵۲	CARNITINE	کارنیتین
۱۵۳	CASTOR OIL	روغن کرچک
۱۵۴	CEFAZOLIN	سفازولین
۱۵۵	CEFIXIME	سفیکسیم
۱۵۶	CEFOTAXIME	سفوتاکسیم
۱۵۷	CEFTAZIDIME	سفتازیدیم
۱۵۸	CEFTIZOXIME	سفتی زوکسیم
۱۵۹	CEFTRIAZONE	سفتریاکسون
۱۶۰	CEPHALEXIN	سفالکسین
۱۶۱	CEPHALOTIN	سفالوتین
۱۶۳	CEPHRADINE	سفرادین
۱۶۴	CETRIMIDE-C	ستریمید - سی
۱۶۵	CETYL - PYRIDINIOM CHOLORIDE	ستیل پیریدینیوم کلورید
۱۶۶	CHARCOAL ACTIVATED	شارکول فعال

- ۱۶۷ ..... CHILDREN COLD قرص سرماخوردگی اطفال
- ۱۶۸ ..... CHOLORAMBUCIL کلرامبوسیل
- ۱۷۰ ..... CHLORAMPHENICOL کلرامفنیکل
- ۱۷۱ ..... CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC (چشمی) کلرامفنیکل
- ۱۷۲ ..... CHLORODIAZPOXID کلرودیازپوکساید
- ۱۷۳ ..... CHLORHEXIDINE GLUCONATE کلرگزیدین گلوکونات
- ۱۷۴ ..... CHLORMETHINE HCL کلرمتین کلراید
- ۱۷۵ ..... CHLOROQUIN PHOSPHAT کلروکین فسفات
- ۱۷۷ ..... CHLOROXYLENOL کلوروکسیلنول
- ۱۷۸ ..... CHLORPHENIRAMIN MALEAT کلرفنیرآمین مالئات
- ۱۷۹ ..... CHLORPROMAZINE (HCL) کلرپرومازین
- ۱۸۱ ..... CHLORPROPAMID کلرپرو پامید
- ۱۸۲ ..... CHLORTHALIDONE کلرتالیدون
- ۱۸۳ ..... CHOLESTYRAMINE کلستیر آمین
- ۱۸۴ ..... CHORIONIC. GONADOTROPIN. HUMAN «HCG» گونادوتروپین
- ۱۸۵ ..... CICLOSPORIN سیکلوسپورین
- ۱۸۶ ..... CIMETIDINE سایمتیدین
- ۱۸۷ ..... CINARIZINE سیناریزین
- ۱۸۸ ..... CIPROFLOXACIN سیپروفلوکساسین
- ۱۹۰ ..... CIPROFLOXACIN HCL (چشمی) سیپروفلوکساسین
- ۱۹۱ ..... CISAPRIDE سیساپراید
- ۱۹۳ ..... CISPLATIN سیس پلاتین
- ۱۹۵ ..... CITRIC ACID اسید سیتریک

۱۹۶ .....	CLADRIBINE	کلادربیین
۱۹۷ .....	CLARYTHROMYCINE	کلاریترو مایسین
۱۹۸ .....	CLEMASTINE	کلماستین
۱۹۹ .....	CLIDINIUM-C	کلیدینیوم سی
۲۰۰ .....	CLINDA MYCIN	کلیندا مایسین
۲۰۲ .....	CLINDAMYCIN	کلیندا مایسین موضعی
۲۰۳ .....	CLINDAMYCIN Vaginal	کلیندا مایسین فسفات
۲۰۴ .....	CLOBAZAM	کلوبازام
۲۰۵ .....	CLOBETAZOL	کلوبتازول
۲۰۶ .....	CLOBUTINOL	کلوبوتینول
۲۰۷ .....	CLOFAZIMINE	کلوفازیمین
۲۰۸ .....	CLOFIBRAT	کلوفیبرات
۲۰۹ .....	CLOMIPHENE	کلومیفن
۲۱۰ .....	CLONAZPAM	کلونازپام
۲۱۱ .....	CLONIDINE	کلونیدین
۲۱۲ .....	CLOTRIMAZOL	کلوتریمازول
۲۱۳ .....	CLOXACILLIN SODIUM	کلوکزاسیلین - سدیم
۲۱۴ .....	CLOZAPINE	کلوزاپین
۲۱۵ .....	COAL TAR	کُل تار
۲۱۶ .....	CO-AMOXICLAV	کوآموکسی کلاو
۲۱۷ .....	COD LIVER OIL	روغن کبد ماهی
۲۱۸ .....	CODEINE PHOSPHAT	کدئین فسفات
۲۱۹ .....	COLCHICINE	کلشی سین

۲۲۰	COLFOSCERIL PALMITATE	کولفوسریل
۲۲۱	COLISTIN SULPHATE	کولیستین
۲۲۲	COLLODION	کولودیون
۲۲۳	CONJUGATED ESTROGEN	استروژن کنژوگه
۲۲۴	CONTRACEPTIVES	کنتراسپتیوها
۲۲۶	CORITCOTROPIN	کورتیکوتروپین
۲۲۸	CO-TRIMOXAZOLE	کوتریمکسازول
۲۲۹	CROMOLIN SODIUM	کرومولین سدیم
۲۳۰	CUMARIN-SR	کومارین
۲۳۱	CYCLOPENTOLATE	سیکلو پنتولات (چشمی)
۲۳۲	CYCLOPHOSPHAMIDE	سیکلو فسفاماید
۲۳۳	CYCLOSERINE	سیکلوسرین
۲۳۴	CYPROHEPTADINE	سیپروهپتادین
۲۳۵	CYPROTERONE	سیپروترون (استات)
۲۳۶	CYPROTERONE	سیپروترون (کامپاند)
۲۳۷	CYTARABIN	سیتارابین
۲۳۸	DACARBAZINE	داکاربازین
۲۳۹	DACTINOMYCIN	داکتینومايسين
۲۴۰	DANAZOL	داناژول
۲۴۱	DANTROLEN	دانترولن
۲۴۲	DAPSONE	داپسون
۲۴۳	DAUNORUBICIN	دانوروبیسین
۲۴۴	DEFEROXAMINE	دفروکسامین



۲۴۵	.....	DESIPRAMIN	دزی پرامین
۲۴۶	.....	DESMORESSIN	دزمورسین
۲۴۷	.....	DEXAMETHASONE	دگزامتازون
۲۴۸	.....	DEX CHLOR PHENIRAMINE	دکس کلرفنرآمین
۲۴۹	.....	DEXPANTHENOL	دکس پانتنول
۲۵۰	.....	DEXTRAN	دکستران
۲۵۱	.....	DIAZEPAM	دiazepam
۲۵۲	.....	DIAZOXIDE	دiazoxide
۲۵۳	.....	DICLOFENAC	دیکلوفناک سدیم
۲۵۵	.....	DICYCLOMINE	دی سیکلومین
۲۵۶	.....	DIENESTROL	داینسترو
۲۵۷	.....	DIETHYL CARBAMAZINE	دی اتیل کاربامازین سیترا
۲۵۸	.....	DIETHYLSTIBESTROL	دی اتیل استیل بسترو
۲۵۹	.....	DIGESTIVE	دایجستیو
۲۶۰	.....	DIGOXIN	دیگوکسین
۲۶۲	.....	DIHYDRO ERGOTAMINE	دی هیدروارگوتامین
۲۶۳	.....	DIHYDROERGOTOXIN	دی هیدروارگوتوکسین
۲۶۴	.....	DIHYDROTACHYSTEROL	دی هیدروتاکی استرو
۲۶۵	.....	DILOXANIDE	دیلوکسانید
۲۶۶	.....	DILTIAZEM	دیلتiazem
۲۶۷	.....	DIMENHYDRINATE	دیمن هیدرینات
۲۶۸	.....	DIMERCAPROL	دایمر کاپرو
۲۷۰	.....	DIMETHICON	دایمتیکون

- ۲۷۱ ..... DIMETHYL SULFOXIDE دی متیل سولفوکساید
- ۲۷۲ ..... DIPHENHYDRAMIN COMPOUND دیفن هیدرامین کامپاند
- ۲۷۳ ..... DIPHENHYDRAMIN دیفن هیدرامین
- ۲۷۴ ..... DIPHENOXYLAT دیفنوکسیلات
- ۲۷۵ ..... DIPIVEFRIN دیپی وفرین
- ۲۷۶ ..... DIPYRIDAMOLE دی پیریدامول
- ۲۷۷ ..... DISOPYRAMID دیزوپیرامید
- ۲۷۹ ..... DITHRHNOL دیترانول
- ۲۸۰ ..... DOBUTAMINE دوبوتامین
- ۲۸۱ ..... DOCETAXEL دوستکسل
- ۲۸۳ ..... DOPAMIN دوپامین
- ۲۸۴ ..... DORZOLAMIDE دورزولامید
- ۲۸۵ ..... DOXEPINE داکسی پین
- ۲۸۶ ..... DOXORUBICIN دوکسوروبیسین
- ۲۸۷ ..... DOXY CYCLINE داکسی سایکلین
- ۲۸۸ ..... DROPRIDOL دروپریدول
- ۲۸۹ ..... ECHOTHIOPHATE IODIDE یدید اکوتیوفات
- ۲۹۰ ..... EDTATE CALCIUM ادتیت کلسیم دی سدیم
- ۲۹۱ ..... EDTATE DICOBALT ادتیت دی کبالت
- ۲۹۲ ..... EDROPHONIUM ادروفونیوم
- ۲۹۳ ..... ENALAPRIL انالاپریل
- ۲۹۴ ..... ENFLURANE انفلوران
- ۲۹۵ ..... ENOXAPRIN انوکساپرین

۲۹۶	افدرین EPHEDRINE
۲۹۷	اپی نفرین EPINEPHRINE
۲۹۹	ارگوتامین تارترات ERGOTAMINE TARTRATE
۳۰۰	ارگوتامین سی ERGOTAMINE-C
۳۰۱	اریترومایسین ERYTHROMYCIN
۳۰۲	اریتروپوئیتین ERYTHROPOIETIN
۳۰۳	ایسمولول ESMOLOL
۳۰۴	استرادیول والرات ESRADIOL VALERATE
۳۰۵	استراموستین ESTRAMUSTINE
۳۰۶	اتاکرینیک اسید ETHACRYNIC ACID
۳۰۷	اتامبوتول ETHAMBUTOL
۳۰۸	اتر ETHER
۳۰۹	اتوسوکسیماید ETHOSUXIMID
۳۱۰	ایتیدرونات ETIDRONATE
۳۱۲	اتومیدیت ETOMIDATE
۳۱۳	اتوپوساید ETOPOSIDE
۳۱۴	اترتینت ETRETINATE
۳۱۵	اکسپکتورانت EXPECTORANT
۳۱۶	فاکتور نه FACTOR IX
۳۱۸	فاکتور هفت FACTOR VII
۳۱۹	فاموتیدین FAMOTIDINE
۳۲۰	فیبا FEIBA
۳۲۱	فن فلورامین FENFLURAMINE

۱۳۲	FELBAMATE	فلبامات
۱۳۳	FENTANYL	فنتانیل
۱۳۴	FERROUS SULFAT	فروس سولفات
۱۳۶	FIBRINOGEN	فیبرینوژن
۱۳۷	FIBRINOLYSIN (موضعی)	فیبرینولیزین (موضعی)
۱۳۸	FINASTERIDE	فیناستراید
۱۳۹	FLUCONAZOLE	فلوکونازول
۱۴۰	FLUCYTOSINE	فلوسیتوزین
۱۴۱	FLUDARABINE	فلودارابین
۱۴۲	FLUDROCORTISONE	فلودروکورتیزون
۱۴۳	FLUMAZENIL	فلومازنیل
۱۴۵	FLUOCINOLONE	فلوئوسینولون
۱۴۶	FLUORESCEIN	فلورسئین
۱۴۷	FLUORIDE	فلوراید
۱۴۸	FLUOXETINE	فلوکستین
۱۴۹	FLUPENTIXOL	فلوپنتیکسول
۱۴۰	FLUPHENAZIN	فلوفنازین
۱۴۱	FLURAZEPAM	فلوراز پام
۱۴۲	FLUTAMIDE	فلوتامید
۱۴۳	FLUVASTATIN	فلوواستاتین
۱۴۴	FOLIC ACID	اسید فولیک
۱۴۵	FOSFESTROL	فسفسترول
۱۴۶	FURAZOLIDONE	فورازولیدون

۳۴۷	FUROSEMIDE	فورسماید
۳۴۸	FUSIDIC ACID	اسید فوسیدیک
۳۴۹	GABAPENTIN	گاباپنتین
۳۵۰	GANCICLOVIR	گانسیکلوویر
۳۵۲	GEMFIBROZIL	جیم فیبروزیل
۳۵۳	GENTAMICIN	جنتامایسین
۳۵۴	GESTONORONE	ژستونورون
۳۵۵	GLIBENCLAMID	گلابین کلامید
۳۵۶	GLUCAGON	گلوکاگون
۳۵۷	GLUTARALDEHYDE	گلوتارآلدئید
۳۵۸	GONADORELIN	گونادورلین
۳۵۹	GRANISETRON	گرانی استرون
۳۶۰	GRISEOFULVIN	گریزوفولوین
۳۶۱	GUAIFENESIN	گایافنیزین
۳۶۲	GUANETIDINE	گوانیتیدین
۳۶۳	HALOPERIDOL	هالوپریدول
۳۶۴	HALOTHANE	هالوتان
۳۶۵	HEMATINIC	هماتینیک
۳۶۶	HEPARIN	هپارین سدیم
۳۶۸	HYDRALAZINE	هیدرالازین
۳۶۹	HYDRO CHLOROTHIAZID	هیدروکلروتیازید
۳۷۱	HYDROCORTISONE	هیدروکورتیزون
۳۷۲	HYDROQUINONE	هیدروکینون

۳۷۳	.. HYDROXY CHOLOROQUIN SULFATE	هیدروکسی کلروکین سولفات
۳۷۴	.....HYDROXYUREA	هیدروکسی اوره آ
۳۷۵	..... HYDROXYZINE	هیدروکسی زین
۳۷۶	.....HYOSCINE	هیوسین
۳۷۷	.....IBUPROFEN	ایبوپروفن
۳۷۸	.....IDOXURIDINE	آیدوکسوریدین
۳۷۹	.....IFOSAMIDE	ایفوزامید
۳۸۰	..... IMIPENEM	ایمی پنم
۳۸۱	..... IMIPRAMINE HCL	ایمی پرامین
۳۸۲	..... INDOMETHACIN	ایندومتاسین
۳۸۳	.....INSULIN	انسولین
۳۸۵	..... INTERFERONES	اینترفرون ها
۳۸۶	...... IODOQUINOL	یدوکیلول
۳۸۷	...... IPECAC	ایپکاک
۳۸۸	..... ISOCARBOXAZID	ایزو کربوکسازید
۳۸۹	..... ISOFLURANE	ایزو فلوران
۳۹۰	..... ISONIAZID	ایزونیاژید
۳۹۱	..... ISOPROTERENOL	ایزوپروترنول
۳۹۳	.....ISO SORBID DINITRATE	ایزوسورباید دی نیترات
۳۹۵	..... ISOSORBID MONONITRATE	ایزوسورباید منو نیترات
۳۹۶	..... ISOTRETINOIN	ایزوترتینوین
۳۹۷	..... ISOXSUPRINE	ایزوکسوپرین
۳۹۸	..... ITRACONAZOLE	ایتراکونازول

۳۹۹ .....	KETAMINE	کتامین
۴۰۰ .....	KETO CONAZOLE	کتوکونازول
۴۰۱ .....	KETOTIFEN	کتوتیفن
۴۰۲ .....	LACTULOUSE	لاکتولوز
۴۰۳ .....	LAMIVUDINE	لامی وودین
۴۰۴ .....	LAMOTRIGINE	لاموتری زین
۴۰۵ .....	LATANOPROST	لاتانوپروست
۴۰۶ .....	LEUCOVORIN	لوکوورین
۴۰۷ .....	LEUPRORELIN	لوپرورلین
۴۰۸ .....	LEVAMIZOLE	لوامیزول
۴۰۹ .....	LEVODOPA	لوودوپا
۴۱۱ .....	LEVODOPA-B	لوودوپا - بی
۴۱۲ .....	LEVODOPA-C	لوودوپا - سی
۴۱۳ .....	LEVONORGESREL	لوونورژسترل
۴۱۴ .....	LEVOTHYROXIN	لووتیروکسین
۴۱۵ .....	LIDOCAINE HCL	لیدوکائین هیدورکلراید
۴۱۶ .....	LINDAN	لیندان
۴۱۸ .....	LIOETHYRONINE	لیوتیرونین سدیم
۴۱۹ .....	LISINOPRIL	لیزینوپریل
۴۲۰ .....	LITHIUM	لیتیوم کربنات
۴۲۲ .....	LOMUSTIN	لوموستین
۴۲۳ .....	LOPERAMID	لوپراماید
۴۲۴ .....	LORATADINE	لوراتادین

۳۲۵	LORAZEPAM	لورازپام
۳۲۶	LOSATAN	لوساتان
۳۲۷	LOVASTATIN	لوواستاتین
۳۲۸	LYNESTRENOL	لاینسترنول
۳۲۹	MAFENIDE	مافناید
۳۳۰	MAGNESIUM HYDROXID	هیدروکسید منیزیم
۳۳۱	MAGNESIUM SULFATE	سولفات منیزیم
۳۳۲	MANITOL	مانیتول
۳۳۳	MEDROXYPROGESTRON	مدروکسی پروژسترون
۳۳۴	MEFNAMIC ACID	مفنامیک اسید
۳۳۵	MENTHOL SALICYLATE	متول سالیسیلات
۳۳۶	MEPROBAMATE	مپروبامات
۳۳۷	METAPROTERENOL	متاپروترونول
۳۳۸	METFORMIN	متفورمین
۳۳۹	METHADON	متادون
۳۴۰	METHIMAZOLE	متی مازول
۳۴۱	METHOTREXATE	متوترکسات
۳۴۲	METHYLDOPA	متیل دوبا
۳۴۳	METHYL PRODNISOLONE	متیل پردنیزولون
۳۴۴	METOCLOPRAMID	متوکلوپرامید
۳۴۵	METRONIDAZOLE	مترونیدازول
۳۴۶	MICONAZOLE	میکونازول
۳۴۷	MIDAZOLAM	میدازولام




۳۴۸	..... MINOXIDIL	مینوکسیدیل
۳۴۹	..... MITHRAMAYCIN	میترامایسین
۳۵۰	..... MORPHINE	مورفین
۳۵۱	..... MULTIVITAMIN	مولتی ویتامین
۳۵۲	..... NAFICILIN	نافیسیلین
۳۵۳	..... NALIDIXIC - ACID	نالیدیک اسید
۳۵۴	..... NALOXAN	نالوکسان
۳۵۵	..... NANDROLONE	ناندرولون
۳۵۶	..... NAPHAZOLINE - ANTAZOLINE	نفازولین
۳۵۷	..... NAPROXEN	ناپروکسن
۳۵۸	..... NEOMYCIN	نتومایسین
۳۵۹	..... NICLOSAMID	نیکلوزامید
۳۶۰	..... NIFIDIPINE	نیفیدپین
۳۶۱	..... NITROFURANTION	نیتروفورانتوئین
۳۶۲	..... NIROFUZAZON	نیتروفورازون
۳۶۳	..... NITROGLYCERIN	نیتروگلیسرین
۳۶۴	..... NITROPRUSSIDE	نیتروپروساید
۳۶۵	..... NORTRIPTYLINE	نورتتریپتیلین
۳۶۶	..... NYSTATIN	نیستاتین
۳۶۷	..... OFLOXACIN	أفلوکساسین
۳۶۸	..... OMEPRAZOLE	امپرازول
۳۶۹	..... OXAZPAM	اکسازپام
۳۷۰	..... OXYBUTYNIN	اکسی بوتینین

- ۴۷۱ ..... OXYMETHOLON اکسی متولون
- ۴۷۲ ..... OXYTOCIN اکسی توسین
- ۴۷۳ ..... PANCRATIN پانکراتین
- ۴۷۴ ..... PEDIATRIC GRIPE پدیاتریک گریپ
- ۴۷۵ ..... PENICILLAMINE پنی سیلامین
- ۴۷۶ ..... PENICILLINS پنی سیلین ها
- ۴۷۷ ..... PENTOZOCINE پنتازوسین
- ۴۷۸ ..... PERPHENAZINE پرفنازین
- ۴۷۹ ..... PETHIDIN پتیدین
- ۴۸۰ ..... PHENOBARBITAL فنوباریتال
- ۴۸۱ ..... PHENYTOIN فنی توئین
- ۴۸۲ ..... PIPRAZINE پپیرازین
- ۴۸۳ ..... PIROXICAM پیروکسیکام
- ۴۸۴ ..... POLYMXIN پلی میکسین
- ۴۸۵ ..... PRAZOSIN پرازوسین
- ۴۸۶ ..... PREDNISOLONE پردنیزولون
- ۴۸۷ ..... PROCAINAMIDE پروکائین آمید
- ۴۸۸ ..... PROGESTERONE پروژسترون
- ۴۹۰ ..... PROMETAZINE پرومتازین
- ۴۹۱ ..... PROPOFOL پروپوفول
- ۴۹۲ ..... PROPRANOLOL پروپرانولول
- ۴۹۳ ..... PROPYL THIOURACIL پروپیل تیواوراسیل
- ۴۹۴ ..... PYRVINIUM PAMOATE پیرووینیوم پاموات

۳۹۵	RANITIDINE	رانیتیدین
۳۹۶	RIFAMPIN	ریفامپین
۳۹۷	SALBUTAMOL	سالبوتامول
۳۹۸	SELENIUM	سلنیوم سولفاید
۳۹۹	SILVER	سیلور سولفادiazin
۵۰۰	SORBITOL	سوربیتول
۵۰۱	STREPTOMYCIN	استرپتومايسين
۵۰۲	SULFACETAMID	سولفاستامید (چشمی)
۵۰۳	SULFASALASIN	سولفاسالازین
۵۰۴	TOMOXIFEN	تاموکسیفن
۵۰۵	TERFENADINE	ترفنادین
۵۰۶	TESTOSTERONE	تستوسترون
۵۰۷	TETRACYCLINE	تترا سایکلین
۵۰۸	TETRACYCLINE	تتراسایکلین موضعی
۵۰۹	THEOPHYLLINE	تئوفیلین
۵۱۰	THIORIDASINE	تیوریدازین
۵۱۱	THIOTHIXENE	تیوتیکسین
۵۱۲	TIMOLOL	تیمولول چشمی
۵۱۳	TOLMETIN	تولمتین
۵۱۴	TRIAMCINOLON	تریامسینولون
۵۱۵	TRIAMTEREN-H	تریامترن - اچ
۵۱۶	TRIFLUOPERAZINE	تری فلوئوپرازین
۵۱۷	TRIMIPRAMIN	تری میپرامین

۵۱۸	..... VALPROATE	والپروات
۵۱۹	..... VANCOMYCIN	وانکومايسين
۵۲۰	..... VERAPAMIL	وراپاميل
۵۲۱	..... WARFARIN	وارفارين
۵۲۲	..... YOHIMBINE	يوهيمبين
۵۲۳	..... ZINC SULFAT	سولفات روی


انتشارات کلیا منتشر کرد



انتشارات کلبا منتشر کرد



انتشارات کلیا منتشر کرد



## کتاب منتشر شده توسط انتشارات کلیا

- ۱- فرهنگ دارویی خانواده/ دکتر ذبیح... حسن زاده
- ۲- کلیات تعبیر خواب/ ابن سیرین، دانیال پیغمبر، امام جعفر صادق(ع)
- ۳- دیوان و فالنامه حافظ شیرازی با معنی/ حافظ شیرازی
- ۴- دیوان حافظ شیرازی/ حافظ شیرازی
- ۵- حضرت علی (ع) صراط مستقیم/ علی خداجویان
- ۶- استخاره به زبان ساده/ علی فلسفی
- ۷- انواع استخاره/ علی فلسفی
- ۸- شفا و درمان با قرآن/ مجتبی رضائی
- ۹- مشکل گشای معنوی/ مجتبی رضائی
- ۱۰- کلیات مفاتیح الجنان/ حاج شیخ عباس قمی(ره)
- ۱۱- نماز عارفان/ غلام عباس هاشمی
- ۱۲- کرامات حضرت زهراء(ع)/ اسماعیل محمد شریفی، لطف... ابراهیمی
- ۱۳- سیاحت شرق و غرب/ آقا نجفی قوچانی
- ۱۴- داروشناسی عمومی/ محمد نوروزی
- ۱۵- داستانهای از کلیله و دمنه/ طوبی برزگر
- ۱۶- نجوای عاشقانه/ شریعت السادات سیدجوادی
- ۱۷- فرهنگ نام‌ها/ فاطمه میرابوالفتحی
- ۱۸- ماجراهای خنده‌آور ملانصرالدین/ استاد کاظم لاهیجی
- ۱۹- خنده درمانی/ مختار نعیم چاک
- ۲۰- لطیفه‌های شیرین ایرانی/ استاد کاظم لاهیجی



## به نام خدا

خواننده گرامی:

اگر خواهان دریافت کتابهای این موسسه انتشاراتی هستید مبلغ کل کتابهای درخواستی به علاوه مبلغ ۵۰۰ تومان اضافه جهت هزینه بسته بندی و پست سفارشی به شماره حساب جاری ۵۳۹۴ نزد بانک صادرات شعبه میدان انقلاب کد ۷۶ به نام مهدی صبائی واریز نموده و اصل فیش بانکی را همراه لیست کتب درخواستی خود به نشانی تهران: خیابان انقلاب خ ۱۲ فروردین خ شهدای ژاندارمری پلاک ۲۳۶ طبقه دوم ارسال نموده تا بلافاصله کتابهای درخواستی برایتان ارسال گردد

[http://www.books\\_golpa.com](http://www.books_golpa.com)

E.mail:books\_golpa@hotmail.com

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۲۰۸۲۴-۶۹۵۲۵۶۲

منتظر تان هستیم